



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXIX

E

27

MANOLI

REGNUM ANIMALE

IN OMNIBUS DISTRIBUTUM

2112

LE R E G N E

ANIMALE.

OMNIBUS DISTRIBUTUM

REGNUM

ANIMALE.



IN OMNIBUS DISTRIBUTUM

OMNIBUS DISTRIBUTUM

OMNIBUS DISTRIBUTUM

OMNIBUS DISTRIBUTUM

OMNIBUS DISTRIBUTUM

REGNUM ANIMALE IN CLASSES IX DISTRIBUTUM:

SIVE

SYNOPSIS METHODICA
SISTENS GENERALEM ANIMALIUM
distributionem in Classes IX, & duarum primarum
Classium, Quadrupedum scilicet & Cetaceorum, parti-
cularem divisionem in Ordines, Sectiones, Genera &
Species.

CUM BREVI CUJUSQUE SPECIEI
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibus-
que vulgaribus.

A. D. BRISSON, Historiæ Naturalis Musei Rœal-muriani
Demonstratore.

Cum Figuris æneis.

ANIMALE



PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM.

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam, ad
Insigne Sæ. Genovefix, & Sæ. Joannis in Deserto.

M. DCC. LVI.

Cum Privilegio Regis & Approbatione.

176

LE REGNE ANIMAL

DIVISÉ EN IX CLASSES.

OU

M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION GENERALE DES
Animaux en IX Classes, & la division particulière
des deux premières Classes, sçavoir de celle des
Quadrupèdes & de celle des *Cetacées*, en Ordres,
Sections, Genres & Espèces.

AUX QUELLES ON A JOINT UNE
courte description de chaque *Espèce*, avec les Citations
des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leurs ont
donnés, ceux que leurs ont donnés les différentes
Nations, & les noms vulgaires.

Par M. BRISSON, Démonstrateur du Cabinet d'Histoire
Naturelle de M. de Reaumur.

Avec Figures en taille douce.



A. P A R I S,

QUAY DES AUGUSTINS.

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte
Geneviève & S. Jean dans le Desert.

M. D C C. L V I.

Avec Privilège du Roi & Approbation.

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

11.4

GOVERNMENT OF CANADA


[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2001 BY 60322 UCBAW

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{x^2} \right) = \frac{x+1}{2x^2}$$



A MONSIEUR
DE REAUMUR,

Commandeur & Intendant de l'Ordre Royal &
Militaire de S. Louis; de l'Académie Royale
des Sciences, de la Société Royale de Londres,
des Académies de Petersbourg & de Berlin, de
l'Institut de Bologne, &c. &c.



•
ONSIEUR,

*Il ne fut jamais d'hommage plus légitime que celui
que je vous rends aujourd'hui. Cet Ouvrage doit être*
•

regardé comme votre bien, puisque c'est chez vous que
j'ai puisé les connoissances qui l'ont produit. Si le Public
lui accorde son suffrage, c'est à votre Nom seul que je
le devrai.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect.

MONSIEUR,

Votre très humble &
très obéissant serviteur.
BRISSON.



P R E F A C E.

LA place que j'ai le bonheur d'occuper depuis plusieurs années, m'ayant mis journellement sous les yeux la plus riche collection des productions de la nature, qui ait jamais été faite, m'a donné la facilité de faire un grand nombre d'observations sur le Regne Animal, de comparer entr'eux les êtres animés qui lui appartiennent, d'en examiner les rapports les plus prochains & les plus éloignés. J'ai été ainsi conduit à penser à disposer les Animaux dans un ordre différent de ceux, où on les a mis jusqu'ici. Mon intention, en y travaillant, étoit uniquement de m'instruire moi-même, & de me mettre en état de juger des places les plus convenables aux nouveaux Animaux, qui se présenteroient pour en avoir une dans ces Cabinets, dont le soin m'est confié, & où il y en a tant de rassemblés : & la juste défiance que j'ai de mes lumières, ne m'eût pas permis de faire paroitre au jour la distribution qui m'avoit semblé la plus commode, si je n'y eusse été encouragé par des Sçavans, qui m'ont aidé de leurs conseils, pendant que j'y travaillois ; & pour tout dire, par l'approbation que lui a donnée la plus célèbre des Académies, l'Académie Royale des Sciences.

J'ose embrasser tout le Regne Animal. Il sera divisé en Classes ; les Classes en Ordres ; les Ordres en Sections ; les Sections en Genres ; & les Genres en Espèces. Chacune de ces divisions ou sous-divisions aura un caractère qui lui sera propre. Le premier désignera la Classe ; le second l'Ordre ; le troisième la Section ou le Genre. Je dis , la Section , ou le Genre ; parce qu'il y a quelques Animaux , comme le *Rhinoceros* , qui seuls composent un Ordre , lequel par conséquent n'est point divisé en Sections : alors le troisième caractère est celui du Genre. Au contraire , lorsque l'Ordre sera divisé en Sections , ce sera par le quatrième caractère que le Genre sera désigné. Pour ce qui est des Espèces , je me contenterai d'une courte énumération de ce qu'il y a de propre à les faire distinguer les unes des autres ; me réservant à donner des descriptions plus détaillées de ces mêmes Espèces , lorsque je publierai , comme je me le propose , une description générale du magnifique Cabinet d'Histoire Naturelle de M. de Reaumur.

Il y aura donc tout au plus cinq choses à observer , non seulement pour mettre un Animal dans son Genre , mais encore pour en déterminer l'Espèce. Je suppose , par exemple , qu'on présente un *Castor* à quelqu'un qui n'en a jamais vu , & qui ne le connoît point du tout : par le moyen de cette méthode il connoîtra dans le moment l'espèce de cet Animal. Premièrement ses quatre pieds , & le poil dont son corps est couvert , lui apprendront qu'il est de la première Classe , de celle des Quadrupèdes. Secondement les deux dents incisives qu'il a à chacune de ses mâchoires , & les ongles de ses doigts , ou ses doigts qui sont de ceux que l'on

P R E F A C E.

nomme *onguiculés*, lui feront connoître qu'il est du XII Ordre de cette Classe. Troisièmement en continuant de l'observer, il remarquera qu'il est dépourvu de *dents Canines*, & qu'il n'a pas de *piequants* sur le corps; ce qui lui apprendra qu'il est de la II Section de cet Ordre. Quatrièmement sa queue *platte & écaillée* lui désignera le XXI Gente pour celui auquel l'Animal appartient. Cinquièmement enfin l'aplatissement *horizontal* de cette queue déterminera l'Espèce, & lui apprendra qu'il est le *Castor*: & ainsi des autres Espèces.

J'ai tâché de ne faire rien entrer dans les caractères que de simple & de facile à appercevoir, pour ne point exposer aux erreurs dans lesquelles des caractères plus compliqués pourroient induire. Au reste je ne me flatte pas d'avoir toujours été assez heureux pour saisir ce qu'il y avoit de mieux; je serai sensiblement obligé à ceux qui voudront bien me le montrer, & me faire connoître mes fautes, que je serai empressé à corriger.

On imagine bien que je n'ai pu parvenir à voir toutes les espèces d'Animaux dont il est parlé dans cet Ouvrage. Celles que j'ai été à portée d'examiner de mes propres yeux, je les ai décrites avec le plus d'exactitude qu'il m'a été possible. Pour ce qui est de l'exactitude des descriptions des autres Espèces, j'en donne pour garants les Auteurs qui me les ont fournies. Aussi, afin qu'on sache à quoi s'en tenir; ai-je marqué de * * les Espèces dont j'ai fait la description sur l'Animal même; & de * seulement celles que je n'ai vues qu'en partie, celles dont j'ai vu seulement les parties d'où j'ai tiré les caractères. Le reste de leur des-

cription, & les descriptions entieres des Espèces qui n'ont aucune marque, je les ai faites d'apres les différens Auteurs cités dans cet Ouvrage : & j'ai toujours préféré la description de ceux qui ont dit avoir vû l'Animal.


Ce premier Volume ne contiendra que les deux premieres Classes, celle des Quadrupedes, & celle des Cetacées. Si cet Essai est agréé du Public, le desir que j'ai de lui plaire, & de lui être utile, me fera travailler avec ardeur à achever de mettre les autres Classes en état de lui être présentées.

Les Figures que j'ai fait graver, ont toutes été dessinées sur l'original. Mon intention étoit d'en donner au moins une de chaque Genre; mais l'impossibilité, dans laquelle je me suis trouvé, d'avoir les originaux nécessaires, jointe à ce qu'elles m'ont paru assez peu utiles, puisqu'il n'y a que la plupart des caractères ne sont tirés que du nombre des *dents* & des *doigts*, m'a déterminé à n'en donner qu'un petit nombre : & ce petit nombre contient des parties d'Animaux, qui, quoique pour la plupart assez communs, n'ont jamais été bien décrits. Je ferai mon possible pour remplir ma premiere intention dans les Classes suivantes; c'est-à-dire, que je donnerai au moins une Figure de chaque Genre; parce que le plus souvent il ne s'agira plus de nombres, mais de formes, toujours difficiles à saisir par la simple description : & toutes ces Figures seront gravées d'après nature.

ERRATA.

		Præcedens, <i>semper lege</i> , præcedens.			
Page	Ligne	13. qui est, <i>liset</i> , qui en.			
4		20. CETACE'S, <i>liset</i> , CETACIS.			
6	17 &	38. CRUSTACE'S, <i>liset</i> , CRUSTACE'ER.			
7		29. CETACE'S, <i>liset</i> , CETACE'S.			
18		39. undique, <i>lege</i> , undique,			
28		7. <i>Kelm. liset</i> , <i>Klein</i> .			
36	14, 17 &	25. eum, <i>lege</i> , illud.			
40		34. SCHILVERKEN, <i>liset</i> , SCHILVERKEN.			
69		6. Bezoarticus, <i>lege</i> , Bezoarticus.			
		8. Bezoarticus, <i>lege</i> , Bezoarticus.			
73		4. crassia, <i>lege</i> , crassa.			
75		16. L'AMBLIN, <i>liset</i> , L'AMBLIN.			
88		23. Goenlandica, <i>lege</i> , Groenlandica.			
140		33. 1° pede, <i>lege</i> , 1 $\frac{1}{2}$ pede.			
		39. 2° pollices, <i>lege</i> , 2 $\frac{1}{2}$ pollices.			
146		12. Au, <i>lege</i> , An.			
170		33. 7 pollicum, <i>lege</i> , 7 $\frac{1}{2}$ pollicum.			
175		14. 1 $\frac{1}{2}$ pouce, <i>liset</i> , 1 $\frac{1}{2}$ pouce.			
196		18. C aspid, <i>lege</i> , Cay aspid.			
201		29. Caput, <i>lege</i> , Caput.			
215		14. Fig. 2, <i>lege</i> , Fig. 4. 2.			
241		26. BLARAR, <i>liset</i> , BLARAR.			
246		37. habet l ata, <i>lege</i> , habet laans			
259		40. d'argenteré, <i>liset</i> , d'argenteré.			
270		3. variegata, <i>lege</i> , variegata.			
310		37. Afina, <i>lege</i> , Afina.			
312		17. Bifon, 1. 6. <i>lege</i> , Bifon, 41 6.			
		18. — Amériquin, 1. 7. <i>lege</i> , — Amériquin, 41 7.			
312		24. Bandhirs, <i>lege</i> , Brandhirs.			
319		19. Flædermus, <i>lege</i> , Flædermus.			
347		11. Maxillâ, <i>lege</i> , Maxilla,			
352		6. Gesh. <i>lege</i> , Gen.			
		13. Gen. <i>lege</i> , Gesh.			
375		4. en, <i>lege</i> , ex.			

REGNUM



REGNUM
ANIMALE
 IN CLASSES IX.
 DISTRIBUTUM.

LE REGNE
ANIMAL
 DIVISÉ
 EN IX. CLASSES.

ANTEQUAM caractères uniuscujusque classis enumeremus, observandæ sunt rationes ob quas in hoc ordine classes istas reponimus. Agemus primò de Animalibus, quæ majorem habent cum homine analogiam: & deinde de Animalibus, quæ ab ista analogia magis recedunt. Inter Animalia, alia, hominis modo, sunt *Sanguinea*; id est, liquor rubicundus circulari & indefinenti motu per ipsorum arterias & venas fluit, cui liquori rubicundo *Sanguinis* nomen inditum est: alia verò sunt *Exanguia*; id est, liquore illo rubicundo omninò carent. Inter *Sanguinea*, alia *Pulmonibus* ut homo; alia *Branchiis* spirant. Ex istis quæ *Pulmoni-*

AVANT d'établir les caractères propres à distinguer chaque classe, il est à propos de faire les observations, qui m'ont conduit à leur donner à chacune le rang qu'elle occupe. Je commence par les Animaux qui ont le plus d'analogie avec l'homme, & finis par ceux qui en ont le moins. Parmi les Animaux qui habitent notre globe, les uns ont du *Sang* analogue à celui de l'homme; c'est-à-dire qu'il circule dans leurs artères & leurs veines une liqueur rouge à laquelle on a donné le nom de *Sang*: & les autres n'ont point cette liqueur rouge. Parmi ceux qui ont du *Sang*, les uns respirent, comme l'homme, par des *Poumons*: & les autres respirent par des *Ouies*. De ceux qui respirent par des *Poumons*, les uns ont,

A

comme l'homme, deux *Ventricules* au cœur : & les autres n'en ont qu'un. Parmi ceux qui ont deux *Ventricules* au cœur, les uns, comme l'homme, sont *Vivipares*, & allaitent leurs petits : & les autres sont *Ovipares*. Parmi ceux qui sont *Vivipares*, & qui allaitent leurs petits, les uns ont, comme l'homme, du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & quatre *Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme : & les autres ont le corps nud, & au lieu de pieds, ils ont des *Nageoires charnues*.

La première classe est composée des Animaux qui ont avec l'homme ces cinq analogies ; c'est-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du Sang ; qu'ils respirent par des *Poumons* ; qu'ils ont deux *Ventricules* au cœur ; qu'ils sont *Vivipares* & allaitent leurs petits ; & qu'ils ont du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & quatre *Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme.

Dans la seconde sont ceux qui n'ont avec l'homme que les quatre premières analogies ; c'est-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du sang ; qu'ils respirent par des *poumons* ; qu'ils ont deux *ventricules* au cœur ; & qu'ils sont *vivipares*, &

bus spirant ; alia, ut homo, duobus gaudent in corde *Ventriculis* : alia verò unico tantum donantur. Inter ista quæ duos habent in corde *Ventriculos*, alia, ut homo, sunt *Vivipara* ; id est, vivos foetus pariunt, eosque lacte alunt : alia sunt *Ovipara*. Inter *Vivipara*, alia, ut homo, corpus habent *Pilosum*, saltem in aliqua sui parte, & quatuor donantur *Pedibus*, manibus & pedibus hominis respondentibus : alia verò corpus habent nudum, & *pilis* destitutum, *pinnisque* carnosiss, pedum loco, prædita sunt.

In prima classe continentur ea quæ in quinque illis capitibus cum homine conveniunt ; id est, quæ, sicut homo, sunt *sanguinea* ; *pulmonibus* spirant ; duobus gaudent in corde *Ventriculis* ; vivos foetus pariunt, eosque lacte alunt ; & corpus habent *pilosum*, saltem in aliqua sui parte, & quatuor donantur *pedibus*, manibus & pedibus hominis respondentibus.

In secunda continentur ea, quæ in quatuor tantum primis capitibus cum homine conveniunt ; id est, quæ, sicut homo, sunt *sanguinea* ; *pulmonibus* spirant ; duos habent in corde *ventriculos* ; & vivos foetus pariunt, eosque

laſſe aiant; quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod corpus habeant nudum, & pilis deſtitutum, pinnisſque carnoſis, pedum loco, prædita ſint.

In tertia continentur ea, quæ in tribus tantum primis capitibus cum homine conveniunt; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *fanguinea; pulmonibus ſpirant; & duos habent in corde ventriculos*: quæ verò ab homine diſſerunt in eo quod ſint *ovipara*.

In quarta continentur ea, quæ in duobus tantum primis capitibus cum homine conveniunt; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *fanguinea*; & *pulmonibus ſpirant*: quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod *unicum habeant in corde ventriculum*.

In quinta & ſexta continentur ea, quæ in primo tantum capite cum homine conveniunt; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *fanguinea*: quæ verò ab homine diſcrepant in eo quod *branchiis ſpirent*.

In tribus ultimis claſſibus continentur ea, quæ in nullis ex iſtis quinque capitibus cum homine conveniunt.

Didicitur ergò regnum Animale in claſſes novem.

In prima claſſe continentur Animalia, quæ corpus

alaient leurs petits: mais qui en diſſèrent en ce qu'ils ont le corps nud & ſans poil, & en ce qu'à lieu de pieds, ils ont des *nageoires charnues*.

Dans la troiſième ſont ceux, qui n'ont avec l'homme que les trois premières analogies; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du ſang; qu'ils reſpirent par des *poumons*; & qu'ils ont deux *ventricules* au cœur: mais qui eſt diſſèrent en ce qu'ils ſont *ovipares*.

Dans la quatrième ſont ceux, qui n'ont avec l'homme que les deux premières analogies; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du ſang; & qu'ils reſpirent par des *poumons*: mais qui en diſſèrent en ce qu'ils n'ont qu'un *ventricule* au cœur.

Dans la cinquième & la ſixième, ſont ceux qui n'ont avec l'homme que la première analogie; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du ſang: mais qui en diſſèrent en ce qu'ils reſpirent par des *ouies*.

Les trois dernières claſſes ſont compoſées des Animaux qui n'ont avec l'homme aucune de ces cinq analogies.

Je diviſe donc le regne Animal en neuf claſſes.

La première comprend les Animaux qui ont du poil, au

moins à quelque partie du corps : & quatre pieds. Tous ceux-là, comme je l'ai dit ci-dessus, ont du sang : respirent par des poumons : ont deux ventricules au cœur : & leurs femelles sont vivipares, & allaitent leurs petits. On leur a donné le nom de QUADRUPÈDES.

Dans la seconde classe sont les Animaux qui ont le corps nud & allongé : des nageoires charnues : & la queue platte horizontalement. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du sang : respirent par des poumons : ont deux ventricules au cœur : & leurs femelles sont vivipares, & allaitent leurs petits. On les appelle CETACÉS. Ils vivent toujours dans la mer.

Dans la troisième sont ceux, qui ont le corps couvert de plumes : un bec d'une matière analogue à la corne : deux ailes : & deux pieds. Tous ceux-là ont du sang : respirent par des poumons : ont deux ventricules au cœur : & leurs femelles sont ovipares. On leur a donné le nom d'OISEAUX.

Dans la quatrième sont ceux, qui ont, ou le corps nud, & quatre pieds : ou le corps couvert d'écaillés, & quatre pieds, ou point de pieds : & qui respirent par des poumons. Tous ceux-là ont du sang : & n'ont qu'un ventricule au cœur. Quelques-unes

habent pilosum, saltem in aliqua sui parte : & pedes quatuor. Omnia ista, ut supra notavi, sunt sanguinea : pulmonibus spirant : duobus gaudent in corde ventriculis : eorumque foeminae vivos foetus pariunt, eosque lacte alunt. QUADRUPEDA vocantur.

In secunda classe continentur ea, quæ corpus habent nudum & elongatum : pinnas carnosas : & caudam horizontaliter planam. Omnia ista, sicut & præcedentia, sunt sanguinea : pulmonibus spirant : duobus gaudent in corde ventriculis : eorumque foeminae vivos foetus pariunt, eosque lacte alunt. CETACEA nominantur. Perpetuò in mari degunt.

In tertia continentur ea, quæ corpus habent plumis tectum : rostrum corneum : alas duas : & pedes duos. Omnia ista sunt sanguinea : pulmonibus spirant : duos habent in corde ventriculos : eorumque foeminae sunt oviparae : AVIUM nomine donantur.

In quarta continentur ea, quæ, vel habent corpus nudum, & pedes quatuor : vel corpus squamosum, & pedes vel quatuor, vel nullos : quæque pulmonibus spirant. Omnia ista sunt sanguinea : & unico in corde ventriculo donan-

tur. Horum fœminæ quædam sunt *vivipara*: aliæ sunt *ovipara*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intra corpus in quibusdam fœminis; quæ idcirco *vivos* foetus pariunt: in aliis verò fœminis incubatio fit extra corpus. Omnia hujus classis Animalia *repunt*; quamobrem ea REPTILIA vocavi.

In quinta continentur ea quæ *pinna*s habent *cartilagineas*: quæque per *foramina* ad *branchias* aperta spirant. Omnia hujus classis Animalia sunt *sanguinea*: & perpetuò in aqua vitam agunt. Ipsorum fœminæ quædam sunt *vivipara*; aliæ verò *ovipara*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intra corpus in quibusdam fœminis, quæ deinde *vivos* foetus pariunt: in aliis verò fœminis incubatio fit extra corpus. PISCES CARTILAGINEI vocantur.

In sexta continentur ea, quæ *pinna*s habent *officulis constantes*: quæque *branchiis tegmine mobili*, *partibus ossibus constante*, coopertis spirant. Omnia ista, sicut & præcedentia, sunt *sanguinea*; perpetuoque in aqua degunt. Fœminæ eorum fere omnes sunt *ovipara*. *Ova* concipiunt valde exigua, quæ gallice

de leurs femelles sont *vivipares*: les autres sont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*; mais dans quelques-unes l'incubation se fait dans le corps de l'Animal, qui fait ensuite ses petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation se fait hors du corps. Tous les Animaux de cette classe *rampent*; c'est pourquoi je leur ai donné le nom de REPTILES.

Dans la cinquième sont ceux qui ont des *nageoires cartilagineuses*: & qui respirent par des *ouies*, vis-à-vis desquelles sont ouverts des *trous*. Tous les Animaux de cette classe ont du *sang*: & vivent toujours dans l'eau. Quelques-unes de leurs femelles sont *vivipares*: les autres sont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*, dont l'incubation se fait dans quelques-unes dans le corps de l'Animal, qui fait ensuite ses petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation se fait hors du corps. On les appelle POISSONS CARTILAGINEUX.

Dans la sixième sont ceux qui ont des *nageoires composées d'osselets*: & qui respirent par des *ouies* sur lesquelles sont des *couvertres mobiles*, *composés de parties osseuses*. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du *sang*: & vivent toujours dans l'eau. Presque toutes leurs femelles sont *ovipares*. Elles ont des *œufs* extrêmement petits, auxquels

on a donné le nom de *frais*. J'appelle les Animaux de cette classe POISSONS PROPREMENT DITS.

Dans la septième sont ceux qui ont des *antennes* à la tête & au moins huit *pieds*. Leur corps est couvert d'une enveloppe qui se *renouvelle*, c'est-à-dire, que, lorsque, par l'accroissement du corps de l'Animal, elle est devenue trop petite pour le contenir, elle se détache naturellement du corps, sur lequel il s'en est produit une nouvelle. C'est ce qu'on appelle *changer de peau*. On appelle les Animaux de cette classe CRUSTACÉS.

La huitième classe comprend tous les Animaux, qui subissent plusieurs *métamorphoses* avant d'être parvenus à leur accroissement parfait; c'est-à-dire, qui naissent sous une forme différente de celle qu'ils doivent avoir dans la suite. Ce n'est qu'après avoir subi la dernière *métamorphose* qu'ils sont en état de multiplier leur espèce. Tous ces animaux ont, avant leur dernière *métamorphose*, plusieurs *stigmates*, ou organes de la respiration; & après leur dernière *métamorphose*, ils ont des *antennes* à la tête; toujours *fixes* *pieds*, & jamais d'avantage. Ils changent de peau, comme les CRUSTACÉS. Ces changemens ne se font dans le plus grand nom-

frais vocantur. Hujus classis Animalia PISCES PROPRIE DICTOS nominavi.

In septima continentur ea, quæ caput habent *antennis* instructum: & *pedes octo*, & ultra. Corpus ipsorum tegitur tegmine *mutabili*; id est, tegmine, quod, cum, incremento corporis, ad illud continendum sit strictius, naturaliter à corpore avellicur, supra quod corpus novum producitur tegmen: quod gallice dicitur, *changer de peau*. Hujus classis Animalia CRUSTACEA vocantur.

In octava continentur omnia Animalia, quæ, antequam perveniant, ad ultimum incrementum, diversas formas induunt; id est, quæ sub unâ nascuntur formâ, diversâ ab illis quas postea induere debent. Speciem suam multiplicare nequeunt, nisi post ultimam *métamorphosim*, post ultimam formam indutam. Omnia ista Animalia ante ultimam *métamorphosim*, plura habent *stigmata*, aut respirationis organa: & post ultimam *métamorphosim*, caput habent *antennis* instructum: & *pedes sex*, nec ultra. Tegmen habent *mutabile*, sicut & CRUSTACEA: attamen fere omnia tegmine

non mutant; nisi ante ultimam formam indutam: pauca verò sunt quæ post ultimam *métamorphosim* tegmine mutant. Sola ista Animalia INSECTORUM nomine donavi.

In nona & ultima classe continentur Animalia, quæ corpus habent *retractibile*, aut saltem corporis aliquam partem *retractibilem*; id est, quorum corpus, aut saltem corporis aliqua pars sponte contrahi, aut extendi potest: quæque nec *antennas* habent, nec *pedes*, nec *stigmata*. Hujus classis Animalia VERMES dicuntur.

bre, qu'avant d'avoir subi la dernière *métamorphose*: il y en a très-peu auxquels ils arrivent après avoir pris la dernière forme. Ces Animaux sont les seuls auxquels je donne le nom d'INSECTE.

Dans la neuvième & dernière classe sont tous les Animaux qui ont le corps, ou du moins quelque partie du corps, capable d'un mouvement de contraction & d'extension; de sorte que ce corps, ou cette partie du corps peut occuper plus ou moins d'espace à volonté: & qui n'ont ni *antennes*, ni *pièds*, ni *stigmates*. On a donné à ces Animaux le nom de VERS.

CLASSIUM characteres.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

Horum character est
Corpus pilosum, saltem in aliqua sui parte:
Et pedes quatuor.

CLASSIS II. CETACEA.

Horum character est
Corpus nudum & elongatum:
Pinnæ carneæ:
Cauda horizontaliter plana,

CARACTERES des différentes Classes.

CLASSE I.

LES QUADRUPÈDES.

Leur caractère est
D'avoir du poil au moins à quelque partie du corps:
Et quatre pieds.

CLASSE II. LES CÉTACÉS.

Leur caractère est
D'avoir le corps nud & allongé:
Des nageoires charnues:
Et la queue plane horizontalement.

CLASSE III.

LES OISEAUX.

Leur caractère est

D'avoir le corps couvert de plumes :

Un bec d'une matière analogue à la corne ;

Deux ailes :

Et deux pieds.

CLASSE IV.

LES REPTILES.

Leur caractère est d'avoir

Ou le corps nud ;

Et quatre pieds ;

Ou le corps couvert d'écailles :

Et quatre pieds, ou point de pieds ;

Et de respirer par des poumons.

CLASSE V.

LES POISSONS

Cartilagineux,

Leur caractère est

D'avoir des nageoires cartilagineuses :

Et de respirer par des ouies, vis-à-vis desquelles sont ouverts des trous.

CLASSE VI.

LES POISSONS

proprement dits.

Leur caractère est

D'avoir des nageoires composées d'osselets ;

CLASSIS III.

AVES.

Harum character est

Corpus plumis tectum :

Rostrum corneum :

Alæ duæ :

Pedes duo.

CLASSIS IV.

REPTILIA.

Horum character est

Vel corpus nudum :

Et pedes quatuor ;

Vel corpus squamosum :

Et pedes vel quatuor, vel nulli ;

Et pulmonibus spirare.

CLASSIS V.

PISCES

Cartilaginei,

Horum character est

Pinnæ cartilaginæ :

Et per foramina ad branchias aperta spirare.

CLASSIS VI.

PISCES

proprie dicti.

Horum character est

Pinnæ ossiculis constantes :

Et

LE REGNE ANIMAL. 9

Et branchiis, tegmine mobili, partibus offeis constante, coopertis spirare.

Et de respirer par des ouies sur lesquelles sont des couvercles mobiles, composés de parties osseuses.

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

CRUSTACEA.

LES CRUSTACÉES.

Horum character est
Caput antennis instructum:
Et pedes octo & ultra.

Leur caractère est
D'avoir des antennes à la tête:
Et au moins huit pieds.

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

INSECTA.

LES INSECTES.

Horum character est
Ante ultimam methamorphosim, plura stigmata,
aut respirationis organa;

Leur caractère est
D'avoir, avant leur dernière métamorphose, plusieurs stigmates, ou organes de la respiration;

Et post ultimam methamorphosim,
Caput antennis instructum:
Et pedes sex.

Et après leur dernière métamorphose,
Des antennes à la tête:
Et six pieds.

CLASSIS IX.

CLASSE IX.

VERMES.

LES VERS.

Horum character est
Corpus retractibile, aut saltem corporis aliqua pars retractibilis:

Leur caractère est
D'avoir le corps, ou du moins quelque partie du corps capable d'un mouvement de contraction & d'extension:

Nec antennæ:
Nec pedes:
Nec stigmata,

Et de n'avoir ni antennes:
Ni pieds:
Ni stigmates,





C L A S S E I.

LES QUADRUPÈDES.

C L A S S I S I.

QUADRUPEDA.

CATALOGUS AUTHORUM.


- ALDRO. Avl.** . . . Ulissi Aldrovandi Philosophi ac Medici Bononiensis Historiam Naturalem in gymnasio Bononiensi profitentis, Ornithologia; hoc est; de Avibus hist. libri XII. Bononiæ 1559. in folio.
- Aldro. Pisc.** . . . Ulissi Aldrovandi Philosophi ac Medici Bononiensis de Piscibus libri V. & de Cetiis liber 1. &c. Bononiæ 1638. in folio.
- Aldro. Quadr. bisf.** . . . Ulissi Aldrovandi Patricii Bononiensis, Quadrupedum omnium Bisulcorum Historia, &c. Bononiæ 1642. in folio.
- Aldro. Quadr. dig. ov.** . . . Ulissi Aldrovandi Patricii Bononiensis de Quadrupedibus digentis oviparis, libri II. &c. Bononiæ 1643. in folio.
- Alaro. Quadr. dig. viv.** . . . Ulissi Aldrovandi Patricii Bononiensis de Quadrupedibus digitatis viviparis, libri tres &c. Bononiæ 1645. in folio.
- Aldro. Quadr. solid.** . . . Ulissi Aldrovandi Patricii Bononiensis de Quadrupedibus solidipedibus volumen integrum, &c. Bononiæ 1639. in folio.
- Art. Gen. Pisc.** . . . Petri Artedi Sueci genera Piscium, in quibus systema totius Ichthyologiae proponitur, cum classibus, ordinibus, generum characteribus, specierum differentiis, observationibus plurimis, &c. Ichthyologiae pars III. Lugduni Batavorum 1738. in octavo.
- Art. Synon. Pisc.** . . . Petri Artedi Angermannia-Sueci Synonymia nominum Piscium fere omnium; in qua recensio fit nominum Piscium, omnium facile authorum, qui unquam de Piscibus scripsere: uti Græcorum, &c. Ichthyologiae pars IV. Lugduni Batavorum 1738. in octavo.
- Barr. Hist. Fr. eq.** . . . Essai sur l'Histoire Naturelle de la France équinoxiale, eu dénombrement des plantes, des Animaux, &c. Par Pierre Barrere, correspondant de l'Académie des Sciences de Paris, &c. A Paris 1741. in-12.
- Bell. de Aquar.** . . . Petri Bellonii Cenomani de Acustilibus libri duo, &c. Parisiis 1553. in octavo. Oblong.
- Bell. obs.** . . . Petri Bellonii Cenomani plurimarum singularium & memorabilium rerum in Græcia, &c. Observationes tribus libris expressæ, &c. Raphaelengii 1605. in folio.
- Bont. Ind. ori.** . . . Jacobi Bontii, Medici civitatis Batavæ novæ in Java ordinarij Historiæ Naturalis & medicæ Indiæ orientalis libri sex, &c. A Gulielmo Pissone, in ordinem redacti, &c. Amstelodami 1638. in folio.
- Cat.** . . . Histoire Naturelle de la Caroline, la Floride, & les Isles Bahama, contenant les dessein des Oiseaux, Animaux, &c. Par Marc Catesby, de la Société Royale. Londres 1743. in folio.
- Charlet. exer.** . . . Gualteri Charleroni exercitationes, de differentiis & nominibus Animalium, &c. Oxoniæ 1677. in folio.
- Clus. exot.** . . . Caroli Clusii Atrebatii, Anlæ Cæsareæ quondam familiaris, exotico-rum libri decem, &c. Raphaelengii 1605. in folio.
- Colum. aquat.** . . . Aquatilium & terrestrium aliquot Animalium aliarumque naturalium rerum observationes, Fabio Columna anthore. Romæ 1616. in quarto.
- Des March.** . . . Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, Isles voisines & à Cayenne, fait en 1725, 1726 & 1727, &c. A Paris 1730. in-12. 4 vol.
- Edwards.** . . . Histoire Naturelle de divers Oiseaux qui n'avoient point encote été figurés ni décrits, &c. Par George Edwards, traduit de l'Anglois; par M. D. de la S. R. A Londres 1743. in quarto.
- Eusf. Nieremb.** . . . Joannis Eusebii Nierembergii Madritensis, ex Societate Jesu, in Academia Regia Madritensi, Physiologiae Professoris, Historia Naturæ maxime peregrinæ libri XVI. distincta. Antverpiæ 1633. in folio.

- Faun. Suec. Linn.* Caroli Linnei Medic. & Boran. Prof. Upsal. horti Academici præf. Acad. Imperial. Montpelienf. Stockholm. Upsal. Soc. hujusque Secretar. Fauna Suecica sistens Animalia sœcæ regni, &c. Stockholm 1746, in-octavo.
- Fern. Hist. N. Hist.* Historiæ Animalium & Mineralium Novæ Hispaniæ liber unus, in sex tractatus divisus, Francisco Fernandez, Philippi secundi primario Medico Auctore.
- Flor. Sin.* Flora Sinenfis à P. Michaële Boyen, Soc. Jesu, 1656.
- Gaz. Per.* Gazophilacii usaturæ, & artis decades à Jacobo Petiver Pharmacop. Londin. & Regiz Societatis socio. in-folio.
- Gaz. Rup. Bess.* Gazophilacium rerum naturalium è regno vegetabili, Animalium & minerali depromptarum, &c. Opera Michaelis Ruperi Besseri, Lipsiæ & Francofurti 1716, in-folio.
- Gesn. Avi.* Conradi Gesneri Tigurini, Medicinæ & Philosophiæ Professoris in ichologia Tigurina, Historiæ Animalium liber III, qui est de Avium natura. Francofurti. 1585, in-folio.
- Gesn. Icon. Aquat.* Icones Animalium Aquatilium in mari & dulcibus aquis degentium, &c. Tiguri 1560, in-folio.
- Gesn. Icon. Avi.* Icones Avium omnium, quæ in Historia Conradi Gesneri describuntur, &c. Editio secunda, Tiguri 1560, in-folio.
- Gesn. Icon. Quadr.* Icones Animalium Quadrupedum viviparorum & oviparorum, &c. Editio secunda. Tiguri 1560, in-folio.
- Gesn. Pisc.* Conradi Gesneri Medici Tigurini, Historiæ Animalium liber IV, qui est de Piscium & Aquatilium animantium natura. Tiguri 1558, in-folio.
- Gesn. Quadr.* Conradi Gesneri Medici Tigurini, Historiæ Animalium lib. 1. de Quadrupedibus viviparis. Tiguri 1551, in-folio.
- Hernand. Hist. Mex.* Nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum historia, à Francisco Hernandez, Medico, in Indis præstantissimo, primùm compilata, dein à Nardo Antonio Reccho in volumen digesta, &c. Romæ 1651, in-folio.
- Hist. de l'Acad.* Histoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris, in-quarto.
- Hist. de Isl. & de Gro.* Histoire Naturelle de l'Islande, du Groenland, du détroit de Davis & d'autres pays situés sur le Nord; traduite de l'Allemand, par M. Anderson, &c. A Paris 1750, in-12, a vol.
- Hist. Nat. Gen. & Part.* Histoire Naturelle Générale & Particulière, avec la description du Cabinet du Roi. A Paris, in-quarto & in-12.
- Jo. de Laet.* Novus orbis, seu descriptionis Indiæ Occidentalis libri 18. Auctore Joanne de Laet Antwerp. &c. Lugduni Batavorum 1633, in-folio.
- Jonst. Avi.* Historiæ Naturalis de Avibus libri VI. cum zneis figuris, à Joanne Jonstono Medicinæ Doctor. Amstelodami 1657, in-folio.
- Jonst. Pisc.* Historiæ Naturalis de Piscibus & Cetis libri V. cum zneis figuris, à Joanne Jonstono Medicinæ Doctor. Amstelodami 1657, in-folio.
- Jonst. Quadr.* Historiæ Naturalis de Quadrupedibus libri cum zneis figuris, à Joanne Jonstono, Medicinæ Doctor. Amstelodami 1657, in-folio.
- Klein. Quadr.* Jacobi Theodori Klein, Secr. Civ. Ged. Soc. Reg. Lond. & Acad. Scient. Bonon. Membri, Quadrupedum dispositio, brevique Historia Naturalis. Lipsiæ 1751, in-quarto.
- Kämpf. Amm.* Amoenitatum exoticarum Politico-Philico-Medicarum fasciculi V. &c. Auctore Engelberto Kämpfero. Leningvii 1712, in-quarto.
- Kolbe.* Description du Cap de Bonne-Espérance, où l'on trouve tout ce qui concerne l'Histoire Naturelle du pays, &c. Tirée des Mémoires de M. Pierre Kolbe, Maître es Arts. A Amsterdam 1741, in-12.
- Linn. Syst. Nat. ed. 6.* Caroli Linnei Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profess. Upsal. Systema Naturæ, sistens regna tria naturæ in classes & ordines genera & species redacta, Tabulæque zneis illustrata. Editio sexta. Stockholm 1748, in-octavo.

- Marogr. Hist. Br.*.... Georgi Marogravi de Liebfild, Mincii Germani, Historiæ rerum naturalium libri octo, in-folio.
- Mus. Bessl.*.... Rariora Muli Bessleriani, quæ olim Basilii & Michael Rupertus Besslerus collegerunt, &c. Illustrata a Jeanne Henrico Lochuero, &c. 1716, in-folio.
- Mus. Worm.*.... Muleum Wormianum, seu Historia rerum rariorum tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm, Med. Doct. &c. Amstelodami 1655, in-folio.
- Pison. Hist. Nat.*.... Gulielmi Pisonis Medici Amstelodamensis, Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Occidentalis, &c. Libri quinque. Amstelodami. 1658, in-folio.
- Prosp. Alp. Egypt.*.... Prosperi Alpini Marcilicensis Philosophi, Medici, &c. Historiæ Egypti naturalis, &c. Lugduni Batavorum. 1733, in-quarto.
- Raj. Syn. Quadr.*.... Synopsis Methodica Animalium Quadrupedum, & Serpentinæ Generis, &c. Authore Joanne Rajo. Londini. 1693, in-octavo.
- Rzac. Act.*.... Auditarium historiæ naturalis curiæ Regni Poloniæ, Magni Ducatus Lithuanicæ, annexarumque Provinciarum, per P. Gabrielem Rzaczynski, Soc. Jesh. Concinnatum, &c. Gedani. 1745, in-quarto.
- Rzac. Hist. Nat. Pol.*.... Historia naturalis curiæ Regni Poloniæ, Magni Ducatus Lithuanicæ, annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX. divisâ, &c. à P. Gabriele Rzaczynski, Soc. Jesh. Sandomivix. 1721, in-quarto.
- Seb.*.... Locupletissimi rerum naturalium Thesauri accurata descriptio, & iconibus artificiosissimis expressio, &c. Ex toto terrarum orbe collegit, digessit, descripsit, & depingendum curavit Albertus Seba, &c. Amstelædami. 1734, in-folio. 2 vol.
- Sloane.*.... A Voyage To The Islands, Madera, Barbadoes, Nieves, S. Christophers, And Jamaica; With The Natural History, &c. by Sir Hans Sloane, Bart. London. 1725, in folio.
- Transf. Phil.*.... Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres, traduites par M. de Bremond. A Paris, in-quarto.
- Voy. de la B. de Hud.*.... Voyage de la Baye de Hudson, fait en 1746 & 1747, pour la découverte du passage de Nord-Ouest, &c. Traduit de l'Anglois de M. Henry Ellis, &c. A Paris 1749. in-12. 2 vol.
- Voy du Lev.*.... Relation d'un voyage du Levant, &c. Par M. Piton de Tournefort &c. A Paris. 1717, in-quarto. 2 vol.



CLASSE I.



CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

CLASSE I.

LES QUADRUPÈDES.



ORUM character est
Corpus pilosum ,
saltem in aliqua
sui parte :

Et pedes quatuor.

Omnia QUADRUPEDA
sunt sanguinea : pulmonibus
spirant : duos habent in corde
ventriculos : eorumque foeminae
vivos foetus pariunt, eosque
lacte alunt.

Quædam sunt edentula ,
ut Myrmecophaga , &c : Alia
omnia sunt dentata. Inter
dentata, alia dentes habent
tantummodo molares (1) ,
ut Tardigradus , &c. Alia
dentes molares & caninos



EUR caractere est
D'avoir du poil , au
moins à quelque
partie du corps :

Et quatre pieds.

Tous les QUADRUPÈDES ont
du sang : respirent par des pou-
mons : ont deux ventricules au
cœur : & leurs femelles sont
vivipares & allaitent leurs petits.

Quelques-uns n'ont point du-
tout de dents , comme le Four-
miller , &c. Le plus grand nom-
bre en est muni. De ces derniers
les uns n'ont que des dents mo-
laires (1) , comme le Pareffeux ,
&c : d'autres n'en ont que des

(1) Dentes molares vocantur isti ,
qui sunt posteriorum Maxillæ partem occu-
pant.

(1) On appelle dents molaires , celles
qui sont placées à la partie postérieure de la
mâchoire.

molaires & des *canines* (1), comme l'*Elephant* &c: d'autres enfin en ont des *incisives* (2). Parmi ceux-ci, les uns n'ont des dents *incisives* qu'à la mâchoire inférieure seulement: & les autres en ont aux deux mâchoires. De ceux qui n'ont des dents *incisives* qu'à la mâchoire inférieure, les uns n'en ont que six, comme le *Chameau*: les autres en ont huit, comme le *Bœuf*, le *Cerf*, &c. Parmi ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires, les uns ont la corne du pied d'une seule pièce, comme le *Cheval*: d'autres ont le pied fourchu (3), comme le *Cochon*: d'autres ont trois doigts *ongulés* (4) à chaque pied, comme le *Rhinoceros*: d'autres ont quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière: & de ces derniers, les uns n'ont que

(1), ut *Elephas*, &c. alia denique dentes habent *incisores* (2). Horum ultimorum alia dentes habent *incisores* in maxilla inferiore tantum: alia in maxilla utraque. Inter prima ista, alia dentes habent *incisores* in maxilla inferiore sex, ut *Camelus*: alia dentes habent *incisores* in maxilla inferiore octo, ut *Bos*, *Cervus*, &c. Horum quæ dentes habent *incisores* in maxilla utraque, alia pedibus *solidungulis* (3) donantur, ut *Equus*: alia pedibus *bifulcis* (4), ut *Sus*: alia pedibus *terungulatis* (5) anticæ & posticæ, ut *Rhinoceros*: alia pedibus *quaterungulatis* anticæ, *terungulatis* posticæ: inter quæ alia dentes habent *incisores* in utraque maxilla duo tantum, ut *Hydrochærus*:

(1) On appelle *dents canines*, celles qui sont placées entre les *molaires* & les *incisives*. Elles sont ordinairement pointues.

(2) On appelle *dents incisives* celles qui sont placées à la partie antérieure de la mâchoire.

(3) On appelle *pieds fourchus* ceux qui ont quatre doigts *ongulés*, & qui ne s'appuyent que sur deux, en marchant.

(4) On appelle *doigts ongulés* ceux dont l'extrémité est toute entourée de l'ongle, & qui, en marchant s'appuyent sur l'ongle même.

(1) *Dentes canini* dicuntur, qui *molares* inter & *incisores* sui sunt. Hi communiter sunt acuti.

(2) *Dentes incisores* nuncupantur, qui anteriorem maxillæ partem obrirent.

(3) *Pedes solidunguli* sunt illi, quorum extremitas unguis solidâ undique circumdatur.

(4) *Pedes bifulci* dicuntur, qui quatuor habent digitos *ungulatos*, quique duobus tantum digitis incedunt.

(5) *Pedes ungulati* vocantur illi, quorum extremitas digitorum *ungula* nudique circumdatur, quique ungulis ipsis incedunt.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. 19

alia verò decem habent dentes *incisores* in utraque maxilla, ut *Tapirus* : alia pedibus donantur *quaterungulatis* anticè & posticè, ut *Hippopotamus* : alia tandem digitis *unguiculatis* (1) prædita sunt. Inter illa quæ digitos habent *unguiculatos*, alia dentes habent *incisores* in utraque Maxilla duo tantum, ut *Hystrix*, *Lepus*, *Mus*, &c : alia dentes *incisores* in utraque Maxilla quatuor, ut *Simia* &c : alia dentes *incisores* in maxilla superiore quatuor, in inferiore sex, ut *Prosimia* &c : alia dentes *incisores* in Maxilla superiore sex, in inferiore quatuor, ut *Phoca* : alia dentes *incisores* in utraque maxilla sex, ut *Canis*, *Felis*, *Lutra*, &c : alia dentes *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore octo, ut *Talpa* : alia denique dentes *incisores* in maxilla superiore decem : in inferiore octo, ut *Philander*.

deux dents *incisives* à chaque mâchoire, comme le *Cabiai* : & les autres en ont dix à chaque mâchoire, comme le *Tapir* ou *Manipouris* : d'autres ont quatre doigts *ongulés* à chaque pied, comme l'*Hippopotame* : d'autres enfin ont les doigts *onguiculés* (1). Parmi ceux qui ont les doigts *onguiculés*, les uns n'ont que deux dents *incisives* à chaque mâchoire, comme le *Porc-Epic*, le *Lievre*, le *Rat*, &c : d'autres ont quatre dents *incisives* à chaque mâchoire, comme le *Singe*, &c : d'autres en ont quatre à la mâchoire supérieure, & six à l'inférieure, comme le *Maki*, &c : d'autres en ont six à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure, comme le *Phocas* : d'autres en ont six à chaque mâchoire, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Loutre*, &c : d'autres en ont six à la mâchoire supérieure, & huit à l'inférieure, comme la *Taupe* : d'autres enfin en ont dix à la mâchoire supérieure, & huit à l'inférieure, comme le *Philandre*.

In decem & octo ordines dividuntur.

Je les divise en dix-huit Ordres.

(1) *Digiti unguiculati* isti sunt, quorum extremitas ungue cooperta est in parte superiore, & nuda, sur pilis tanquam modo secta, in parte inferiore.

(1) On appelle *doigts onguiculés* ceux dont l'extrémité est couverte de l'ongle dans la partie supérieure, & nue, ou seulement couverte de poils dans la partie inférieure.

Dans le premier sont compris ceux qui n'ont point de dents. In primo Ordine continentur ea quæ sunt edentula.

Dans le second, ceux qui n'ont que des dents *molaires*. In secundo, ea quæ dentes tantum *molares* habent.

Dans le troisième, ceux qui n'ont que des dents *canines*, & des dents *molaires*. In tertio, ea quæ dentes habent tantummodò *molares* & *caninos*.

Dans le quatrième, ceux qui n'ont point de dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & qui en ont six à l'inférieure. Tous ceux-là sont *ruminants*, & ont à chaque pied deux doigts *onguiculés*. In quarto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore nullos, in inferiore sex: quæ omnia sunt *ruminantia*, & duobus digitis *unguiculatis* in singulis pedibus donantur.

Dans le cinquième, ceux qui n'ont point de dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & qui en ont huit à l'inférieure. Tous ceux-là sont *ruminants* & ont le pied *fourchu*. In quinto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore nullos, in inferiore octo. Omnia ista sunt *ruminantia*, & pedibus *bisulcis* donantur.

Dans le sixième, ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires; & la corne du pied d'une seule pièce. In sexto, ea quæ dentes *incisores* in utraque maxilla; & pedes *solidungulos* habent.

Dans le septième, ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires; & le pied *fourchu*. In septimo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla; & pedibus *bisulcis* donantur.

Dans le huitième, ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires; & trois doigts *ongulés* à chaque pied. In octavo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla; & digitos tres *ungulatos* in singulis pedibus.

Dans le neuvième, ceux qui ont deux dents *incisives* à chaque mâchoire; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière. In nono, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla duo; & digitos *ungulatos* quatuor in pedibus anticis, & tres in posticis.

Dans le dixième, ceux qui In decimo, ea quæ dentes ha-

bent *incisores* in utraque maxilla decem; & *digitis ungulatis* quatuor in pedibus anticis; & tribus in posticis donantur. ont dix dents *incisives* à chaque mâchoire; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

In undecimo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla; & *digitos ungulatos* quatuor in singulis pedibus. Dans le onzième, ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires; & quatre doigts *ongulés* à chaque pied.

In duodecimo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla duo; & *digitis unguiculatis* prædita sunt. Dans le douzième, ceux qui ont deux dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

In decimo tertio, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla quatuor, & *digitis* donantur *unguiculatis*. Dans le treizième, ceux qui ont quatre dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

In decimo quarto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore quatuor, in inferiore sex; & *digitis unguiculatis* donantur. Dans le quatorzième, ceux qui ont quatre dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & six à l'inférieure; & les doigts *onguiculés*.

In decimo quinto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore quatuor; & *digitis unguiculatis* prædita sunt. Dans le quinzième, ceux qui ont six dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure; & les doigts *onguiculés*.

In decimo sexto, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla sex; & *digitis unguiculatis* donantur. Dans le seizième, ceux qui ont six dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

In decimo septimo, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore octo; & *digitis* donantur *unguiculatis*. Dans le dix-septième, ceux qui ont six dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts *onguiculés*.

In decimo octavo & ultimo, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore Dans le dix-huitième & dernier, ceux qui ont dix dents *incisives* à la mâchoire

supérieure , & huit à l'inférieure ; & les doigts onguiculés.

decem , in inferiore octo ; & digitis unguiculatis prædita sunt.



Page 22.

TABULA Synoptica QUADRUPEDARUM Sectiones & Genera.

- Q**UADRUPEDA sunt
- Edentula. . . ORDO I.
 - [Corpore piloso. . . *Myrmecophaga*. 1. . .
 - [Corpore squamoso. . . *Pholidotus*. 2. . .
 - Dentata;
 - Dentibus molaribus tantum. . . ORDO II.
 - [Corpore piloso. . . *Tardigradus*. 3. . .
 - [Corpore cataphracto. . . *Cataphractus*. 4. . .
 - Dentibus molaribus & caninis. . . ORDO III.
 - [Duobus dentibus caninis maxillæ superioris flexibilibus. . . *Elephas*. 5. . . curvis; proboscide longissimâ
 - [Duobus dentibus caninis maxillæ superioris inflexilibus. . . *Odobenus*. 6. . . curvis; proboscide nullâ. . .
 - Dentibus incisoribus,
 - In inferiore maxilla tantum;
 - Sex. . . *Camelus*. 7. . . ORDO IV.
 - [Ocho. . . ORDO V.
 - [Cornibus simplicibus. . . *Sectioni* I.
 - [Sursum versis. . .
 - [Digitis pedum anteriorum membratis. . . *Sectioni* II.
 - Sex supra, quatuor infra. . . *Phoca*.
 - Sex supra, totidem infra. . . ORDO VI.
 - Digitis à se invicem separatis. . .
 - Digitis quatuor antè, quinque postè. . .
 - Digitis quinque antè, quatuor postè. . .
 - Digitis quinque antè, totidem postè. . .
 - Pollice ab aliis digitis remoto. . .
 - Pollice aliis digitis proximo. . .
 - Pedibus calcaneis incedentibus. . .
 - Unguibus hamatis & retractilibus. . .
 - Digitis membranis inter se connexis. . .
 - Sex supra, octo infra. . . *Talpa*. 41. . .
 - Decem supra, octo infra. . . *Philander*.







ORDO I. ORDRE I.

QUADRUPEDA LES QUADRUPÈDES

Edentula.

Qui n'ont point de dents.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia sunt corpore pilis tecto; alia corpore squamis magnis, pilis quibusdam intermixtis tecto. Ratione tegminis dividuntur in duas Sectiones; in unaquaque est unicum Genus. Prima continet ea quorum corpus pilis tegitur, quæ formicis vescuntur, quæque ideo *Myrmecophagarum* nomine donantur. Secunda, ea quorum squamæ magnæ, pilis quibusdam intermixtis, corpus cooperiunt, quæque ideo *Pholidoti* nomine prædita sunt.

Obs. Omnia hujus Ordinis QUADRUPEDA lingua cylindraceâ, longissimâ, quamque, *Picorum avium* modo, longissime extrâ orem exerunt, donantur. Ope hujus linguae formicas, quibus vescuntur, arripiunt.

PARMI les QUADRUPÈDES de cet ordre, les uns ont le corps couvert de poils, & les autres l'ont couvert de grandes écailles, sous la plupart desquelles sont quelques poils. Cette différence d'habillement me les fait diviser en deux Sections, qui contiendront chacune un Genre. Dans la première sont ceux qui ont le corps couvert de poils, qui se nourrissent de Fourmis, & qu'on a appelé pour cela *Fourmillers*. La seconde contient ceux qui ont le corps couvert d'écailles, auxquels je donne le nom de *Pholidote*.

Obs. Tous les QUADRUPÈDES de cet Ordre ont la langue cylindrique & très-longue, & peuvent, comme les *Pies*, la faire sortir en grande partie hors de la bouche. C'est par son moyen qu'ils attrapent les fourmis, dont ils se nourrissent.

SECTION I.

SECTIO I.

Ceux qui ont le corps couvert
de poils.

Ea quæ sunt corpore
pilofo.

Il n'y a dans cette Section
qu'un seul Genre, qui est celui
des Fourmillers.

In illâ Sectione unicum
continetur Genus, scilicet
Myrmecophagarum.

I.

I.

Le Genre du Fourmiller.

Genus *Myrmecophaga*.

Son caractère est
De n'avoir point de dents :
D'avoir le corps couvert de poils.

Hujus character est
Dentes nulli :
Corpus pilosum.

Obs. Parmi les QUADRUPÈDES de ce
genre les uns ont le museau fort al-
longé; d'autres l'ont beaucoup plus
court. Tous ont la bouche petite.

Obs. Hujus generis QUADRUPÈ-
DUM alia sunt rostro longissimo ;
alia rostro multò breviori. Omni-
bus os parvum.

** I. LE FOURMILLER TAMANOIR.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetra-
dactylis, posticis pentadactylis, caudâ longissimis pilis vesti-
tâ... MYRMECOPHAGA TAMANOIR dicta.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. *Linn. Syst.
nat. ed. 6. g. 15. sp. 1.*

Tamandua-Guacu; i. e. *Myrmecophaga* omnium maxima. *Klein. Quadr. p.
45. n° 1. Fig. T. 5. (Fig. malâ) pectat in eo quod caput & callum ni-
mis elongata sunt, & rostrum informe (2).*

Myrmecophaga, live *Tamendoa*. *Eusf. Nieremb. p. 190.*

Tamandua-guacu Brasiliensibus. Raj. Syn. Quadr. p. 241.

Marsgr. Hist. Br. Fig. p. 225. (Fig. bona).

Charlet. exerci. p. 17.

Tamandua-Guacu. Jonst. Quadr. p. 95. Fig. T. 62. (Fig. bona).

(*) M. Klein a confondu cette espèce
avec celle dont Seba a donné la Figure
Tom. 1. Pl. 40. Fig. 1. sous le nom de *Ta-
mandua-Guacu du Brésil*, qui est la troi-
sième espèce de ce genre.

(2) Dom. Klein, speciem istam eam-
dem esse putavit quam Seba delineavit
Vol. 1. T. 40. Fig. 1. sub isto nomine
Tamandua-Guacu Brasiliensis, quæ ter-
tia est hujus generis species.

Tamandua

LES QUADRUPÉDES, Classe I. Ordre I. 25

Tamandua-guacu, live major. *Pifan. Hift. Nat. Fig. pag. 320. (Fig. bona).*

Tamandua major cauda panniculata. *Barr. Hift. Fr. eq. p. 162.*

Tamandua. *Joan. de Laet p. 551.*

Urfus Formicarius, Cardani. *Raj.*

Mange-Fourmis, ou Renard Ameriquain. *Dés March. T.III. p. 307.*

Cochon de terre. *Kolbe. Tome III. p. 43.*

Les Congois l'appellent UMBULU. *Marogr. Charlet.*

Les Suédois, MYRBIÖRN. *Linn.*

Les Hollandois, MIBREN-EETER. *Klein.*

Les Anglois, GREAT-ANT-BEAR. *Raj.*

Les François de la Guiane, GROS MANGEUR DE FOURMIS. *Barr.*

Les Guianois, OUARIRI. *Barr.*

Longitudo, ab extremitate caudæ, ad extremitatem oris, $6 \frac{1}{2}$ pedum, scilicet caput simul cum promuscide 14 pollicum; collum 4 pollicum; corpus ad caudæ initium $2 \frac{1}{2}$ pedum, & cauda totidem. Crura posteriora unum pedem longa, anteriora paulò longiora, pedes anteriores in 4, posteriores in 5 digitos, longis unguibus munitos divisi, duobus mediis anterioribus maximis; rostrum longissimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & subrotundæ; oculi parvi; cauda longissimis pilis vestita; omnes pili ejus (quod maxime singulare) sunt plani, longitudine minores in parte corporis anteriore, quam in posteriore; in collo & capite antrotrorsum versi apparent. Omnes ex albo & nigro varii, posterius tamen magis nigrescentes. Per pectus ad latera in dorsum, usque ad me-

Il a, depuis l'extrémité de la queue jusqu'à l'extrémité de la bouche, environ $6 \frac{1}{2}$ pieds, sçavoir la tête & le museau 14 pouces, le col 4 pouces, le corps $2 \frac{1}{2}$ pieds, & la queue autant. Les jambes de derrière sont longues d'un pied, & celles de devant un peu plus longues; il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, tous armés d'ongles forts. Les deux du milieu des pieds de devant sont les plus longs; le museau est fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la queue garnie de longs poils: mais ce qu'il a de singulier, c'est que tous ses poils sont plats. Ils sont moins longs à la partie antérieure du corps qu'à la postérieure. Ceux du col & de la tête paroissent tournés en devant. Ils sont tous variés de noir & de blanc, plus noirs cependant vers la partie postérieure du corps. Une grande bande

D.

noire; qui couvre la poitrine transversalement, & passe sur les côtés, va se terminer sur le dos vers la moitié de sa longueur. Les jambes de derriere sont noires, celles de devant blanches, avec une tache noire vers le pied. C'est la plus grande espece de Fourmiller. Elle se trouve au Cap de Bonne-Esperance, dans la Guiane, & dans le Brésil.

Obs. Lorsque sa queue est relevée vers le dos, elle lui sert de parasol.

diam longitudinem; linea protenditur nigra. Posteriora crura nigris, anteriora albis pilis vestiuntur, & in quolibet versus pedem macula est nigra. Myrmecophagarum omnium species maxima est. Habitat in Capite Bonæ-Spei, Guaniâ, & Brasiliâ.

Obs. Caudâ suâ, in dorsum re-flexâ, se tegit & inumbrat.

2. LE FOURMILLER.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis; posticis pentadactylis, cauda fere nuda... MYRMECOPHAGA.

Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 15. sp. 3.

Tamandua-I, Brasiliensibus. Raj. Syn. Quadr. p. 242.

Marogr. Hist. Br. p. 225. Fig. p. 226. (Figura bona).

Tamandua Americana minor. Klein. Quadr. p. 46.

Tamandua-J. Jonst. Quadr. p. 95. Fig. T. 62. (Fig. bona).

Charlet. exerc. p. 17.

Tamandua-Miri. Pison. Hist. Nat. Fig. p. 321. (Fig. bona).

Tamandua minor cinerea. Barr. Hist. Fr. 44. p. 162.

Tamandua Formicis vivescens Americana minor. Seb. II. p. 48. Fig. T. 47.

Fig. 2. (Fig. bona).

Les Anglois l'appellent, LESSER ANT-BEAR. Raj.

Les François de la Guiane, MANGEUR DE FOURMIS. Barr.

Il est plus de moitié plus petit que le précédent: il a, comme lui, 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; le museau fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la tête, les jambes, les pieds, la queue, & toute la par-

Precedentis dimidiam magnitudinem non attingit. Sicut in eo, pedes anteriores 4 digitis, posteriores 5 donati sunt; rostrum longissimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & subrotundæ; oculi parvi; caput, crura, pedes, cauda, & tota corporis pars

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre I.* 27

anterior ex albo flavescunt; posterior verò ex ruffo fusca est. Per pectus ad latera in dorsum usque ad mediam longitudinem protenditur lineam etiam ex ruffo fusca. Cauda ferè nuda est; per hoc, ita & per magnitudinem, & pilorum breviteratem à precedente differt. Habitat in *Guianâ* & *Brazilâ*.

tie antérieure de son corps sont couleur de paille; la partie postérieure est d'un brun roux. Une bande de pareille couleur, qui couvre la poitrine transversalement, & passe sur les côtés, va se terminer sur le dos vers la moitié de sa longueur. Sa queue est presque rase: c'est par-là, ainsi que par sa grandeur, & ses poils courts qu'il diffère du précédent. On le trouve dans la *Guiane* & au *Brazil*.

3. LE FOURMILLER AUX LONGUES OREILLES.

Myrmecophaga rostrato longissimo, pedibus anticis tridactylis; posticis pentadactylis, auriculis longis, flaccidis... MYRMECOPHAGA MINOR. (a).

Tamandua-guacu, *Brazilienfis*, seu *Ursa formicaria*. *Seb. Vol. 2. p. 63. Fig. T. 40. f. 1.*

Pedes anteriores in 3 digitos, posteriores in 5 sunt divisi. Unguis medius pedum anteriorum aliis multo major; rostrum longissimum; oris rictus parvus; auriculæ longæ flaccidæ; oculi sat magni; cauda longa & in acumen desinens, supernè dilutè fulva; corpus longis pilis supernè dilutè spadiceis, infernè verò magis ruffis, vestitur. Habitat in *Indiâ Occidentali*.

Il a 3 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière. L'ongle du milieu des pieds de devant est beaucoup plus grand que les autres. Le museau est fort allongé; l'ouverture de la bouche petite; les oreilles longues & pendantes; les yeux assez grands; la queue longue & qui se termine en pointe, est dans sa partie supérieure d'un fauve clair. Le corps est couvert de longs poils d'un chatain clair en dessus, & d'un brun plus foncé en dessous. On le trouve dans les *Indes Occidentales*.

(a) *Don. Klein*, ut *suprà* notavi, hujus generis speciem primam eam esse putavit.

(a) *M. Klein*, comme je l'ai dit ci-dessus, l'a confondu avec le Fourmiller *Tamandua*.

Seba, Tom. 1. *Planc.* 37. F. 1. a donné la figure d'un autre, qui ne diffère de celui-ci que parce qu'il est plus petit, & par sa couleur, qui est incarnat. Je le crois un jeune de cette espèce. *M. Kélin*, l'a décrit sous le nom de *Tamandua-J. Brasil.* p. 46. n°. 2.

Seba, Vol. 1. T. 37. F. 1: aliam delineavit quæ ab istâ non differt, nisi magnitudine, quâ ei cedit, & colore qui helvus est. Istius speciei juniorem eam puto. *Klein. Quadr.* p. 46. n°. 2. eam descripsit sub nomine *Tamandua-J. Brasil.*

** 4. LE PETIT FOURMILLER.

Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradaactylis. . . MYRMECOPHAGA MINIMA.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradaactylis. *Linn. Syst. Nat. Ed. 6. g. 15. sp. 2.*

Tamandua alba, altera, seu Coati. *Klein. Quadr. p. 46. no. 3.*

Tamandua, seu Coati Americana alba altera. *Seb. Vol. 1. p. 60. Fig. T. 37. F. 3. (Fig. bona).* Peccat tamen in eo quod digitus unicus in pedibus anterioribus representetur.

Tamandua minor flavescens. *Barr. Hist. Fr. Eq. p. 163.*

Les François de la Guiane l'appellent PETIT MANGEUR DE FOURMIS. Barr.

Les Guianois, Ouatirouaou. Barr.

Les Ethiopiens de Surinam, Coaty. Seba.

Celui-ci est la plus petite espèce. Depuis le bout du nez jusqu'à l'extrémité de la queue, il a environ 15 pouces; la queue est plus longue que le corps & la tête; le col est très court. Il a 2 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière; l'ongle extérieur des pieds de devant est très grand. Le museau est court; l'ouverture de la bouche plus grande que dans les précédens; les oreilles petites; les yeux assez grands. Tout son corps est couvert de poils jaunâtres, mêlez de gris, & qui sont doux au tou-

Hæc est minima species: Longitudo totius corporis, ab extremitate caudæ ad extremitatem oris, circiter 15 pollicum. Cauda corpore simul cum capite longior; collum brevissimum; pedes anteriores in 2 digitos, posteriores in 4 sunt divisi. Unguis exterior pedum anteriorum maximus. Rostrum brevius; oris rictus amplior, quam in precedentibus; auricula parvæ; oculi sat magni. Color totius corporis ex albo flavescit, cum griseo admixto. Pili om-

LES QUADRUPEDES, *Classe I. Ordre I.* 29
 nes, sericei modo, ad tactum cher comme de la soye. On le
 mollissimi sunt. Habitat in trouve dans la Guiane.
 Guianâ.

SECTIO II.

*Ea quæ sunt corpore
 squamoso.*

IN illa Sectione, sicut in
 precedenti, unicum est
 genus, scilicet *Pholidoti*.

II.

Genus Pholidoti.

Hujus character est
 Dentes nulli :
 Corpus squamosum.

SECTION II.

*Ceux qui ont le corps couvert
 d'écailles.*

Cette section, de même que
 la précédente, ne contient
 qu'un seul genre, qui est celui
 du *Pholidote*.

• I I.

Le genre du Pholidote.

Son caractère est
 De n'avoir point de dents :
 Et d'avoir le corps couvert d'é-
 cailles.

** I. LE PHOLIDOTE.

*Pholidotus pedibus anticis & posticis pentadactylis, squamis
 subrotundis... PHOLIDOTUS.*

*Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis. Linn. Syst. Nat. Ed.
 6. g. 16. sp. 1.*

*Tatu Mustelinus: Armodillus squamatus major Ceylanicus, seu Diabo-
 lus Tajovanicus dictus. Klein. Quadr. p. 47.*

*Armodillus, squamatus, Major, Ceylanicus, seu Diabolus Tajovanicus
 dictus. Seb. Vol. 1. p. 88. Fig. T. 54. F. 1. Pullus Fig. T. 53 F. 5.
 (Fig. bonis)*

*Lacertus Indicus Squamosus. Bont. Ind. Ori. Fig. p. 60. (Fig. sat bona).
 Lacertus Squamosus minor setulis asperis, Gaz. Pet. Fig. T. 29. F. 12.
 (Fig. bona)*

*Lezard Ecaillé. Hist. de l'Acad. Tom. 3. Part. 3. p. 87. Fig. Plante. 17.
 (Fig. bonne, excepté la tête qui est mal faite).*

Les François l'appellent LEZARD ECAILLEUX ; DIABLE DE JAVA.

Les Espagnols, ARMODILLO. Seb.

*Les Habitans de Java & les autres Peuples Orientaux, PANGGOELING. Seb.
 Les Brésiliens, TATOE. Seb.*

Longitudo totius corporis

*Il a environ 3 ou 4 pieds de
 Diiij*

long. *Seba* dit qu'il y en a qui ont plus de 6 pieds. Il ne lui paroît point de col, & la queue est à peu près de la longueur du corps; il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles forts; ceux du milieu sont les plus grands. Sa tête est oblongue; le museau & l'ouverture de la bouche petite; les oreilles petites. La tête en dessous & aux côtés, le dessous du corps, & la partie intérieure des jambes, sont couverts d'une peau molle sur laquelle sont quelques poils. Le dessus de la tête, le dessus du corps & des jambes, & la queue dessus & dessous sont couvertes de grandes écailles arondies, striées, rousses, sous lesquelles sont quelques gros poils de la même couleur. Celles du dessous de la tête sont plus petites que les autres. Dans les jeunes les écailles sont jaunâtres, ensuite elles deviennent rousses; cette dernière couleur devient de plus en plus foncée, à mesure que l'Animal vieillit. Il a la faculté de faire de son corps une boule, en retirant si bien sa tête & sa queue vers le ventre, qu'on n'en sauroit rien appercevoir. On le trouve au *Bresil*, & dans les *Isles de Ceylan, Java, & Formose*.

trium circiter aut 4 pedum. Secundum *Sebam* sunt qui ultra 6 pedes longi sunt. Collum non apparet; cauda corporis simul cum capite longitudine; in singulis pedibus sunt 5 digiti magnis unguibus muniti, intermediis maximis. Caput oblongum; rostrum & oris rictus minimus; auriculæ parvæ. Caput infra & ad latera, corporis infima pars, & crurum pars interior teguntur cute molli pilis quibusdam prædita. Vertex, pars superior corporis & crurum, & cauda superne & inferne teguntur squamis magnis, rotundatis, striatis, ruffis, pilis quibusdam crassis, etiam ruffis, intermixtis. Squamæ verticis aliis multo minores sunt. Juniorum squamæ flavescent; adultiorum rufescent, & tandem in senio magis, magisque saturantur. In globosam quasi pilam se se contrahere potest, capite & caudâ tantoperè ventrem versùs adductis, ut nihil eorum conspici queat. Habitat in *Brasiliâ*, & *Insulis Ceylonensi, Java, & Formosa*.

* 2. LE PHOLIDOTE A LONGUE QUEUE.

Pholidotus pedibus anticis & posticis tetradactylis, squamis mucronatis, caudâ longissima.. PHOLIDOTUS LONGICAUDATUS.

Lacertus squamosus peregrinus. *Raj. Syn. Quadr. p. 274.*

Clus. Exot. Fig. p. 374. (Fig. bona).

Mus. Bel. p. 36. Fig. T. 11. (Fig. bona).

Lacerta Indica Yvannæ congener. *Aldro. Quadr. Dig. Ovi. p. 668. Fig. p. 667. (Fig. sat bona).*

Lezard de Clusius. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 89.*

Lezard des Indes Orientales. *Hist. de l'Acad. an. 1703. p. 39.*

Les Indiens Orientaux, l'appellent PHATAGEN. *Hist. de l'Acad.*

Les Portugais du Brésil, Bicho VERGONHOZO. *Best.*

Les Habitans de l'Isle de Formose, DIABLE DE TAJOAN. *Best.*

Longitudo corporis, ab extremitate oris ad extremitatem caudæ, 3 pedum & 10 pollicum. Cauda $2\frac{1}{2}$ pedes longa. Pedes singuli in 4 digitos, unguibus præditos, dividuntur. Unguis secundus pedis anterioris aliis multò major; unguis posteriorum pedum minores: anteriora crura posterioribus paulò breviora; caput infra & ad latera, corporis pars infima, anteriora crura, & posteriorum crurum pars interior teguntur cute mollis pilis quibusdam nigris prædita. Vertex, pars superior corporis & crurum posteriorum, & cauda supra & infra teguntur squamis magnis, latis, striatis, & mucronatis; squamæ verticis aliis multò minores sunt; & squamæ

Il a environ 3 pieds 10 pouces de long, depuis le bout du museau, jusqu'à celui de la queue, qui a, elle seule, $2\frac{1}{2}$ pieds de longueur. Il a à chaque pied 4 doigts, armés d'ongles, dont le second des antérieurs est beaucoup plus grand que les autres. Ceux des pieds de derrière sont les plus petits; les jambes de devant sont un peu plus courtes que celles de derrière. La tête en dessous & aux côtés, le dessous du corps, les jambes de devant, & la partie intérieure de celles de derrière sont couvertes d'une peau molle, sur laquelle sont quelques poils noirs. Le dessus de la tête, du corps & des jambes de derrière, & la queue dessus & dessous sont couverts de grandes écailles, larges, striées, & terminées par une pointe. Les

écailles du dessus de la tête sont plus petites que les autres, & celles de la queue sont moins grandes à mesure qu'elles approchent de son extrémité. On le trouve au *Brésil*, & à l'*Iste Formose*,
 caudæ sensim versùs ejus extremum procedendo minuuntur. Habitat in *Insula Formosa* & *Brasilid*.





ORDO II.

QUADRUPEDA

*Dentibus molaribus tantum
donata.*

ORDRE II.

LES QUADRUPÈDES

*Qui n'ont que des dents
molaires.*

IN hoc Ordine, sicut in precedenti, duo tantum sunt genera QUADRUPEDUM, quæ ratione tegminis in duas Sectiones dividuntur : alia enim sunt corpore *piloso*, alia corpore quasi Cataphracto, vel tegmine osseo tecto. Prima Sectio continet ea quorum corpus *pilis* tegitur, quæque ratione tardi progressus, *Tardigradi* vocantur. Secunda continet ea quorum corpus tegmine osseo tegitur, quæque *Cataphracti* nomine donantur.

IL n'y a dans cet Ordre ; comme dans le précédent, que deux genres de QUADRUPÈDES, qui à raison de la couverture de leur corps se divisent en deux Sections. Les uns ont le corps couvert de *poils*, & les autres l'ont comme cuirassé ou couvert d'un test osseux. Dans la première Section sont ceux qui ont le corps couvert de *poils*, & qui à cause de leur lenteur à marcher sont appelés *Paresseux*. Dans la seconde sont ceux qui ont le corps couvert d'un test osseux, & qu'on appelle *Armadilles*.

SECTIO I.

*Ea quæ sunt corpore
piloso.*

SECTION I.

*Ceux qui ont le corps couvert
de poils.*

IN illâ Sectione unicum continetur genus, scilicet *Tardigradi*.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul genre, qui est celui du *Paresseux*.

E

III.

III.

Le genre du *Paresseux*.

Son caractère est

De n'avoir ni dents incisives, ni
dents canines, mais des dents
molaires seulement :D'avoir le corps couvert de
poils.Genus *Tardigradi*.

Hujus character est

Dentes nec incisores, nec
canini, sed molares tan-
tum :

Corpus pilosum.

Obs. Tous les QUADRUPÈDES de ce genre ont les jambes de devant plus longues que celles de derrière, ce qui fait qu'ils marchent très lentement : & c'est à cause de leur allure lente qu'on les a nommés *Paresseux*. Leurs dents molaires, qui sont les seules qu'ils aient, ne sont point à lobes comme celles des autres QUADRUPÈDES, elles sont cylindriques, & terminées par un bout arrondi.

Obs. Omnium hujus generis QUADRUPEDUM crura anteriora posterioribus longiora sunt : ideo lentissimè progrediuntur, ob quam tarditatem gressus *Tardigradi* nomine donantur. Dentes illorum molares, quibus solis prædita sunt, nullomodo sunt lobati, sicut dentes molares aliorum QUADRUPEDUM, sed cylindrici, apice rotundato.

* * I. LE PARESSEUX.

Tardigradus pedibus anticis & posticis tridactylis. : TARDIGRADUS.

Bradypus manibus tridactylis, caudâ brevi. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 3. sp. 1.
Ignavus Americanus trisulcum fletu miscens. Ignavus Martensii. Klein. Quadr. p. 43.

Ai, sive Ignavus. Raj. Syn. Quadr. p. 245.

Martens. Hist. Br. Fig. p. 221. (Fig. bona).

Pison. Hist. nat. p. 321. Fig. p. 322. (Fig. bona).

Charlet. exer. p. 17.

Ignavus. Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 262.

Jonst. Quadr. p. 101. Fig. T. 62. (Fig. bona) & T. 74. (Fig. mala).

Clus. Exot. p. 372. Fig. p. 373. (Fig. bona).

Barr. Hist. Fr. 49. p. 154.

Ignavus, sive Haut Clusii. Euf. Nicumb. bis Fig. p. 164. (prima Figura mala, secunda bona).

Ignavus, sive per antiphrasim agilis. Clus. Exot. p. 140. Fig. p. 112. (Fig. mala).

Flay. Jo. de Laet. Fig. p. 554. (Fig. mala).

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre II. 35

Archopithecus. Gsf. icon. Quadr. Fig. p. 96. (Fig. mala).

Papio II. Jonst. Quadr. Fig. T. 61. (Fig. mala).

Pigtitia, five Haut. Euf. Nieremb. Fig. p. 163. (Fig. mala).

Al, seu Tardigradus Gracilis Americanus. Seb. Vol. 1. p. 33, Fig. T. 33.

Fig. 2. (Fig. optima).

Unau. Jo. de Laet. Fig. p. 618. (Fig. bona).

Al, ou Pareffeux. Des March. Tom. III. p. 308.

*Les Espagnols & les Portugais l'appellent: PEZILLO, & PERICO LISERO.
PRIGUZA. Klein. Aldrov. Jonst. Euf. Nieremb. Marogr. Pifon. Seba.
Charlet.*

Les Flamands LUIAARDT. Klein. Seba.

Les Guianois OUAIKARE'. Barr.

Longitudo totius corporis
2 circiter pedum. Crura an-
teriora posterioribus sunt lon-
giora. Cauda brevissima: in
singulis pedibus 3 sunt digiti,
longis & incurvis unguibus
muniti: totum corpus tegitur
pilis densissimis, ex fusco, &
albo variis, exceptâ facie,
quæ tota alba est. Caret au-
riculis, sed non caret meatu
auditorio. Habitat in *India
Orientali, Guiana, & Bra-
sil.*

Il a environ 2 pieds de lon-
gueur. Ses jambes de devant sont
plus longues que celles de der-
rière. Sa queue est très courte ;
il a à chaque pied 3 doigts ar-
més d'ongles forts, & un peu
recourbés. Tout son corps est
couvert de poils très épais, va-
riés de brun & de blanc, sa face
seule est toute blanche. Il n'a
point d'oreilles extérieurement ;
mais on trouve à leur place des
trous par lesquels il entend. On
le trouve dans les *Indes Orienta-
les, dans la Guiane & au Brésil.*

2. LE PARESSEUX DE CEYLAN

*Tardigradus pedibus anticis didactylis, posticis tridactylis. . .
TARDIGRADUS CEYLONICUS.*

Bradypus manibus didactylis, caudâ nulla. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 3. sp. 2.

Silenus: Simia personata. Klein. Quadr. p. 41.

Tardigradus Ceylanicus. Seb. Vol. 1. p. 34. Fig. T. 34. F. 1. & T. 33.

F. 4. (Fig. bonis).

*Pedes anteriores in 2, pos-
teriores in 3 digitos, ungui-
bus longis & incurvis muni-*

Il a 2 doigts aux pieds de de-
vant, & 3 à ceux de derrière,
tous armés d'ongles forts & cro-

E ij

chus: ses oreilles, qui sont plates & appliquées contre la tête, sont cachées sous les poils. Il n'a point de queue: tout son corps est couvert de poils épais, de couleur incarnat foncé par dessus le dos, & d'un cendré clair par dessous le ventre: il a le museau un peu plus allongé que le précédent.

Je n'ai jamais vu cet Animal, je ne suis pas sûr qu'il ait le caractère de ce genre: *Seba*, qui l'a décrit, n'a point parlé de ses dents; je crois pourtant qu'on doit le mettre dans ce genre; car il convient assez avec le *Perseus* par sa façon de vivre, par son cri, & même par la forme de son corps, excepté le museau, qui est un peu plus allongé. Au reste j'aime mieux, jusqu'à ce que je sois plus instruit de son vrai caractère, le mettre dans ce genre, que dans la famille des *Chameaux*, comme a fait *M. Klein*.

On le trouve dans l'Isle de *Ceylan*.

tos, divisi sunt: auriculæ planæ, quam proximè capiti adpressæ sunt, & capitis crine obteguntur. Caret caudâ: totum corpus tegitur pilis densissimis, coloris saturatè helvi per corpus supernum, subtus verò dilutè cinerei: rostrum paulò longius quam in precedente.

Hoc Animal nunquam vidi: nescio utrum hujus generis characterem habeat. *Seba*, qui primum eum descripsit, dentium nullam mentionem fecit: attamen ex hoc genere eum esse puto; moribus enim, cantilenâ, & quidem formâ corporis, excepto rostro paululum longiori, cum *Tardigrado* perfectè convenit. Cæterum convenientius mihi videtur, usquedum amplior rem illius cognitionem habeamus, eum in hoc genere reponere, quam, cum illustissimo *Kleinnio*, in familiâ *Camelorum*.

Habitat in Insulâ *Ceylonensi*.

SECTION II.

SECTIO II.

Ceux qui ont le corps couvert d'un test osseux.

Ea quæ sunt corpore tegmine ossæo testæ.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul genre, qui est celui de l'*Armadille*.

In illâ Sectione unicum est genus, scilicet *Cataphracti*.

IV.

Genus *Cataphracti*. Fig. 11

Hujus character est
Dentes nec incisores, nec
canini, sed molares tan-
tum: Fig. 1. 2.
Corpus tegmine osseo tec-
tum, & cataphractum.

Obs. Tegmen osseum, quod
omnium hujus generis specierum
corpus cooperit, in plures partes
dividitur: anterior & posterior (a)
sunt quasi duo scuta superne con-
vexa, interne concava, inter quæ
plurima sunt cingula, connexa
inter se cute membranacea, cujus
ope supra se mutuo gliscunt; un-
de corpus ita contrahunt ut glo-
bosum fiat, sicut *Erinaceus*. Tota
pars infima, scilicet caput, &
collum inferius, & venter, cute
crassa, crassius rarisque pilis obsita,
investitur: sunt etiam supra cor-
pus pili quidam inter squamas
regimen osseum regentes. Dentes
omnes hujus generis QUADRU-
PEDUM, sicut in genere preceden-
ti, sunt cylindrici.

V.

Le genre de l'*Armadille*. Fig. 11

Son caractère est
De n'avoir ni dents incisives, ni
dents canines, mais des dents
molaires seulement: Fig. 1. 2.
D'avoir le corps couvert d'un
test osseux, & comme cuirassé.

Obs. Le test osseux, dont le corps
de toutes les espèces de ce genre
est couvert, est divisé en plu-
sieurs parties: l'antérieure & la posté-
rieure (a) sont comme deux espèces
de boucliers convexes en dessus, &
concaves en dessous, entre lesquels
sont plusieurs bandes étroites, jointes
ensemble par une peau membra-
neuse, qui leur laisse la liberté de se
mouvoir, & de glisser les uns sur les
autres: c'est ce qui leur permet de se
mettre en boule, comme le *Hérisson*.
Toute la partie inférieure, savoir le
dessous de la tête & du col, & le ven-
tre, est couverte d'une peau épaisse,
garnie de quelques gros poils: il y a
aussi quelques poils entre les écailles
qui couvrent le test osseux. Toutes
leurs dents sont cylindriques, comme
dans le genre précédent.

I. L'ARMADILLE.

Cataphractus scuto unico, cingulis octodecim... ARMADILLO.

Tatu Mustelinus. *Raj Syn. Quadr. p. 235.*

Dasypos cingulo simplici. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 1.

Les Anglois l'appellent WEEBLE-HEADED ARMADILLO. *Raj.*

Longitudo corporis, ab
extremitate rostri ad initium

Il a, depuis le bout du mu-
seau jusqu'à la queue, environ

(a) Primæ speciei pars posterior cor-
poris non scuto, sed cingulis regitur.

(a) La première espèce n'a point de bou-
clier derrière, mais seulement des bandes.
E. 113.

10 pouces. La queue a 7 pouces de long. Chaque pied est divisé en 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de devant sont beaucoup plus longs que les autres. Son front est large & applati; ses yeux petits; ses oreilles nues. On distingue aisément cette espèce des autres, en ce qu'elle n'a point de grand bouclier derrière: mais depuis le bouclier antérieur, jusqu'à la queue, le test osseux est divisé en 18 bandes jointes ensemble par une peau membraneuse. Les antérieures, qui sont les plus grandes, sont couvertes d'écailles quarrées; les postérieures de quarrées & de rondes mêlées ensemble. Les écailles qui couvrent le bouclier antérieur sont quarrées, ainsi que celles de la queue, qui est composée de 6 anneaux à son origine, & ensuite se termine en pointe.

caudæ, 10 circiter pollicum; cauda 7 pollicum; pedes singuli dividuntur in 5 digitos, quorum 3 medii anteriores aliis multò sunt longiores. Frons latus, valdè planus; oculi parvi; auriculæ nudæ. Ab aliis abundè distinguitur, in eo quod scuto posteriori careat: sed, à scuto anteriori ad caudam usque, tegmen dividitur in 18 cingula, totidem membranis intermediis connexa. Anteriora, quæ & majora sunt, squamis quadratis, posteriora verò quadratis & rotundis intermixtis constant. Squamæ, scutum antèrius tegentes, sunt quadratæ, sicut illæ quæ caudam cooperiunt, quæ cauda in exortu 6 annulis cingitur, & deinde in acutum desinit.

2. L'ARMADILLE ORIENTAL.

Cataphractus scutis duobus, cingulis tribus... ARMADILLO ORIENTALIS.

Dasyus cingulistris. Linn. *syft. nat. ed. 6. g. 12. sp. 2.*

Tatu Apata, Armadilli tertia species Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 234.*

Tatu Apata. *Jonst. Quadr. p. 121. Fig. T. 63. (Fig. bona).*

Marcgr. Hist. Bra. Fig. p. 232. [Fig. bona].

Tatu porcinus, seu Armadillo orientalis, lorica ossæ, toto corpore tectus. *Klein. Quadr. p. 48.*

Tatu seu Armadillo Orientalis lorica ossæ toto corpore tectus. *Seb. Vol. 1. p. 62. Fig. T. 38. F. 2. & 3. (Fig. optima).*

Tatu seu Armadillo. *Pison. Hist. Nat. Fig. p. 100. (Fig. bona).*

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre II. 39

Armadillo, seu Tatou genus alterum. *Clus. Exot. Fig. p. 109. (Fig. bona).*

Armadillo, genus alterum Clusii. *Euf. Niremb. Fig. p. 158. [Fig. fac bona].*

Tatus Gesneri. *Barr. Hist. Fr. eq. p. 163.*

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad extremitatem caudæ, circiter unius pedis : pedes singuli secundum *Marcgravium & Rajum*, in 5 digitos, secundum *Sebam & Kleinnium*, in 4 sunt divisi. Inter duo scuta tria sunt cingula squamis parallelogramis testæ ; squamis exagonis scuta teguntur ; auriculæ nudæ, breves & rotundæ. Cauda utrinque suprà & infrà paulum applanata, brevissima, squamis exagonis testæ, unico tantum articulo constat. Habitat in *India Orientali*, *Brazilia* & *Guianâ*.

Il a, depuis le bout du museau, jusqu'au bout de la queue, environ 1 pied ; il a à chaque pied, selon *Marcgrave & Ray*, 5 doigts, & selon *Seba & Klein*, 4 seulement. Entre les deux grands boucliers sont 3 bandes étroites, dont les écailles représentent des parallélogrames : celles qui couvrent les 2 grands boucliers sont exagones. Les oreilles, qui sont nues, sont courtes & rondes. La queue, qui est aplatie en dessus & en dessous, est très-courte, composée d'une seule articulation & couverte d'écailles exagones. On le trouve dans les *Indes Orientales*, au *Bresil*, & dans la *Guiane*.

3. L'ARMADILLE DES INDES.

Cataphractus scutis duobus, cingulis quatuor. . . ARMADILLO INDICUS.

Dasyus cingulis quatuor. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 3.

Testudinatus porcellio, vel Testudinatus Echinus, Exoticum Animal: Column. aquat. p. 15. Fig. p. 16. [Fig. & descript. bonis]. Tegmen osseum tantum descripsit & figuravit.

De istâ specie pauca dicam. Nunquam eam vidi, & *Columna* qui solus illius mentionem fecit, tegmen osseum tantum descripsit & figuravit.

Je ne puis dire que très-peu de choses de cette espèce : je n'en ai pas vue, & *Columna* qui est le seul qui en ait parlé, n'en a décrit & figuré que le test. Mais

cela suffira pour la distinguer des autres espèces de son genre. Ce test est composé de 2 espèces de boucliers, dont le postérieur est le plus grand, couverts d'écaillés raboteuses, exagones, pentagones, quarrées, & de quelques autres figures, entre lesquels sont 4 bandes étroites, jointes ensemble par une peau membraneuse,

Sed hoc sufficit ad distinguendam istam speciem ab aliis ejusdem generis. Tegmen illud osseum duobus componitur scutis, quorum posterius majus est, squamis exagonis, pentagonis, quadratis, aliisque quibusdam paucis figuris rectis illisque squamis tuberculis exasperatis; inter quæ scuta, 4 sunt cingula, cute membranacea inter se connexa.

4. L'ARMADILLE DU MEXIQUE.

Cataphractus scutis duobus, cingulis sex... ARMADILLO MEXICANUS.

Dasyus cingulis sex. Linn. Syst. Nat. ed. 6. g. 12. sp. 5.

Tatu, sive Armadillo prima Maregravii. *Raf. Syn. Quadr. p. 233. n. 1.*

Tatu, seu Echinus Brasilianus. *Jonst. Quadr. p. 120.*

Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 478. Fig. p. 480.

Tatu, seu Armadillo. *Jonst. Quadr. Fig. T. 62.*

Clus. Exot. Fig. p. 330.

Mus. Bess. p. 40. Fig. T. 11.

Charlet. Exer. p. 18.

Tatu & Tatupeba Brasilienfibus. *Maregr. Hist. Br. Fig. p. 231.*

Tatu, sive Tatou. *Jo. de Laet. Fig. p. 332.*

Tatou. *Bell. obs. Fig. p. 204.*

Armadillo Clusii. *Euf. Nieremb. Fig. p. 158.*

Ayoroctli, seu *Dasyus cucutbitinus*, ab aliis Tatou, vel Armadillo dictus. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 314. [a].*

Les Espagnols l'appellent ARMADILLO. *Aldro. Hern. Marc. Bess.*

Les Portugais ENCUBERTO ou ENCUBERTADO. *Aldr. Hern. Marc. Bess.*

Les Italiens, BARDATO. *Bess. Aldr.*

Les Flamands, SCHILVERKEN. *Bess.*

Les Anglois, GREAT STRELL'D HEDGOG. *Bess.*

Les Habitans de la Nouvelle Espagne, CHIRQUINCHUM. *Euf. Nieremb. Bess.*

(a) Toutes les figures qu'en ont donné ces Auteurs, excepté celle d'Aldrovande, représentent plus de 6 bandes entre les 2 grands boucliers, en quoi elles sont mauvaises.

(a) Omnes illorum Authorum figure, exceptâ soli Aldrovandi figurâ, plûsqvam 6 cingula referunt; in quæ peccant.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre II. 41

Pedes singuli in 5 digitos, ungues subrotundis munitos, divisi sunt; os acutum; oculi parvi; auriculæ nudæ, brevès. Inter duò scuta 6 sunt cingula squamis triangularibus testæ. Squamæ scuta regentes irregulares & indeterminatæ: Cauda in exortu crassa, sensim ad finem usque gracilior fit, & in acutum desinit. Habitat in *Brasiliâ*, & *Mexico*.

Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles arrondis; il a le museau pointu; les yeux petits; les oreilles nues & courtes. Entre ses 2. grands boucliers sont 6 bandes étroites, couvertes d'écaillés triangulaires. Celles qui couvrent les 2. grands boucliers sont de figure irrégulière. La queue est grosse à son origine; ensuite elle devient de plus en plus effilée, & se termine en pointe. On le trouve au *Brésil*, & au *Mexique*.

5. L'ARMADILLE DU BRÉSIL:

Cataphractus scutis duobus, cingulis octo... ARMADILLO BRASILIENSIS.

Dasyurus cingulis septem. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 6.
Tatu-été Brasiliensibus; Armadilli secunda species Marcgravii. *Raj. Syn.*

Quadr. p. 233. n° 2.

Tatu-été Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. p. 231.*

Tatus Quadrupes peregrina, *Gesn. Icon. Quadr. fig. p. 103. [Fig. bona]. [a]*

Armadillo, seu Aiatochili. *Jonst. Quadr. p. 120. fig. T. 74. [Fig. bona].*

Euf. Nieremb. fig. p. 158. [Fig. bona]. [a]

Tatus Major Moschum redolens. *Barr. Hist. Fr. eq. p. 163.*

Les Portugais l'appellent VERDADEIRO. *Marcgr.*

Les Guianois, TATOU-KABASSOU. *Barr.*

In pedibus anterioribus 4 digitos habet, 2 medios æquales, & laterales majores; in posterioribus 5, quorum 3 medios æquales, laterales etiam majores. Caput

Il a 4 doigts aux pieds de devant; les 2 du milieu sont égaux & plus grands que les latéraux; & 5 aux pieds de derrière; les 3 du milieu sont aussi égaux, & plus grands que les latéraux. Il

(a) Figuræ Gesn. & Euf. Nieremb. plouquam 8 cingula inter duo scuta reserunt, in quo peccat.

(a) Les Figures de Gesner, & d'Euf. de Nieremb. représentent plus de 8 bandes entre les 2 grands boucliers, en quoi elles peccent.

a la tête petite ; le museau pointu ; les oreilles longues & droites ; la queue longue & composée d'anneaux dans sa partie antérieure , & ensuite se terminant en pointe. Entre les 2 grands boucliers sont 8 bandes étroites , (9 jointures selon Ray , & Marcgrave) couvertes d'écailles joliment distribuées. On le trouve au Brésil & dans la Guiane.

parvum est & acutum ; auriculæ longæ & erectæ ; cauda longa , in parte anteriore annulis composita , & deinde in acutum desinens. Inter 2 scuta 8 sunt cingula (9 juncturæ secundum Rayum & Marcgravium) squamis ordine decenti dispositis tecta. Habitat in Guianâ & Brasiliâ.

** 6. L'ARMADILLE DE CAYENNE.

Cataphractus scutis duobus, cingulis novem. . . ARMADILLO GUIANENSIS.

Dasyus cingulis novem. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 7.

Tatu Porcinus : Tatu simpliciter : Porcellus Cataphractus : Armadillo communiter. Klein. Quadr. p. 48.

Tatou, seu Armadillo Americanus, Seb. vol. 1. p. 45. fig. T. 29. f. 1. [Fig. optima].

Armadillo. Mus. Worm. p. 335.

Il a, depuis le bout du museau, jusqu'au bout de la queue, environ 2 pieds 10 pouces ; savoir la tête 4 pouces ; le corps 1 $\frac{1}{2}$ pied ; & la queue 1 pied ; il a aux pieds de devant 4 doigts, dont les 2 du milieu sont égaux & plus grands que les latéraux, à ceux de derrière 5 doigts, dont celui du milieu est le plus grand, les 2 qui le suivent un peu plus petits, & les 2 autres très petits : son museau est pointu ; ses oreilles assez longues & couvertes de petites écailles. Sa queue, qui est assez grosse à son origine,

Longitudo totius corporis, ab extremitate oris ad caudæ apicem, circiter 2 pedum & 10 pollicum ; scilicet capitis 4 pollicum ; corporis 1 $\frac{1}{2}$ pedis ; & caudæ 1 pedis. Pedes anteriores in 4 digitos divisi, quorum duo medii æquales sunt, & lateralibus majores ; posteriores in 5, quorum medius major, 2 sequentes paulò minores, & 2 laterales minimi. Rostrum acutum ; auriculæ sat longæ, parvis squamis tectæ. Cauda, quæ in exortu crassa est, & pau-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre II. 41

latius, gracilior fit, in parte anteriore 10 aut 12 annulis cingitur, & deinde in acumen definit. Inter duo scuta 9 sunt cingula squamis triangularibus tecta. Squamæ scuta tegentes sunt subrotundæ & magnitudine inæquales. Habitat in America: in Guianâ frequens.

& qui diminue ensuite peu à peu, est composé dans sa partie antérieure de 10 ou 12 anneaux, & ensuite se termine en pointe. Entre les 2 grands boucliers sont 9 bandes étroites, couvertes d'écailles triangulaires. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers sont presque rondes & inégales en grandeur. On le trouve en Amérique & sur-tout dans la Guiané.

** 7. L'ARMADILLE D'AFRIQUE.

Cataphractus scutis duobus, cingulis duodecim., ARMADILLO AFRICANUS.

Dasyus tegmine tripartito. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 11. sp. 4.

Tatu Caninus, capite pedibusque anormalis: Tatu Apara: Armadillo Notus. Klein. Quadr. p. 49.

Tatu, seu Armadillo Africanus. Seb. vol. 1. p. 47. fig. T. 30. Mas, fig. 3. Femina, fig. 4. [Fig. bonis].

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad initium caudæ, 10 circiter pollicum, cauda 7 pollicum. Singuli pedes in 5 digitos, magnis ungibus, tribus intermediis anterioribus maximis, munitos, sunt divisi. Auriculæ sunt longæ, apice subrotundo. Inter duo scuta 12 sunt strictiora cingula, cute crassâ & membranaceâ connexa, squamis parallelogramis tecta. Squamæ scuta tegentes, sunt modò tetragonæ, modò pen-

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 10 pouces; sa queue a 7 pouces de long. Chaque pied a 5 doigts armés d'ongles forts, les 3 du milieu des pieds de devant sont les plus grands. Ses oreilles, qui sont assez longues, sont arrondies vers le bout. Entre les 2 grands boucliers sont 12 bandes étroites, jointes ensemble par une peau épaisse & membraneuse, & couvertes d'écailles parallélogrames. Celles qui couvrent les 2 grands Boucliers,

Fij

sont tantôt à 4, tantôt à 5, tagona, modò exagona, la-
tantôt à 6 côtés, mais tou- teribus semper inæqualibus.
jours inégaux. On le trouve en Habitat in *Africa*.
Afrique.





ORDO III. ORDRE III.
QUADRUPEDA LES QUADRUPÈDES

Dentibus incisoribus nullis, caninis & molaribus prementibus donata. *Qui n'ont point de dents incisives, mais qui en ont des canines & des molaires.*

IN hoc Ordine duo tantum QUADRUPEDA continentur, *Elephas* scilicet & *Odobenus*, quod unumquodque genus suum constituit. Dentes canini alterius sursum incurvantur, alterius verò deorsum.

V.

Genus Elephantis.

Hujus character est
Dentes incisores nulli:

Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ superiori affixi, longissimi, sursum recurvi:

Proboscis longissima flexibilis.

CET Ordre ne comprend que deux QUADRUPÈDES, sçavoir l'*Éléphant* & la *Vache-marine*, qui sont chacun un genre particulier. L'un à ses dents canines recourbées en enhaut, & l'autre les a recourbées enbas.

V.

Le genre de l'Elephant.

Son caractère est
De n'avoir point de dents incisives:

D'avoir à la mâchoire supérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en enhaut:

Une trompe très longue & flexible.

* 1. L'ÉLEPHANT.

ELEPHAS.

Elephas. Raj. Syn. Quadr. p. 137.

F üj

- Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 24. sp. 1.*
 Klein. *Quadr. p. 36.*
 Aldro. *Quadr. solid. p. 418. Fig. p. 463. [Fig. mali].*
 Gefn. *Quadr. p. 409. Fig. p. 410. [Fig. mala].*
 Gefn. *Icon. Quadr. Fig. p. 61. [Fig. mala].*
 Jonst. *Quadr. p. 17. Fig. T. 7. 8. 9. (Fig. bonis).*
 Euf. Nieremb. *p. 191.*
 Charlet. *exerci. p. 4.*
 Elephas Africanus. Seb. *vol. 1. p. 175. Fatus Fig. T. 111. f. 1. [Fig. bona].*
 Elephant. Kolbe. *Tom. III. p. 9. Fig. p. 10.*
Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 101. Fig. T. 19. (Fig. bona)
 Les Grecs l'appellent *Ελεφας*.
 Les Arabes, *CENALIA*. Aldro.
 Les Ethiopiens, *YTEMBO*. Aldro.
 Les Sabins, *BARRUS*. Gefn. Aldro.
 Les Illyriens, *SION*. Aldro. Gefn.
 Les Espagnols, *ELEPHANTE*. Gefn. Aldrov.
 Les Italiens, *LEOPHANTE*. Gefn. Aldrov.
 Les Allemands, *HELFHANT*. Gefn. Aldro.
 Les Flamands, *ELEPHANT*. Aldrov.
 Les Anglois, *ELEPHANT*. Raj.

La grandeur seule de l'Eléphant suffit pour le distinguer des autres QUADRUPÈDES : c'est le plus grand de tous : il a jusqu'à 12 pieds de haut : mais les caractères que nous avons établis le feront encore mieux connaître. Il n'a point de dents incisives, mais il a à la mâchoire supérieure 2 dents canines, longues quelquefois de 5 ou 5 $\frac{1}{2}$ pieds, recourbées en en haut ; & en outre plusieurs dents molaires à chaque mâchoire. Entre ses 2 longues dents canines est une trompe plus longue encore & flexible, de laquelle il se sert pour prendre sa nourriture & la porter à sa bouche. Cette trompe n'est autre chose que le pro-

Elephas magnitudine, quàm antecellit, ab aliis QUADRUPEDIBUS satis abundè distinguitur. Omnium maximum est ; 12 pedum altitudinem attingit ; illius verò notæ caracteristica à quibuscumque, non speciei tantum, sed & genere differre demonstrant. Dentibus incisivibus omninò caret, sed maxillæ superiori 2 sunt dentes canini, 5 vel 5 $\frac{1}{2}$ pedum interdum longi, sursum recurvi : plures in utràque maxilla molares. 2 inter dentes longos caninos est proboscis adhuc longior, flexibilis, quàm, velut manu, utitur ad cibos colligendos, & ori admovent-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre III. 47

dos. Proboscis illa nihil aliud est quam nasus productus : auriculæ amplissimæ, circumcirca dentatæ, pendulæ : crura, pedesque crassi & rudes, unguulati inter & digitatos anomali esse videntur : pedes enim 5 digitis donantur, quorum phalanges omnes dissectione deteguntur, quæ verò aliter non apparent, cum in carne fungosa, substantiâ quasi corneâ omnino recta, contineantur : ambitus enim pedum 5 unguis obtusus, inter se connexis cuti ita indurata, ut ad substantiâ corneâ naturam accedat, terminatur : plantæ pedum cuti pariter indurata, & quasi corneâ teguntur. Cutis illa cum unguibus ipsis ita coheret, ut & ungues & cutis simul eripi possint, sicut *Equi* ungula. Præterea cutis illa indurata ipsa substantiâ corneâ dici posset : ab unguibus enim non differt, nisi quod ipsis sit mollior. Cutis corporis crassa est, non prorsus itrida, sed pilis rarioribus, crassis & satis longis, obsita : cauda pilis quibusdam etiam crassis terminatur. Habitat in *Africa* : in *Asia* majores.

Vide D. Georg. Christ. *Petri ab Hartenfels*, *Elephantographiam curiosam*.

longement de son nez. Ses oreilles sont grandes & larges, comme dentelées tout autour, & pendantes. Ses jambes & ses pieds, qui sont gros & malfaits, semblent tenir le milieu entre les *ongulés*, & les *digités*. Ses pieds ont réellement 5 doigts, dont on distingue bien toutes les phalanges par la dissection, mais qui sans elle ne sont point visibles, & qui sont renfermées dans une chair spongieuse, laquelle est comme entièrement couverte de corne ; car la circonférence des pieds est terminée par 5 ongles obtus, joints ensemble par une peau tellement endurcie, qu'elle approche de la nature de la corne. La plante des pieds est couverte d'une peau semblable, & le tout peut être arraché ensemble, comme le sabot d'un *Cheval*. On pourroit même regarder cette peau endurcie, comme de la corne ; car elle ne diffère des ongles, qu'en ce qu'elle est un peu plus molle qu'eux. Sa peau, qui est fort épaisse, n'est pas tout à fait nue ; on y trouve quelques poils gros & assez longs, ainsi qu'au bout de la queue. On le trouve en *Afrique* ; les plus grands sont en *Asie*.

Le genre de la Vache-marine.

Genus Odobeni.

Son caractère est

Hujus caractèr est

De n'avoir point de dents incisives;

Dentes incisores nulli:

D'avoir à la mâchoire supérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en embas:

Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ superiori affixi, longissimi, deorsum incurvi:

Point de trompe.

Proboscis nulla.

* I. LA VACHE-MARINE.

ODOBENUS.

Phoca denribus exsertis, Odobenus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 9. sp. 2.

Equus Marinus & Hippopotamus falsò dictus. Raj. syn. Quadr. p. 191.

Rosmarus. Klein. Quadr. p. 92. N° III.

Gesn. Pisc. p. 249. fig. p. 250. (Fig. mala. Peccat in pedibus).

Jonst. Pisc. p. 160. fig. T. 44. sup. isto nomine. Rosmarus verus [Fig. bona].

Vache - Marine. Hist. d'Isl. & de Gro. T. II. p. 159. fig. p. 168. [Fig. bonne].

Les Danois & Islandois l'appellent ROSMARUS. Raj.

Les Russiens, MORSE. Raj. Klein. Hist. d'Isl.

Les Hollandois, WALROS, WALRUS. Klein. Hist. d'Isl.

Les Flamands, WALRUS. Raj.

Les Anglois, MORSE, ou SEA-HORSE. Raj. SEA KOW. Klein. Hist. d'Isl.

Les Angle-Saxons, HORS-HWAL. Hist. d'Isl. Klein.

Les François des Côtes de l'Amérique, VACHE - MARINE, ou BESTE A LA GRANDE DENT. Hist. d'Isl. Klein.

Cet Animal est très grand : il a quelquefois jusqu'à 16 pieds de long, & environ 8 de tour. Il a 4 pieds courts, à chacun desquels sont 5 doigts, armés d'ongles, & joints ensemble par la peau. Les postérieurs sont tout-à-fait tournés en arrière, & semblent n'être autre chose

Monstruosum est hoc Animal. Longitudo corporis 16 pedes plerumque attendit; ambitus verò circiter 8. 4 habet pedes breves, in quibus singulis sunt 5 digiti, unguibus muniti, cute inter se connexi. Pedes posteriores retrorsum omnino spectant,

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre III.* 49
 tant, & nihil aliud, quàm que sa queue. Sa tête est grosse
 ipsius cauda, apparent. Ca- & écrasée sur le devant. Son
 put crassum & in anteriore museau est entouré de gros poils
 parte platum: rictus validif- roides : il n'a point de dents in-
 simis fetis obfusus est. Denti- cisives ; mais il en a à la mâ-
 bus incisoribus omnino caret; choire supérieure 2 canines ,
 in maxillâ verò superiore longues d'environ 2 pieds, re-
 duobus dentibus caninis, 2 courbées en enbas ; & en outre
 pedum circiter longis, deor- à chaque mâchoire 8 molaires ,
 sum incurvis, & in utràque 4 de chaque côté : il n'a point
 maxillâ 8 molaribus, 4 utrin- d'oreilles extérieures , mais à
 que, donatur. Auricularum chaque côté de la tête est un
 externarum loco, habet utrin- trou, par lesquels il entend. Sa
 que foramina quibus audit; peau a près d'un pouce d'épais-
 cutis, quæ pollicis ferè cras- seur , & est couverte d'un poil
 sitiem attingit, pilis brevi- court & roide, d'un brun jau-
 bus, rigidis, ex fusco fordi- nâtre. On le trouve dans tout
 dè flavis, tegitur. Habitat in le Nord.
 Regionibus Septentrionalibus.

2. LE LAMANTIN.

MANATUS.

- Manatus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 56. sp. 1.*
Klein. Quadr. p. 94. N^o. V.
 Manati. *Ggfn. Pisc. p. 253.*
Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 323.
 Manati, seu Vacca-Marina. *Raj. syn. Quadr. p. 193.*
Sloane. Vol. II. p. 329.
 Manati Indorum. *Aldro. Pisc. p. 728. fig. p. 729.*
Jonst. Pisc. p. 257.
 Manati Phocz Genus. *Clus. exot. p. 132. fig. p. 133.*
 Trichochus. *Art. Gen. Pisc. g. 51. sp. 1.*
Art. Synon. Pisc. g. 51. sp. 1.
 Bœuf-Marin. *Hist. de l'Acad. T. III. Part. 1. p. 191.*
 Les Espagnols l'appellent MANATI. *Klein. Art. Raj.*
 Les Portugais, PEZZE MOULLER, ou MUGER. *Art.*
 Les Flamands, SEEKOEGEN. *Art.*
 Les Anglois, MANATEE. *Art.*
 Les Habitans d'Amboine, DUTUNG, ou DOUTONG. *Art.*
 Les Habitans des bords de la Rivière des Amaraques, PAGE-BUTY. *Art.*

Je n'ai jamais vu le LAMANTIN : je ne sçais de quel genre il est ; car aucun Auteur n'a fait mention de ses dents. Je le place ici, jusqu'à ce que je sois plus instruit de son vrai caractère. Voilà la description qu'en donne le P. Labat, dans son *voy. aux Isles de l'Amerique*, Tome II. p. 201, où il dit l'avoir vu. « Il avoit 14 pieds 9 pouces de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à la naissance de la queue ; il étoit tout rond jusqu'à cet endroit-là. Sa tête étoit grosse, sa gueule large avec de grandes babines, & quelques poils longs & rudes au-dessus. Ses yeux étoient très petits par rapport à la tête, & ses oreilles ne paroissoient que comme deux petits trous. Le col est fort gros & fort court..... Les deux nageoires qu'il a un peu au-dessous du col, ressembloit assez aux pattes de la Tortue..... Le Lamantin femelle a deux mamelles rondes ; celles du Lamantin que j'ai mesuré avoient 7 pouces de diamètre sur 4 pouces ou environ d'élévation..... Ce Poisson, qui est tout rond, depuis la tête jusqu'à la naissance de la queue, avoit 8 pieds 2 pouces de circonférence. Sa queue étoit de 19 pouces de long, depuis sa naissance, jusqu'à son extrémi-

MANATUM nunquam vidit : cujus sit generis prorsus ignoro ; Authores enim nulli de illius dentibus locuti sunt. Post Odobenum eum repono, usquedum amplio rem illius cognitionem habeamus. P. Labat, in suo opere cui Titulus ; *voy. aux Isles de l'Amerique*. Tome II. p. 201, hoc Animal vidisse refert ; sicque id describit. » Ab extremitate rostri ad caudæ exortum 14 pedes & 9 pollices longitudine æquabat. Corpore erat tereti usque ad caudam. Caput erat crassum, oris rictus latus, labiis crassissimis donatus, quæ labia pilis quibusdam longis & rigidis adornabantur. Oculos habebat valdè exiguos pro ratione capitis, & auricularum loco duo erant exigua foramina. Collum valdè crassum est & breve.... Pinnae duæ, paulò infra collum sitæ, testudinis pedes æmulantur.... Fœmina duas habet mammas rotundas ; diameter earum, quas mensuravi, 7 pollices æquabat ; crassities verò 4 aut circiter pollices... Ambitus corporis illius Piscis, qui à capite ad caudæ exortum teres est, octo pedes & 2 pollices attingebat. Cauda ab exortu ad extremitatem

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre III.* 51

« 19 pollices longa erat; quâ
« parte latissima, 15 circiter
« pollices attingebat: & ver-
« sùs extremum crassities 3
« circiter pollices æquabat.....
« Cutis hujus Piscis corii Bo-
« vini duplicem ferè crassitiem
« in dorso æquat; in ventre
« verò multò minus crassa.
« Rugosa est, coloris ex cine-
« reo fulci, pilis ejusdem co-
« loris, raris, crassis, satque
« longis obsita.

Secundùm Authores om-
nes duobus tantùm pedibus
Manatus præditus est: attra-
men tantam habet cum *Qua-*
drupedibus analogiam, ut ad
eorum Classem cum pertine-
re putò; verisimile enim vide-
tur pedes posteriores cum
cauda connecti, eosque dis-
sectione posse detegi.

« té; elle avoit environ 15 pou-
« ces dans sa plus grande lar-
« geur: son épaisseur tout au bout
« étoit d'environ 3 pouces.... La
« peau de ce Poisson est épaisse
« sur le dos, presque comme
« deux cuirs de Bœuf, mais elle
« est beaucoup plus mince sous
« le ventre. Elle est de couleur
« d'ardoise brune, d'un gros
« grain & rude, avec des poils
« de même couleur, clairs se-
« més, gros, & assez longs.

Quoique tous les Auteurs
n'accordent que deux pieds à
cet Animal, il a tant d'analogie
avec les *Quadrupèdes*, que je
crois qu'il appartient à leur Claf-
se: & il y a toute apparence que
les pieds de derrière sont con-
fondus dans la queue, & qu'on
les découvroit par la dissection.





ORDRE IV.

LES. QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents incisives
à la mâchoire supérieure, &
qui en ont six à l'inférieure.

ORDO IV.

QUADRUPEDA

Dentibus incisivis in maxil-
lâ superiore nullis, in infe-
riore sex donata.

TOUS les QUADRUPEDES
de cet Ordre, comme
ceux de l'Ordre suivant, sont
ruminants; ils ont, comme eux,
quatre ventricules, mais ils n'ont
point de cornes: leurs pieds sont
fendus en deux doigts *onguiculés*,
& non pas *ongulés*, comme ceux
des *pieds fourchus*. La plante de
leurs pieds est couverte d'une
peau molle & un peu calleuse.
Cet Ordre ne contient qu'un seul
genre, qui est celui des Cha-
meaux.

VII.

Le genre du Chameau.

Son caractère est

De n'avoir point de dents incisi-
ves à la mâchoire supérieure,
d'en avoir six à l'inférieure:
D'avoir à chaque pied deux
doigts *onguiculés*.

Obs. Tous les QUADRUPEDES de ce
genre ont le col très long.

OMNIA hujus Ordinis
QUADRUPEDA, sicut
& sequentis, sunt ruminan-
tia. Quatuor ventriculos ha-
bent; non verò sunt cornige-
ra. Pedes habent in duos di-
gitos, non quidem *ungulatos*,
sicut *bifulca*, sed tantum *un-
guiculatos*, fissos. Plantæ pe-
dum cute molli & parumper
callosâ teguntur. In hoc Or-
dine unicum est genus, scilicet
Camelinum.

VII.

Genus *Camelinum*.

Hujus character est

Dentes incisorii in maxillâ
superiore nulli, in inferio-
re, sex:
In singulis pedibus digiti duo
ungiculati.

Obs. Omnia hujus generis *QUA-
DRUPEDA* collo longissimo donan-
tur.

** I. LE CHAMEAU.

Camelus duobus in dorso tuberibus..... CAMELUS.

Camelus duobus in dorso tuberibus, seu Bactrianus. Raj. syn. Quadr. p. 145, no. 2.

Camelus tophis-dorsi duobus, Bactrianus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 29. sp. 2.

Camelus, Beschet, Bactrianus fortissimus. Klein. Quadr. p. 41.

Camelus vel Camelus Bactriana. Gefn. Icon. Quadr. fig. p. 22. (Fig. bona).

Camelus. Aldrov. Quadr. Bis. p. 889. Fig. p. 907. (Fig. mala).

Gefn. Quadr. p. 162. Fig. p. 163. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 67. Fig. T. 43. sub isto nomine. Camelus Bactrianus, seu Dromedarius. (Fig. bon.).

Charles. Exer. p. 12.

Prosop. Alp. Egypt. Vol. II. p. 213. Fig. T. 13. (Fig. bona).

Les Hébreux l'appellent GAMA. Gefn.

Les Égyptiens, GAMA. Gefn.

Les Arabes, GEMAL. Gefn.

Les Grecs, KAMMOT.

Les Sarrasins, SHYMEL. Gefn.

Les Perses, SCHETOR. Gefn.

Les Illyriens, VUELBLUD. Gefn.

Les Espagnols, & les Italiens, CAMELLO. Gefn.

Les Allemands, KAMELTHIER. Gefn.

Les Anglois, CAMEL. Raj. Gefn.

A vertice ad caudam, 8 circiter pedes longus est. Caput, ab extremitate labii superioris ad occipitium, 23 pollices longum: auriculæ 4 pollices; cauda 2 pedes longa. 2 habet in dorso tubera, quorum posterius anteriori multò majus est. A parte superiore majoris istius tuberis ad terram usque, 7 pedum altus est. Labium superius ut in lepore fissum: pili ipsius longissimi sunt in tuberibus, in dorso, suprà caput, & ad collum; Il a, depuis le sommet de la tête, jusqu'à la queue, environ 8 pieds. Sa tête a, depuis l'extrémité de la lèvre supérieure, jusqu'à l'occiput, 23 pouces; les oreilles 4 pouces; la queue 2 pieds de long. Il a sur le dos 2 bosses, dont la postérieure est beaucoup plus considérable que l'antérieure. Depuis la partie supérieure de cette grosse bosse jusqu'à terre, il a 7 pieds de haut. Sa lèvre supérieure est fendue, comme celle d'un lièvre: il a des poils très longs sur

G üj

ses bosses, sur le dos, sur la tête, & au col: le reste du corps est couvert de poils courts. Ses pieds sont fendus en dessus seulement, & terminés par deux petits ongles. La plante des pieds est large, plate, très charnue, & couverte d'une peau molle, épaisse, & un peu calleuse. Il a 6 callosités aux jointures des jambes, sçavoir 2 à chacune des jambes de devant; la première & la plus haute étant en arrière à la jointure qui fait proprement le coude, & la deuxième en devant & plus bas à la jointure qui représente le pli du poignet. Chaque jambe de derrière en a aussi une à la première & plus haute jointure, qui est celle de devant & le véritable genou: outre ces 6 callosités, il en a une septième beaucoup plus considérable placée au-bas de la poitrine, fermement attachée au sternon. Le prépuce est fort long & regarde en arrière. Il n'a point de dents incisives à la mâchoire supérieure; il en a 6 à l'inférieure, & 3 dents canines de grandeur inégale de chaque côté à la mâchoire supérieure, & 2 à peu près semblables de chaque côté à la mâchoire inférieure. Le nombre des dents molaires varie. On le trouve dans la partie orientale de l'Asie.

in reliquo corpore breves. Pedes in parte superiore tantum sunt fissi, singuli duobus parvis unguibus in extremo donati: planta pedum lata, plana, admodum carnosâ, cute molli, crassâ, & parumper callosâ, tegitur. Articulorum crurum calli 6 sunt numero; nimirum ad singulos crurum anteriorum articulos singuli; prior & superior retrorsum ad partem cubitum propriè dictam; alter & inferior antorsum ad partem quæ carpo humano respondet. In singulis posterioribus cruribus unus etiam est callus ad primum & supremum articulum, qui antorsum flectitur, & verum genu est. Præter prædictos, septimus est callus, aliis multo major, ad imum thoracem, sterno firmiter adnexus. Prepuccium longissimum est & retrorsum. Dentibus incisivis in maxillâ superiore nullis, in inferiore 6 donatur, & præterea dentibus caninis magnitudine inæqualibus 3, utrinque in maxillâ superiore, & 2 similibus utrinque in maxillâ inferiore. Dentium molarium variat numerus. Habitat in partibus Asiae orientalibus.

** 2. LE DROMADAIRE.

Camelus unico in dorso tubere..... DROMEDARIUS.

Camelus unico in dorso gibbo, seu Dromedarius. Raf. syn. Quadr. p. 143. n° 1.

Camelus topho dorsu unico. Dromedarius. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 29. sp. 1.

Camelus minimus. Dromedarius. Klein. Quadr. p. 42.

Camelus Arabica, vel Camelus Dromas. Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 23. (Fig. bona).

Camelus Dromas. Gessn. Quadr. p. 171. Fig. p. 172. (Fig. bona).

Dromas. Prosp. Alp. Egypt. p. 223. Fig. T. 11. (Fig. bona, exceptis pedibus qui unguati apparent).

Dromedarius. Aldrov. Quadr. Bif. p. 909. Fig. p. 908. (Fig. mala).

Jonst. Quadr. p. 69. Fig. T. 43. sub isto nomine Camelus (Fig. bona, exceptis pedibus qui unguati apparent).

Charlett. Exer. p. 13.

Chameau. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 71. Fig. Pl. 7. (Fig. très-bons).

Les Chaldéens l'appellent HOGENAIN. Gessn.

Les Grecs, ἀρούρη.

Les Ethiopiens, RAGUARI, ou EBAMARI. Klein.

Les Maures, EGIN. Prosp. Alp.

Les Italiens, DROMEDARIO. Gessn.

Les Allemands, DROMEDARY. Gessn.

Les Anglois, CAMEL, ou DROMEDARY. Raf.

A precedente differt magnitudine, quâ ei cedit, & numero tubercum; quod ei unicum est in dorso. In aliis precedentii similis est. Sicut ille, labium habet superius fissum; pili ipsius longiores in tubere & ad collum siti sunt. Pedes pedibus precedentis similes habet, eisdemque in cruribus & thorace callos. Habitat in partibus Asiae occidentalibus; in Syria & Arabia frequens.

Il est plus petit que le précédent. Il en diffère aussi, parce qu'il n'a qu'une seule bosse sur le dos. D'ailleurs il lui ressemble assez: il a, comme lui, la levre supérieure fendue; ses plus longs poils sont sur sa bosse & au col. Ses pieds sont conformés de même que ceux du précédent; il a aux jambes & à la poitrine les mêmes callosités. On le trouve le plus communément aux paries Occidentales de l'Asie, savoir dans la Syrie & l'Arabie.

3. LE CHAMEAU DU PEROU.

Camelus pilis brevissimis vestitus.... CAMELUS PERUANUS.

Camelus Peruanus Glama dictus. Raj. syn. Quadr. p. 145. n.º. 3.

Camelus dorso levi, pectore gibboso. Glama. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 19. sp. 3.

Camelus spurius Peruanus, Glama dictus. Klein. Quadr. p. 42.

Ovis Perdana. Jonst. Quadr. p. 45. Fig. T. 46. (Fig. bona).

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 243. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 9.

Pelon Ichiatl Oquitli. Qvis Peruana. Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 660; [Fig. malá].

Petvichatl. Fern. Hist. N. Hisp. p. 11.

Les François l'appellent MOUTON DE PEROU.

Les Espagnols du Perou, GLAMA, ou LHAMA. Raj.

Il a depuis le sommet de la tête, jusqu'à la queue, 6 pieds; depuis la partie supérieure du dos, jusqu'à la plante des pieds, 4 pieds: le col long de 2 pieds depuis les épaules jusqu'au sommet de la tête; les oreilles assez longues; la tête allongée; la lèvre supérieure fendue; les yeux assez grands; le ventre large; le derrière plus élevé que le devant. Audessous de la poitrine est un esèce de tumeur semblable à un abcès de laquelle il semble qu'il découle continuellement un peu de pùs. Les individus de cette espèce varient en couleur comme nos brebis: les

Longitudo corporis à cer-
vice ad caudam 6 pedum
est: altitudo à dorso ad pe-
dis plantam, 4 tantum; colli
longitudo, à scapulis ad cer-
vicem, 2 pedum. Auriculæ
longæ; caput oblongum;
labium superius fissum; ocu-
li sat magni; cauda brevis;
venter latus; clunes ante-
riore parte alteriores. Sub
pectore, ubi thorax ventri
conneçtitur, est tuber vomica
similis, è quò aliquid ex-
crementi sensim manare vi-
detur. Colore variat hæc
species, sicut oves nostræ.
Modò est alba, modò ni-

gra,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre IV. 57

gra, modò fusca, modò ex
his coloribus variegata: hæc
ultima ab incolis *Moromo-*
ro (a) vocatur. Habitat in
Peruvia.
uns sont blancs, d'autres noirs;
d'autres bruns, & d'autres va-
riés de toutes ces couleurs: les
Habitans du pays appellent ces
derniers *Moromoro* (a). On le
trouve au *Perou*.

4. LA VIGOGNE.

Camelus pilis prolixis toto corpore vestitus.

Camelus seu Camelo congenet Peruvianum, lanigerum, Pacos dictum;

Ovis Indica, seu Peruviana vulgò. Raj. syn. Quadr. p. 147.

Camelus, gibbis nullis. Pacos. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 29. sp. 4.

Camelus laniger, Peruanus; Pacos; vulgò Ovis Peruviana. Klein. Qua-
dr. p. 42.

Ovis Chilensis. Jonst. Quadr. p. 46. Fig. T. 23. sub illo nomine, Vervex
alius peregrinus. (Fig. bona, exceptis pedibus anticis, qui in quatuor digi-
tos divisi sunt, cum in duos tantum dividi debeant).

Charlet. Exer. p. 9.

Ovis Peruana, Paco dicta. Maregr. Hist. Br. Fig. p. 244. (Fig. Bona).
Peccat tamen in pedibus anticis, sicut Jonstoni figura.

Ovis Peruana alia species ab incolis Pacos dicta. Hernand. Hist. Mex.
p. 663.

Præcedente minor est;
caput & aurículas, servatâ
corporis proportionē, mul-
tò minores habet. Clunes
anteriori parte non sunt
tiores. Totum corpus pilis
longissimis & mollissimis te-
gitur. Colore variat: hæc
species, sicut præcedens:
modò est nigra, modò al-
ba, modò subrufa, modò

Elle est plus petite que le
præcedent: elle a la tête & les
oreilles beaucoup plus petites
à proportion de la grandeur
du corps. Son derrière n'est
pas plus élevé que le devant;
tout son corps est couvert de
poils très longs & très fins:
elle varie en couleur, comme
le præcedent. Il y en a de noi-
res, d'autres blanches, d'au-

(a) Vide Euf. de Nieremb. p. 182.
Moromoro in eâ figuratur.

(a) Euf. Nieremb. p. 182. a donné la
figure du *Moromoro*.

tres roussâtres , & d'autres variées de toutes ces couleurs. On la trouve au *Perou* , dans le *Chili* , & dans la *nouvelle Espagne*. ex his coloribus variegata. Habitat in *Peruvia* , in *Chile* , & in *nord Hispania*.





ORDO V.

QUADRUPEDA

Dentibus incisivis in maxilla superiore nullis, in inferiore octo, & pede bisulco donata.

ORDRE V.

LES QUADRUPÈDES

Qui n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure, & qui en ont huit à l'inférieure, & le pied fourchu.

IN hoc Ordine continentur omnia QUADRUPEDA ruminantia, bisulca; quæ, sicut QUADRUPEDA præcedentis Ordinis, quatuor ventriculis prædita sunt. In tres Sectiones dividuntur. Prima continet ea quorum cornua sunt simplicia, ut *Hircus*, *Aries*, &c. Secunda ea quæ cornibus ramosis donantur, sicut *Cervus*. Tertia verò ea quæ non sunt cornigera, sicut *Tragulus*.

DANS cet Ordre sont compris tous les QUADRUPÈDES ruminants à pied fourchu: ils ont, comme ceux de l'Ordre précédent, quatre ventricules. Ils se divisent en trois Sections. Dans la première sont ceux qui ont des cornes simples, comme le *Bouc*, le *Belier*, &c. Dans la seconde sont ceux qui ont des cornes branchues, comme le *Cerf*; & dans la troisième ceux qui n'ont point de cornes, comme le *Chevrotain*.

SECTIO I.

Ea quorum cornua sunt simplicia.

SECTION I.

Ceux qui ont des cornes simples.

HUJUS Sectionis QUADRUPEDA in quatuor Genera dividuntur. Alia sunt cornibus sursum versis, inter

LES QUADRUPÈDES de cette Section se divisent en quatre Genres. Les uns ont les cornes tournées en haut: & ceux

Hij

là ou ont les cuissés de devant beaucoup plus longues que celles de derrière, comme la *Giraffe*, ou les ont à peu près d'é-gale longueur, comme le *Bouc*, le *Chamois*, &c. D'autres ont les cornes tournées vers le derrière, comme le *Bellier*; d'autres enfin les ont tournées vers les côtés, comme le *Bœuf*. Ces différentes directions de cornes serviront à distinguer ces Genres les uns des autres.

Obs. 1°. Lorsque je dis que les cornes sont tournées en enhaut, vers le derrière, ou vers les côtés, je ne veux parler que de l'origine de la corne; c'est-à-dire, que la partie par laquelle elle vient à la tête, se dirige vers le haut, ou le derrière, ou les côtés: toutes les autres courbures sont comprises pour rien, parcequ'elles varient très souvent.

Obs. 2°. Toutes les femelles de cette Section portent des cornes, ainsi que leurs mâles.

quæ alia femoribus anticis longissimis donantur, ut *Giraffa*, seu *Camelopardalis*; alia femoribus æqualibus, ut *Hircus*, *Rupicapra*, &c. Alia sunt cornibus retrorsum versis, sicut *Aries*; alia tandem cornibus ad latera versis, ut *Bos*. Diversis illis cornuum directionibus Genera ista satis abundè à se invicem differunt.

Obs. 1°. Cum dicuntur cornua sursum, retrorsum, aut ad latera versa, de ipsorum origine tantummodò loquitur; id est, pars cornuum quæ capiri adhærent, sursum, retrorsum, aut ad latera vertitur. Ad alios autem cornuum inflexus nullo modo attendi debet, quia sæpissimè variant.

Obs. 2°. Omnes hujus Sectionis fœminæ sunt cornigeræ, sicut & mares.

VIII.

Le Genre de la Giraffe.

Son caractère est
De n'avoir point de dents incisives à la mâchoire supérieure;
d'en avoir huit à l'inférieure:
D'avoir le pied fourchu:
Des cornes simples,
Tournées en enhaut:
Les cuissés de devant beaucoup plus longues que celles de derrière.

VIII.

Genus Giraffæ.

Hujus character est
Dentes incisores in maxilla superiore nulli, in inferiore octo:
Pes bifidus:
Cornua simplicia;
Sursum versa:
Femora anteriora posterioribus multò longiora.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre V. 61

1. LA GIRAFFE.

GIRAFFA. CAMELOBARDALIS.

Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis. Camelopardalis. Linn. *syss. nat. ed. 6. g. 31. sp. 1.*

Tragus bifulcorum mixtus: Giraffa; Camelopardalis. Klein. *Quadr. p. 122.*

Camelopardalis, Giraffa recentioribus dicta. Raj. *syn. Quadr. p. 90.*

Camelopardalis. Aldrov. *Quadr. Bif. p. 927. Fig. p. 931.* [*Fig. sat bona*].

Gefn. *Quadr. Fig. p. 160.* (*Fig. sat bona*).

Gefn. *Icon. Quadr. p. 41. Fig. p. 42.* (*Fig. sat bona*).

Jonst. *Quadr. p. 69. Fig. T. 39, & 45.* (*Fig. sat bonis*). & T. 40. sub illo nomine, Camelus Indicus. (*Fig. sat bona, si maculas præberet*).

Prosp. *Alp. Egypt. p. 236. Fig. T. 14. f. 4.* (*Fig. sat bona*).

Camelopardalus. Charlet. *Exer. p. 13.*

Giraffa quam Arabes Zurnapa, Græci & Latini Camelopardalin nominant. Bell. *Obs. p. 118. Fig. p. 119.* (*Fig. sat bona*).

Giraffa. Euf. Nieremb. p. 191.

Les Hébreux l'appellent ZAMER. Gefn.

Les Chaldéens, DEBA. Gefn.

Les Arabes, ZURNAPA. Raj. Bell. Prosp. *Alp. SERAPHAN.* Gefn. }

Les Perses, SERAPHAN, GIRNAFFA. Gefn.

Les Ethiopiens, NABIN Gefn. Klein. NABUDA. Jonst. Klein.

Les Allemands, GIRAFF. Gefn.

Longitudo corporis, à vertice ad caudam, 18 pedum est. Collum 7 pedum longum. Ad 16 pedes caput à terrâ efferre potest; femora (non verò crura) anteriora posterioribus multò longiora sunt: quare non nisi latè diductis cruribus anterioribus, cibum ex terrâ capere potest. Duo cornicula ex fronte eminent circiter 6 digitorum longitudine, ad apicem parumper incurva. Auriculæ sat magnæ sunt. A capitis vertice ad dorsum, jubam habet ut

Elle a depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, 18 pieds. Son col est long de 7 pieds: elle peut élever la tête à 16 pieds de haut: ses cuisses (& non pas les jambes) de devant sont beaucoup plus longues que celles de derrière: ce qui fait qu'elle ne peut prendre sa nourriture par terre, à moins qu'elle n'écarte beaucoup les jambes de devant l'une de l'autre. Elle a 2 petites cornes, longues d'environ 6 doigts, un peu courbées vers le bout; les oreilles assez grandes; une crinière comme un Cheval, de-

puis le sommet de la tête jusqu'au dos. (Il y en a qui n'ont point de crinière, c'est peut-être ce qui distingue les sexes.) Sa queue est courte & menue, & terminée par un bouquet de poils. Tout son corps est marqué de taches, dont les unes sont rondes, & les autres carrées. On la trouve en *Afrique*, & sur tout en *Ethiopie*.

Equus. (Sunt qui jubâ carent, per quod fortè sexus distinguuntur.) Cauda tenuis est & exigua, in acumine pilosa. Totum corpus maculis confpergitur, non quidem omnibus rotundis, sed aut obquadratis, aut rotundis. Habitat in *Africa*, & præsertim *Æthiopia*.

I X.

Le Genre du Bouc,

Son caractère est
De n'avoir point de dents incisives à la mâchoire supérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :
D'avoir le pied fourchu :
Les cornes simples,
Tournées en enhaut :
Les cuisses de devant égales en longueur à celles de derrière.

I X.

Genus Hircinum.

Hujus character est
Dentes incisores in maxilla superiore nulli, in inferioribus octo :
Pes bifidus :
Cornua simplicia,
Sursum versa :
Femora anteriora posterioribus longitudine æqualia.

* * 1. LE BOUC, LA CHEVRE DOMESTIQUE.

Hircus cornibus interioribus cultratis, exterioribus rotundatis, infra carinatis, arcuatis... HIRCUS ET CAPRA DOMESTICA.

Capra cornibus carinatis, arcuatis. Capr. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32.

sp. 1.

Faun. Suec. Linn. no. 42.

Capra Domestica. Raf. syn. Quadr. p. 77. n°. 3.

Sloane. Vol. II. p. 328.

Capra. Gessn. Quadr. Fig. p. 270. (Fig. bona).

Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 17. (Fig. bona).

Hircus Gessn. Quadr. p. 301. Fig. p. 302. (Fig. bona).

Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 16. (Fig. bona).

Capra & Hircus. Aldrov. Quadr. Bif. p. 619. Fig. p. 635. [Fig. sat bona].

Capra & Hircus Domestici. Jonst. Quadr. p. 46. Fig. T. 26. & 27. [Fig. bonis].

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre V. 63

Capra. Capra. *Rzac. Hist. nat. pol. p. 239.*

Rzac. Aud. p. 331.

Hircus Domesticus. *Charlet. Extr. p. 9.*

Tragus Domesticus. Hircus, Capra, Caper si castratus. *Klein. Quadr. p. 15.*

Hædus. *Gefn. Quadr. p. 314.*

Chèvre privée ou Domestique. *Kolbe. Tom. III. p. 35.*

Les François appellent le mâle BOUC ; la femelle, CHEVRE ; le jeune, CHEVREAU.

Les Latins, le mâle, VIRCUS ; lorsqu'il est châtré, CAPER ; la femelle, CAPRA ; le jeune, HÆDUS.

Les Chaldéens, le mâle, IZE ; la femelle, EZA. *Gefn.*

Les Grecs, le mâle, τράγος ; la femelle, αἴς.

Les Arabes, le mâle, MAEZ ; la femelle, SCHAAH. *Gefn.*

Les Sarrazins, ANSE. *Gefn.*

Les Perses, le mâle, BUSAN ; la femelle, BUZ. *Gefn.*

Les Espagnols, le mâle, CABRON ; la femelle, CABRA ; le jeune, CAERITO. *Gefn.*

Les Italiens, le mâle, BECCHO ; la femelle, CABRA ; le jeune, CAVRETTO. *Gefn.*

Les Allemands, le mâle, BOCK ; la femelle, GEISZ ; le jeune, GITSE ou TITSE LEIN. *Gefn.*

Les Illyriens, le mâle, KOZEL ; la femelle, KOZA. *Gefn.*

Les Polonois, KOZIEL. *Rzac.*

Les Suédois, GET. *Linn.*

Les Anglois, le mâle, GOTL-BUCK ; la femelle, GOAT ; le jeune, KYDD. *Raj.* *Gefn.*

Capra animal est ita notum ut descriptione non indigeat. Observabo tantum cornua esse interiùs cultrata, exteriùs rotundata, infrà carinata ; arcuata ; barbam, sive aruncum ex mento pendere, & Hircum odorem gravem spirare. Habitat domestica in omnibus ferè locis cultis, & fera in montibus.

La Chevre est un animal trop connu, pour qu'il soit nécessaire d'en faire la description. J'observerai seulement que ses cornes sont tranchantes à leur côté intérieur, arrondies à l'extérieur, concaves endessous ; & un peu courbées en arc : elle a une barbe assez longue qui lui pend sous le menton. Le mâle répand une odeur forte. On la trouve domestique dans presque tous les lieux habités, & sauvage sur les montagnes.

* 2. LA CHEVRE D'ANGORÁ.

Hircus pilis longissimis crispis toto corpore vestitus... CAPRÆ ANGORENSIS.

Chevre d'Angora. Voy. du Lev. To n. II. Fig. p. 463. (Fig. très bonne):

Elle differe de la *Chevre domestique* par la beauté de son poil, qui a 8 ou 9 pouces de long, qui est d'une blancheur éblouissante, fin & doux comme de la soye, & naturellement frisé. On la trouve à *Angora*.

A *Capræ domesticæ* differt pilis 8 aut 9 pollices longis, candidissimis, splendentibus, sericei modo mollissimis & tenuissimis, crispis. Habitat in *Angorâ*.

* 3. LE BOUC-ESTAIN.

Hircus cornibus suprà nodosis, infrà rotundatis, in dorsum reclinatis... IBEX.

Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 6.

Ibex. Raj. Syn. Quadr. p. 77. no. 2.

Aldro. Quadr. Bif. p. 730. Fig. p. 732. (Fig. mala).

Gesn. Quadr. p. 331. Fig. p. 1099. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 53. Fig. T. 28. (Fig. bona).

Charlet. Exerc. p. 10.

Ibex, nonnullis Capricornus. Klein. Quadr. p. 16.

Ibex, vel Capricornus apud recentiores: Capra fera Varroni. Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 35. (Fig. bona).

Hircus Ferus, quoddam genus Cretæ familiare, quod galli Bouc-Estain appellant. Bell. Obs. Fig. p. 20. (Fig. sat bona).

Caper Mon'anus Alberti. Aldro. Klein.

Les Chaldéens l'appellent JAELA. Gesn.

Les Grecs, Τυάγρις.

Les Perses, KOTZCOHI. Gesn.

Les Italiens & les Allemands, STEINBOCH. Aldro. Gesn. Jonst. Raj.

Les Suisses des montagnes, YBSCH. Aldro. Gesn.

Les Illyriens, KOZOROZIECH. Aldro. Gesn.

Les Flamands, WILDGHEIT. Aldrov.

Il est un peu plus grand que le *Bouc domestique*. Il a la tête *Hircus domesticus* paulò major est. Caput habet pro molle corporis

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 63

corporis parvum; cornua vasta, suprâ nodosa, infrâ rotundata, parumper arcuata, & in dorsum reclinata: crura gracilia sunt; cauda brevis; pilus ut in *Hirco* longus, fulvus. Mas prolixam nigricantem barbam gerit: foemina mareminor est. Habitat in *Alpibus*, *Helvetiâ*, & Archiepiscopatu *Salzburgensi*.

petite à proportion de la grandeur de son corps : ses cornes sont très grandes , garnies de nœuds en dessus , arrondies en dessous , un peu courbées en arc , & couchées sur le dos : ses jambes sont menues ; sa queue courte ; son poil est long , comme celui d'un *Bouc* , & de couleur fauve. Le mâle porte une grande barbe noirâtre : la femelle est un peu plus petite que lui. On le trouve dans les *Alpes* , en *Suisse* , & dans l'Archevêché de *Salzburg*.

4. LA PETITE CHEVRE D'AMÉRIQUE.

Hircus cornibus depressis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus... CAPRA PARVA AMERICANA.

Capra cornibus depressis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus: Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 2. & ed. 4. g. 30. sp. 2.

Magnitudo *Hædi* : pili longi, uti in precedente (*Capra domestica*) ; cornua lunulata, vix digitum longa, crassa, cranio adpressa, ut cutem ferè perforant. Hucusque *Linnaeus*. Habitat in *Americâ*.

Elle est de la grandeur d'un *Cheveau*. Ses poils sont longs, comme ceux de la *Chevresse*; ses cornes, qui sont à peine de la longueur du doigt, sont grosses, courbées en croissant, & si bien appliquées à la tête, qu'elles percent presque la peau. On la trouve en *Amérique*.

5. LE PETIT CHAMOIS D'AMÉRIQUE.

Hircus cornibus erectis, apice recurvis... IBEX PARVUS AMERICANUS.

Capra cornibus erectis, apice recurvis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 2. & ed. 4. g. 30. sp. 3.

Il est de la grandeur d'un Chevreau d'un an. Ses poils sont courts, comme ceux du Cerf; ses cornes, qui sont à peine de la longueur du doigt, sont élevées & courbées vers le bout. On le trouve en Amérique.

Magnitudo Hædi unius anni; pili breves, uti in cervino genere; cornua vix digitum longa. Huc usque Linnaeus. Habitat in America.

** 6. LE CHAMOIS, OU L'YZARD.

Mircus cornibus teretibus erectis, rugosis, ad apicem levibus & uncinatis... RUPICAPRA.

Capra cornibus erectis, uncinatis. Linn. *syft. nat. ed. 6. g. 32. sp. 5.*

Rupicapra. Raj. *Syn. Quadr. p. 78. No. 3.*

Gefn. Quadr. p. 321. Fig. p. 319. (Fig. sat bona).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 36. (Fig. sat bona).

Jonff. Quadr. p. 52. Fig. T. 27. (Fig. mala), & T. 32. (Fig. non equa mala).

Bell. Obs. Fig. p. 57. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 9.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 223.

Rzac. aut. p. 319.

Tragus Dorcas; Rupicapra; Caprea. Klein. *Quadr. p. 17.*

Dorcas, sive Rupicapra. Aldro. *Quadr. Bif. p. 725. Fig. p. 727. (Fig. mala).*

Chamois. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 203. Fig. Pl. 29. (Fig. bonne).

Kolbe. Tom. III. p. 38.

Les Hébreux l'appellent Zebi. Aldro.

Les Chaldéens, THABIA. Aldro.

Les Arabes, THABU. Aldro.

Les Perses, AMU. Aldro.

Les Espagnols, CAPRA MONTES. Aldro. *Gefn.*

Les Italiens, CAMUZA, ou CAMORCIA. *Gefn.*

Les Grisons, CAMUZA. Aldro. *Gefn.*

Les Peuples circonvoisins de Trente, COMOZZA. Charlet.

Les Allemands, GEMSS, ou GAMSS. Aldro. *Gefn. Raj. Rzac.*

Les Bohémiens, KORYTANSKY; KOZLIK. Aldro. *Gefn.*

Les Polonois, DZYKA-KOZA. Aldro. *Gefn. Rzac. KOZA SKALNA Rzac.*

Les Anglois, WILD GOOTE. Aldro. *Gefn.*

Il est de la grosseur d'une Chèvre; mais il a les jambes plus longues, & le poil plus court. Ses

Capra domestica crassitiem attingit; sed crura ipsius longiora sunt, & pilus brevior.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 87

Cornua 8 circiter pollices longa, nigra, teretia, erecta, rugosa, ad apicem leviter & uncinata. Labium superius parumper, ut in lepore, fissum. Auriculæ 5 pollices longæ, cauda 3 pollices. Pilus supra fuscus est aut rufus, infra verò ex fœdide albo rufescit. Cauda nigricat, & quidem utrinque, nec subtus alba est, ut in aliis. Habitat in Alpibus Helveticis, sed Rhæticis præcipuè frequens.

cornes ont environ 8 pouces de long ; elles sont noires, rondes, droites & élevées, garnies de rides, comme autant de petits anneaux ; mais lisses vers leur bout, qui est crochu. Sa lévre supérieure est un peu fendue, comme celle du Lièvre. Ses oreilles sont longues de 5 pouces ; sa queue de 3 pouces. La couleur de son poil est ordinairement brune ou rousse en dessus ; & en dessous d'un blanc sale & roussâtre. Sa queue est noirâtre dessus & dessous. On le trouve dans les Alpes Suisses, mais sur tout chez les Grisons.

* 7. LA GAZELLE DES INDES.

Hircus cornibus teretibus, longissimis, rectis, basi tantum annulatis... GAZELLA INDICA.

Capra cornibus teretibus rectissimis, longissimis, basi annulatis. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 8.

Gazella Indica cornibus rectis, longissimis, nigris, propè caput tantum annulatis. Raj. Syn. Quadr. p. 79. No. 5.

Klein. Quadr. p. 18.

Gazella. Prosp. Alp. Egypt. p. 232. Fig. T. 14. F. 1. (Fig. mala).

Elan. Kolbe. Tom. III. p. 32. Fig. p. 34. (Fig. bonne).

Ipsius altitudo, à parte superiore dorsus usque ad terram, circiter 2 $\frac{1}{2}$ pedum. Cornua, 3 propemodum pedes longa, nigra sunt, recta, ad basim tantum annulis eminentibus cincta, in reliqua longitudine leviter. Cauda 1 pedis fere longitudinem æquat. Pilus cinereus est. Habitat in India.

Elle a environ 2 $\frac{1}{2}$ pieds de haut, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre. Ses cornes, qui ont près de 3 pieds de long, sont noires, droites, comme garnies d'anneaux seulement à la base ; tout le reste de leur longueur est lisse. Sa queue est longue de près d'un pied. Tout son poil est gris. On la trouve dans l'Inde,

* 8. LA GAZELLE.

Hircus cornibus teretibus, dimidiato annulatis, bis arcuatis.

GAZELLA.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis, arcuatis. Linn. Syst. nat. ed. 6. p. 32. sp. 7.

Gazella Africana, Strepsiceros Plinii. Raj. Syn. Quadr. p. 79. No. 4.

Tragus strepsiceros, Gazella. Klein. Quadr. p. 18.

Capra strepsiceros. Aldro. Quadr. Bis. p. 740. ibi caput Fig. (Fig. bona):

Jonst. Quadr. p. 54. Fig. T. 24. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 10.

Strepsiceros Jo. Cati. Gess. Icon. Quadr. p. 38. ibi caput Fig. (Fig. bona):

Strepsiceros. Gess. Quadr. p. 323.

Mus. Worm. p. 339.

Gazelle. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 95. Fig. Pl. 11. (Fig. très bonne).

Les Arabes l'appellent ALGAZEL. Klein. Hist. de l'Acad.

Les Grecs. Στρεψικέρος.

Elle a à peu-près la forme & la grandeur d'un Chevreuil. Son poil est court, fauve par dessus le corps, & blanc sous le ventre & l'estomach. Ses jambes sont longues & menues ; sa queue longue environ d'un pied, & noirâtre ; ses oreilles très grandes, ayant intérieurement quelques rayes d'un poil très blanc. Ses cornes, qui ont 15 pouces de long, sont noires, comme garnies d'anneaux jusqu'à la moitié de leur longueur ; le reste est lisse : elles ne sont pas exactement droites, elles sont un peu courbées en dehors vers le milieu, & elles se rapprochent ensuite en dedans comme les branches d'une lyre. Ces cornes ont à leur racine une touffe de poil plus long que celui du reste du corps. On la trouve en Afrique.

Ad *Capreoli* formam & magnitudinem accedit. Pili breves sunt, suprà fulvi, in ventre & thorace albi ; crura longa & gracilia ; cauda pede circiter longa, nigricans ; auricula maxima, intus lineis pilorum albis striata. Cornua, 15 pollices longa, nigra sunt, transversim annulata usque ad dimidiam partem, alterâ parte levi : non sunt exactè recta, sed circa mediam partem extorsum flexa, deinde introrsum incurvata, ita ut lyram veterum figurâ suâ imitentur. Ad basin cornuum sunt pili, quàm in reliquo corpore longiores. Habitat in Africa.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 69

9. LA GAZELLE DU BÉZOAR.

Hircus cornibus teretibus, rectis, ab imo ad summum ferè annulatis, apice tantummodò levissimis. GAZELLA BEZOARTICA.

Animal Bezoarticum Orientale. *Raf. Syn. Quadr. p. 80.*

Tragus Bezoarticus. *Klein. Quadr. p. 19.*

Capra sive Hircus Bezoarticus. *Aldro. Quadr. Bis. p. 755. Fig. p. 756. (Fig. sat bona).*

Capra sive Hircus Bezoarticus, vel potiùs Pazaharticus. *Jonst. Quadr. p. 56.*

Hircus Bezoarticus. *Charlet. Exer. p. 11.*

Capricerva. *Kampf. p. 398. Fig. p. 407. F. 1. (Fig. sat bona).*

Les Perses l'appellent PASHAN. *Aldro. Jonst. Klein. PASEN. Kampf.*

Capram domesticam (aliqui *Cervum*) magnitudine adæquat. Pilis brevibus ex cinereo rufis vestitur. Barbam gerit ut *Capra*. Cornua ipsi teretia sunt, recta, sat longa, ab imo ad summum ferè annulata, apice tantummodò levissima. Cornua fœminis multò breviora quàm maribus. Habitat præcipuè in *Persidis* provinciâ *Laar*.

Elle est de la grandeur de la *Chèvre domestique*, (quelques Auteurs disent du *Cerv*). Son poil est court, & d'un gris mêlé de roux. Elle a une barbe sous le menton, comme la *Chèvre*. Ses cornes sont rondes, assez longues, droites, comme garnies d'anneaux presque-dû haut au bas ; il n'y a que le bout qui soit lisse. Les femelles ont les cornes beaucoup plus courtes que les mâles. On la trouve dans la province de *Laar* en *Perse*.

** 10. LA GAZELLE D'AFRIQUE.

Hircus cornibus teretibus, arcuatis, ab imo ad summum ferè annulatis, apice tantummodò levissimis. GAZELLA AFRICANA.

Capra cornibus teretibus perfectè annulatis arcuatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. §. 32. sp. 9.*

Gazella Africana cornibus brevibus ab imo ad summum ferè annulatis, & circà medium inflexis. *Raf. Syn. Quadr. p. 80. No. 6.*

Klein. Quadr. p. 18.

Algazel ex *Aphricâ*. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 393. (Fig. bona).*

Elle est de la grandeur d'un *Chevreuil*. Son poil est court, doux au toucher, fauve sur le dos, & blanc sous le ventre & aux côtés. Sa queue est assez longue & noirâtre: son col est épais; ses jambes très délicates: les postérieures sont plus longues que les antérieures. Ses oreilles sont longues, larges & ouvertes, garnies intérieurement de bandes de poils blanchâtres. Ses cornes sortent du milieu du front entre les deux yeux: elles sont longues d'un pied, rondes, comme garnies d'anneaux presque du haut au bas, n'ayant que la pointe de lisse, & courbées en arc. Leur couleur est un maron foncé. On la trouve en *Afrique*, & en la *Nouvelle Espagne*.

*Capreoli magnitudinem attingit. Pilo est brevis, levis, in dorso fulvò, in ventre & lateribus candicante; caudâ sat longâ nigricante. Collum habet crassum; crura admodum gracilia; posteriora anterioribus longiora; aurículas longas, magnas, patulas, intus fibris pilosis candicantibus ornatas. Cornua è frontis medio inter oculos oriuntur; uno pede longa sunt, teretia, ab imo ad summum ferè annulata, apice tantummodò levi, arcuata: colore sunt ex castaneo nigricante. Habitat in *Africâ & Novâ Hispaniâ*.*

11. LA GAZELLE DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Hircus cornibus teretibus, circâ medium inflexis, ab origine ad flexuram spiraliter canaliculatis, à flexurâ ad apicem levibus... GAZELLA NOVÆ HISPANIÆ.

Tragulus Temamaçama. Klein. Quadr. p. 21.

Cervus Temamaçama, live Macatlchichiltic dictus. Seb. Vol. 1. p. 69.

Fig. T. 42. F. 4. (Fig. bona).

Tamamaçame. Jonst. Quadr. p. 63.

Temamaçame, Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 325. (Fig. mala).

Elle est à peu-près de la grandeur d'un *Faon de Biche*. Tout son corps est couvert de poils d'un châtain clair, & court: ceux de sa queue sont plus longs: ses oreilles sont grandes: ses cornes sont d'un beau noir, rondes,

Hinnuli magnitudinem circiter æquat. Corpus undique vestitur pilis dilutè spadiceis, & brevibus: cauda verò pilis longioribus obsita est; auriculæ magnæ: cornua dilutè nigra sunt, teretia, circâ me-

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre V.* 71

dium inflexa, ab origine ad flexuram spiraliter canaliculata, à flexurâ verò ad apicem levia. Habitat in rupibus & altis montibus *Nova Hispania.*

courbées vers le milieu, cannelées en spirale depuis leur origine jusqu'à la courbure, & lisses dans le reste de leur longueur. On la trouve sur les rochers & les hautes montagnes de la *Nouvelle Espagne.*

* 12. LA CHEVRE DU LEVANT.

Hircus cornibus suprà rotundatis, infrà planis, semicirculum referentibus... CAPRA ORIENTALIS.

Tragelaphus Bellonii. Raj. Syn. Quadr. p. 82. No. 114.

Gesn. Icon. Quadr. p. 38. Fig. p. 39. (Fig. bona).

Tragelaphus. Bell. Obs. Fig. p. 57. (Fig. bona).

Arietis magnitudinem circiter adæquat. Pilus ei longus est & fulvus. Crura albicant. Os album est, ut etiam tota ventris pars inferior, & femora sub caudâ; nares verò & cauda nigre. Colli pars prona & supina, sicut & pectus, villis ita longis obsita sunt, ut barbata videatur. Pili etiam scapularum longi sunt ac nigri: utrinque ad latera macula est cinerea. Ore, fronte, & auriculis ovem refert. Cornua ipsius suprà sunt rotundata, infrà plana, & semicirculum quodammodo referunt.

Elle est à peu-près de la grandeur d'un *Bellier*. Son poil est long & fauve: ses jambes sont blanchâtres: son museau est blanc, ainsi que toute la partie inférieure du ventre, & les cuisses vers la queue. Les narines & la queue sont noires. Elle a le col couvert dessus & dessous, ainsi que la poitrine, de poils si longs, qu'elle paroît avoir une barbe. Les poils qui couvrent les épaules sont aussi longs & noirs. Elle a de chaque côté vers les flancs une tache grise. Son museau, son front, & ses oreilles sont semblables à celles d'un *Bellier*. Ses cornes sont arrondies en dessus, applaties en dessous, & représentent en quelque façon un demi cercle.

13. LA CHEVRE DE SIRIE.

Hircus cornibus minimis, erectis, parumper retrorsum incurvis, auriculis longissimis, pendulis... CAPRA SYRIACA.

- Capra auribus pendulis longissimis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 11.*
Capra Mambrina, seu Syriaca Gesneri, auribus ad terram ferè demissis. Raj. Syn. Quadr. p. 81. No. 8.
Capra auribus demissis. Jonst. Quadr. p. 57. Fig. T. 26. sub illo nomine. Capra Mambrina. (Fig. bona).
Capra Mambrina. Gesn. Quadr. p. 271.
Capra Indica, aut Mambrina, aut Syriaca potius. Gesn. Quadr. Fig. p. 1098. (Fig. bona).
Capra Indica à recentioribus quibusdam Mambrina cognominata. Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 18. (Fig. bona).

Elle est un peu plus grande que la *Chevre domestique*. Sa couleur est un fauve clair : ses cornes sont noires , longues de $2\frac{1}{2}$ doigts , élevées , & un peu recourbées en arriere ; mais on la distingue très aisément de toutes les autres especes de son genre par ses grandes & longues oreilles qui pendent jusqu'à terre. On la trouve sur la montagne de Mambre en Syrie.

Capram domesticam magnitudine antecellit. Pilo dilutè fulvo vestitur. Cornua nigra sunt , $2\frac{1}{2}$ digitorum longa , erecta , & parumper retrorsum incurva. In eo autem ab omnibus aliis sui generis speciebus maxinè differt , quòd auriculas longissimas , usque ad terram pendulas , habeat. Habitat in Mambre , Syrie monte.

14. LA CHEVRE DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Hircus cornibus teretibus, erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis... CAPRA NOVÆ HISPANIÆ.

- Tragulus Mazame, seu Cervus cornutus, ex Novâ Hispaniâ. Klein. Quadr. p. 21.*
Mazame seu Cervus cornutus ex Novâ Hispaniâ. Seb. vol. 1. p. 69. Fig. T. 42. F. 3. (Fig. optima).
Mazame seu Cervus. Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 324. (Fig. mala). Cornua ramosa, quod malè.
Maçame. Jonst. Quadr. p. 63.

Pilus

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre V.* 73

Pilus totius corporis sub-
ruffus est, paulò tamen dilu-
tior in capite & ventre. Caput
habet & collum brevia & cras-
sia; aurículas magnas, &
flaccidas; caudam crassam &
obtusam. Cornua gerit tere-
tia, erecta, parumper arcua-
ta, ab imo ad summum spir-
aliter intorta. Habitat in *novâ*
Hispaniâ.

Tout son corps est couvert
d'un poil rouffâtre: celui qui
couvre la tête & le ventre est
d'un roux moins foncé. Elle a la
tête & le col gros & courts; les
oreilles grandes & pendantes; la
queue grosse & obtuse. Ses cor-
nes sont rondes, élevées, un peu
courbées en arc, & cannelées en
spirale du haut au bas. On la
trouve dans la *nouvelle Espagne*.

15. LA CHEVRE DE CRÈTE

Hircus laniger, cornibus teretibus, erectis, ab imo ad summum
spiraliter intortis... *CAPRA CRETENSIS*.

Ovis cornibus erectis spiralibus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 2.

Aries strepsiceros cornibus erectis, & in ambitu canaliculatis, Cretensis.

Klein. Quadr. p. 14.

Ovis strepsiceros Cretica Bellonii. Raf. Syn. Quadr. p. 75. N^o 3.

Cretensis aries strepsiceros nominatus. Bell. Obs. p. 20. Fig. p. 21. [Fig. bona].

Strepsiceros Bellonii. Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 37. [Fig. bona].

Aries Cretensis. Aldrov. Quadr. Bis. p. 406. Fig. p. 407. (Fig. bona).

Ovis Cretensis. Jonst. Quadr. Fig. T. 45. [Fig. bona].

Ovis domestica magnitudi-
nem adæquat, eique similli-
ma est in omnibus, exceptis
cornibus, quæ non, ut *Ovi-*
bus, reflexa sunt, sed teretia,
recta, erecta, & ab imo ad
summum spiraliter intorta.
Habitat in *Cræta*, & præser-
tim in *Monte Ida*.

Elle est de la grandeur de la
Brebis domestique, & elle lui
ressemble en tout, excepté en
ses cornes, qui au lieu d'être
contournées, comme dans les
Brebis, sont rondes, droites &
cannelées en spirale du haut au
bas. On la trouve en *Crète*, &
surtout sur le *Mont Ida*.

X.

X.

Genus Arietis.

Le Genre du Bellier.

Hujus character est
Dentes incisores in maxillâ

Son caractère est
De n'avoir point de dents incis-

K

74 LE REGNE ANIMAL:

ves à la mâchoire supérieure, superiore nulli, in inferiore:
d'en avoir huit à l'inférieure: octo:
D'avoir le pied fourchu: Pes bisulcus:
Des cornes simples, Cornua simplicia;
Tournées en arrière. Retrorsum versa.

Obs. Le grand nombre de nos Brebis domestiques, sur-tout les femelles, n'ont point de cornes; mais ces Animaux nous sont trop familiers, pour que, malgré le défaut de ce caractère générique, nous puissions nous y méprendre.

Obs. Pleræque Oves domesticæ, præsertim fœminæ, carent cornibus; sed nobis nimis nota sunt hæc Animalia, ut hujus caracteris generici defectus nos in errorem inducat.

** I. LA BREBIS DOMESTIQUE.

Aries laniger, caudâ rotundâ, brevi... OVIS DOMESTICA.

Ovis cornibus compressis lunatis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. N^o. 43.

Ovis domestica, cujus mas Aries dicitur, fœtus Agnus. Raj. Syn. Quadr. p. 73. No. 1.

Sloane. vol. II. p. 328.

Aries, Ovis, Vervex, Agnus. Klein. Quadr. p. 13.

Ovis. Aldro. Quadr. Bis. p. 370.

Gefn. Quadr. p. 872. Fig. p. 873. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 14. [Fig. bona].

Jonst. Quadr. p. 38.

Charlet. Exer. p. 8.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 242.

Rzac. Aut. p. 332.

Aries. Gefn. Quadr. p. 912.

Jonst. Quadr. Fig. T. 22. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 9.

Vervex. Gefn. Quadr. p. 925.

Jonst. Quadr. Fig. T. 22. [Fig. bona].

Charlet. Exer. p. 9.

Agnus. Gefn. Quadr. p. 917.

Jonst. Quadr. Fig. T. 22. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 9.

Les François appellent le mâle BELLIER; lorsqu'il est châtré, MOUTON; la femelle, BREBIS; le jeune, AGNEAU.

Les Latins le mâle, ARIES; lorsqu'il est châtré, VERVEX; la femelle, OVIS; le jeune, AGNUS.

Les Hebreux le mâle, AIL, & EEL; la femelle, ZON, ZONEH; le jeune, KEZES. Gefn. Aldro.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 75

Les Chaldéens le mâle, DIKERIN ; la femelle, ANA ; le jeune, IMAR. *Gefn. Aldro.*

Les Grecs le mâle, KPIE ; la femelle, OI.

Les Arabes le mâle, KABA ; la femelle, GENAS ; le jeune, ELG. *Gefn. Aldro.*

Les Sarrafins, GANEME. *Gefn. Aldro.*

Les Perses le mâle, NERAMEISCH ; la femelle, GOSPAND ; le jeune, BARAN. *Gefn. Aldro.*

Les Espagnols le mâle, CARNÉRO ; la femelle, OVELA ; le jeune, CORDERO. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens le mâle, MONTONE, ou ARIETE ; la femelle, PEGORA ; le jeune, AGNA, AGNO, AGNELLO. *Gefn. Aldro.*

Les Suisses le mâle, HERMAN. *Gefn. Aldro.*

Les Illyriens OWCE, ou SKOP. *Gefn. Aldro.*

Les Polonois, OWCA. *Rzac.*

Les Allemands le mâle, WIDER ; la femelle, SCHAAFF ; le jeune, LAMB ; L' MBLIN. *Gefn. Aldro. Rzac.*

Les Flamands le mâle, WIDER ; la femelle, SCHAEF ; le jeune, LAM. *Aldro.*

Les Suédois, FOAR. *Linn.*

Les Anglois le mâle, RAM, ou TUP ; la femelle, SHREEPE ; le jeune, LAMB, ou HOGG. *Gefn. Aldro.*

Les Ecoissois, HEIRTH. *Aldro.*

Les Habitans de Madagascar, AGARONE. *Aldro.*

Ovis est animal ita notum,
ut descriptione non indigeat.
Habitat in omnibus ferè locis
cultis.

La Brebis est trop connue ;
pour qu'il soit nécessaire d'en faire
la description. On la trouve
dans presque tous les lieux habi-
tés.

** 2. LA BREBIS A LARGE QUEUE.

Aries laniger, caudâ latissimâ... OVIS LATICAUDA.

Ovis cornibus compressis, lunatis. Ovis laticauda. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 1.*

Ovis laticauda Arabica. *Raj. Syn. Quadr. p. 74. N^o. 2.*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [Fig. bona, exceptâ caudâ].

Aldro. Quadr. Bif. p. 404.

Ovis Arabica. *Jonst. Quadr. p. 44. Fig. T. 23. [Fig. bona].*

Aries sive Ovis Orientalis. *Klein. Quadr. p. 14.*

Ovis Turcica. *Charlet. Exer. p. 9.*

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 243.

Les Italiens l'appellent PECORA D'ARABIA CON LA CODA LARGA. *Gefn.*

Les Allemands, SCHAAFFSIZ ARABIA MIT EINEM BREITEN SCHWANTZ. *Gefn.*

Elle est un peu plus grande que la précédente: elle en diffère encore par sa queue très épaisse & extrêmement large. J'en ai vu qui avoient 1 pied de large & 3 pouces d'épaisseur: elles avoient à peu près la figure d'un coussin. On la trouve en *Afrique*, en *Syrie*, & en *Arabie*.

A precedente differt magnitudine, quâ eam paulum antecellit, & caudâ crassissimâ & latissimâ. Hujusmodi caudas vidi 1 pede latas, & 3 pollicum crassas. Cubital figurâ suâ sat benè imitabatur. Habitat in *Africâ*, *Syriâ*, & *Arabid*.

3. LA BREBIS A LONGUE QUEUE.

Aries laniger, caudâ longissimâ... OVIS LONGICAUDA.

Ovis Arabica altera. Raj. syn. Quadr. p. 74.

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [Fig. bona].

Ovis Arabix longicauda. Aldrov. Quadr. Bif. p. 404. Fig. p. 405. [Fig. mala].

Ovis Arabica. Jonst. Quadr. p. 44. Fig. T. 23. [Fig. bona].

Les Italiens l'appellent PECORA D'ARABIA, con la coda longa. Gefn. Les Allemands, ANDERLEY SCHAAFFUSZ ARABIA, MIT EINEM LANGEN SCHWANTZ. Gefn.

Celle-ci ne diffère de la *Brebis domestique* que par la longueur de sa queue, qui a quelquefois jusqu'à 3 pieds de long. On la trouve en *Arabie*.

Hæc ab Ove domesticâ differt tantum longitudine insolitâ caudæ, quæ interdum 3 pedes longa est. Habitat in Arabid.

4. LA BREBIS D'AFRIQUE.

Aries pilosus, pilis brevibus vestitus... OVIS AFRICANA.

Ovis Africana pro vellere lanoso pilis brevibus hirtis vestita. Raj. Syn. Quadr. p. 75. N. 4.

Sloane. Vol. II. p. 328.

Ovis Æthiopica. Charlet. Exer. p. 9.

Elle ressemble à la *Brebis domestique* par la forme extérieure du corps; mais au lieu d'avoir, comme elle, le corps couvert de laine, elle l'a couvert de poils courts. On la trouve en *Afrique*.

Quoad formam corporis externam Ovis domesticis persimilis est; sed loco lanæ, corpus pilis brevibus vestitur. Habitat in Africâ.

5. LA BREBIS DE GUINÉE.

Aries pilosus, pilis brevibus vestitus, jubâ longissimâ, auriculis longis pendulis... OVIS GUINEENSIS.

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 3.

Ovis Guineensis sive Angolenſis Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 75. No. 5.*

Sloane. Vol. II. p. 328.

Aries Guineensis. Klein. Quadr. p. 14.

Jonst. Quadr. Fig. T. 46. [Fig. bona].

Barr. Hist. Fr. Eq. p. 149.

Aries Guineensis, sive Angolenſis. Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 234. (Fig. bona).

Aries albus Judæorum. Klein.

Caper Mambrius. Charles. Exer. p. 10.

Les Congois l'appellent MEMERIAN BACALA. Marcgr.

Ovis domestica magnitudinem aequat. Sicut illa, colore variat. Occipitum magis prominet: auriculæ longæ sunt & pendulæ; caput crassum; cornua parva, deorsum, usque ad oculos, incurvata, & quasi torta. Cauda usque ad suffragines. Lanâ caret; sed pilis brevibus universum corpus, excepto collo inferiore longissimis pilis obsito, vestitur. Habitat in Guinea & Brasilia.

Elle est de la grandeur de notre *Brebis domestique*. Elle varie en couleur, comme elle. Le derrière de sa tête est plus élevé: ses oreilles sont longues & pendantes; sa tête grosse; ses cornes petites, recourbées en arrière, comme tortillées, & revenant jusqu'aux yeux. Sa queue lui descend jusqu'aux jarrets. Elle n'a point de laine: tout son corps est couvert de poils très courts; excepté la partie inférieure du col, qui est couverte de poils très longs. On la trouve en Guinée & au Brésil.

X I.

Genus. Bovinum.

Hujus character est
Dentes incisores in maxillâ

X I.

Le Genre des Bœufs.

Son caractère est
De n'avoir point de dents incisives.
Kij.

sives à la mâchoire supérieure, d'en avoir huit à l'inférieure : superiore nulli, in inferiore octo :

D'avoir le pied fourchu : Pes bifulcus :
Des cornes simples, Cornua simplicia,
Tournées vers les côtés. Ad latera versa.

** 1. LE BœUF DOMESTIQUE.

Bos cornibus levibus, teretibus, fursum reflexis... BOS DOMESTICUS.

Bos cornibus teretibus flexis. Taurus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 1.*

Faun. Suéc. Linn. N°. 44.

Bos domesticus. *Raj. syn. Quadr. p. 70. N°. 1.*

Jonst. Quadr. p. 26. Fig. T. 13. 14. 15. (Fig. bonis).

Sloane. Vol. II. p. 327.

Charlet. Exer. p. 8.

Bos. *Aldrov. Quadr. Bif. p. 13. Fig. p. 36. (Fig. bona).*

Gefn. Quadr. Fig. p. 24. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 12. (Fig. bona).

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 237.

Rzac. Aud. p. 329.

Taurus domesticus cum Vacca. *Klein. Quadr. p. 10.*

Taurus. *Gefn. Quadr. Fig. p. 103. [Fig. bona].*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 10. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 8.

Vacca. *Gefn. Quadr. Fig. p. 25. (Fig. bona).*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 11. [Fig. bona].

Charlet. Exer. p. 8.

Vitulus. *Gefn. Quadr. p. 124.*

Taureau. *Hist. Nat. Gen. & Part. ed. in-quarto. Tom. IV. p. 474. Fig. Pl. XIV. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 138. Fig. Pl. IV. [Fig. tres bonnes.]*

Les François appellent le mâle TAUREAU ; lorsqu'il est châtré, Bœuf ; la femelle, VACHE ; le jeune, VEAU.

Les Latins le mâle, TAURUS ; lorsqu'il est châtré, Bos ; la femelle, VACCA ; le jeune, VITULUS.

Les Hébreux le mâle, SCHOR ; lorsqu'il est châtré, ALEPH ; la femelle, BAKA ; le jeune, EGEL. *Gefn. Aldro.*

Les Chaldéens le mâle, THOR, ou TORA ; la femelle, TORATA ; le jeune, EGELA. *Gefn. Aldro.*

Les Arabes le mâle, TAUR ; le jeune, EGELA. *Gefn.*

Les Grecs, Βœ.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 79

Les Espagnols le mâle, TORO BUYREZIO ; lorsqu'il est châtré, BUEY ; la femelle, VACA ; le jeune, TERNERA. *Gefn. Aldro.*
Les Italiens le mâle, TORO ; lorsqu'il est châtré, BUE ; la femelle VACCA ; le jeune, VITELLO. *Gefn. Aldro.*
Les Illyriens, WUL. *Gefn. Aldro.*
Les Polonois, WOL. *Rzac.*
Les Allemands le mâle, STIER ; lorsqu'il est châtré, OCHSS, ou RIND ; la femelle, KÜ, ou KÜHE ; le jeune, KALB. *Gefn. Aldro.*
Les Flamands le mâle, STIER ; lorsqu'il est châtré, Os ; la femelle, KOE ; le jeune, CALF. *Aldro.*
Les Suédois, KO, NÖT. *Linn.*
Les Anglois le mâle, BULL ; lorsqu'il est châtré, Ox ; la femelle, Cow ; le jeune, CALF. *Raj. Gefn. Aldro.*

Bos est Animal ita notum, ut descriptione non indigeat. A reliquis sui generis differt cornibus suis levibus & minimè rugosis, fursum reflexis. Habitat ubique in locis cultis. Amplissimè describitur in libro cui titulus : *Histoire Nat. Gén. & Part. Ed. in-4°. Vol. IV. p. 474. & seq. & Ed. in-12. Vol. VIII. p. 138. & seq.*

Le Bœuf est un Animal si connu, qu'il n'est pas nécessaire d'en faire la description. On le distingue aisément de ceux de son genre par ses cornes lisses, & recourbées en enhaut. On le trouve dans tous les lieux habités. On le trouvera amplement décrit dans l'*Hist. Nat. Gén. & Part. Ed. in-4°. Tom. IV. p. 474. & suiv. & Ed. in-12. Tom. VIII. p. 138. & suiv.*

2. LE BUFFLE D'AFRIQUE.

Bos cornibus teretibus, fursum reflexis, in sese recurvis... BUBALUS AFRICANUS.

Bos Africanus Bellonii, quem pro Bubalo veterum habet. *Raj. Syn. Quadr. p. 73. N°. 6.*

Exiguus Africanus Bos. *Klein. Quadr. p. 11.*

Elegans & parvus Africanus Bos, quem veteres Græci Bubalum appellarunt. *Bell. Obs. Fig. p. 119. (Fig. bona).*

Bubalus. *Gefn. Quadr. p. 330.*

Bubalus Africanus. *Charlet. Exer. p. 8.*

Fubalus Africanus Bellonii. *Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 33. (Fig. bona).*

Bubalus veterum. *Aldro. Quadr. Bif. p. 363. Fig. p. 364. (Fig. bona).*
Jonst. Quadr. p. 37. Fig. T. 18. sub isto nomine, Bubalus Africanus. [Fig. sat bona].

Silvestris Juvenca, *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 233. Fig. T. 14. Fig.*

2. (*Fig. bona*).

Les Hébreux l'appellent JACHMUR. *Gefn.*

Les Perses, MOSKANBAZ. *Gefn.*

Sa grandeur tient le milieu entre celles du Cerf & du Chevreuil. Il a le col court & épais ; la peau qui y pend est courte : ses épaules sont larges & épaisses ; ses jambes courtes : sa queue, qui lui descend jusqu'aux jarrets, est couverte de poils noirs, une fois plus gros que le crin des Chevaux ; ses cornes sont noires, rondes, courbées en enhaut en forme de croissant, & leurs deux pointes se touchent presque. Ses poils sont jaunes, lisses, & luisans ; son ventre est cependant d'un roux jaunâtre ; & son dos approche du brun. On le trouve en *Afrique*.

Corpore minor est Cervo ; sed Capreolo major. Collum habet crassum & breve, exiguus præditum pælearibus ; armos elatos & plenos ; crura brevia ; caudam ad poplites usque promissam, nigris pilis oblitam, duplo quàm Equini crassioribus ; cornua nigra, teretia, fursùm lunæ crescentis in modum reflexa, in sese recurva. Pili ejus flavi sunt, splendentes & leves : venter ex ruffo flavescit ; dorsum vero ad fuscum accedit. Habitat in *Africa*.

3. L'AUROCHS.

Bos cornibus crassiss, brevibus, fursùm reflexis, fronte crispâ. URUS.

Bos cornibus teretibus flexis. Urus. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 3.

Urus, Bison. Klein. Quadr. p. 11.

Urus. Raj. Syn. Quadr. p. 70. N^o. 2.

Aldro. Quadr. Bis. p. 346. Fig. p. 348. [Fig. mala], & p. 349. (Fig. sat bona).

Gefn. Quadr. Fig. p. 157. [Fig. mala].

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 29. [Fig. sat bona]. & p. 30. [Fig. mala].

Jonst. Quadr. p. 36. Fig. T. 20. [Fig. sat bona].

Charlet. Exerc. p. 8.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 228.

Rzac. Aud. p. 323.

Les Allemands l'appellent UROCHS, ou AUROCHS. *Raj. Gefn. Aldro. AVEROCHS. Rzac.*

Les Illyriens, ZUBR. *Gefn. Aldro.*

Les

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 83

*Les Polonois & les Lithuaniens, THOR. Klein. Gsf. Aldro. TUR; WOT-
DZIKI. Rzac.*

Les Flamands, UROS. Aldro.

Les Anglois, BULGES, où BUFFES. Gsf. Aldro.

Quoad formam corporis Il ressemble au Bœuf domesti-
 que par la forme extérieure du
 externam & colorem, Bovi corps & la couleur ; mais il en
 domestico similis est ; ab eo au- diffère par sa grandeur, qui ap-
 tem differt magnitudine, quæ proche de celle de l'Elephant ;
 ad Elephantinam accedit ; par ses cornes courtes, grosses,
 cornuum brevitatem, crassitie, & fortes ; & par un bouquet de
 & validitate ; & fronte crispâ. poils frisés qu'il a sur le front. On
 Habitat in Polonia, Borussia, le trouve en Pologne, en Prusse,
 Livonia, & Moscovia. dans la Livonie, & dans la Mos-
 covie.

** 4. LE BUBALE

Bos cornibus compressis, sursum reflexis, resupinatis, fronte
 crispâ... BUBALUS.

Bos cornibus vastis, intortis, resupinatis. Bubalus. Linn. *Jyfl. nat. ed. 6. g.
 34. sp. 4.*

Bubalus. Raj. *Syn. Quadr. p. 72. No. 5.*

Gsf. Quadr. Fig. p. 139. (Fig. mala).

Gsf. Icon. Quadr. Fig. p. 13. (Fig. mala).

Prosp. Alp. Egypt. Vol. II. p. 228.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 239.

Buffelus. Klein. *Quadr. p. 10.*

Charlet. Exer. p. 8.

Buffelus, sive Bubalus vulgaris. Aldro. *Quadr. Bif. p. 365. Fig. p. 366.
 (Fig. pessima).*

Jonst. Quadr. p. 38. Fig. T. 10. (Fig. bona).

Buffle. Kolbe. *Tom. III. p. 25. Fig. p. 54. f. 3. (Fig. tres bonne).*

Les Grecs l'appellent ΒΟΥΚΑΛΟΝ.

Les Espagnols, BUFANO. Klein. Gsf. Aldro.

Les Italiens, BUFALO. Raj. Gsf.

Les Allemands, BUFFEL. Gsf. Aldro.

Les Illyriens, BAUWOL. Gsf. Aldro.

Les Polonois, BAWOL. Rzac.

Les Anglois, BUGILL. Gsf. Aldro.

L

Il est plus grand que le *Bœuf domestique* ; il a le corps plus épais , & plus fort ; la peau très dure ; la tête petite , à proportion du corps. Il porte sur le front un bouquet de poils frisés. Tout son corps est couvert de poils noirs , ou noirâtres ; ses cornes sont noires , grosses , un peu aplaties , recourbées en enhaut , & un peu couchées sur le dos. On le trouve en *Italie* dans l'*Etat Ecclesiastique* , & dans le Royaume de *Naples*.

Bove domestico major est ; corpore crassiore & robustiore ; cute durissimâ ; capite parvo , respectu corporis ; fronte crispâ. Pilus totius corporis est niger , aut nigricans , sicut & cornua , quæ crassâ sunt , paululum compressa , sursùm reflexa , & parumper resupinata. Habitat in *Italia* in *Statu Ecclesiastico* , & Regno *Neapolitano*.

5. LE BISON BLANC.

Bos cornibus sursùm re... is , jubâ longissimâ... BISON ALBUS.

Bison albus Scoticus , vel Calydonius. *Gesn. Icon. Quadr. p. 122. Fig. p. 123.*

Aldro. Quadr. Bif. p. 357.

Bison Scoticus. *Jonst. Quadr. p. 37.*

Il ne differe du *Bœuf domestique* , que parce qu'il est tout blanc , & qu'il a le col garni de poils très longs. On le trouve en *Ecosse* , dans la partie de la forêt de *Callydoine* , appelée *Cummirland*.

A *Bove domestico* differt colore , qui per universum corpus albus est , & jubâ in collo longissimâ. Habitat in *Scotid* , in eâ parte *Calydonia* sylvæ , quæ *Cummirland* appellatur.

6. LE BISON.

Bos cornibus sursùm reflexis , dorso gibboso , jubâ , barbâque longissimis... BISON.

Bos jubâ longissimâ dorso gibbosq. Bison. *Linna. syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 3.*

Taurus Ferus. Klein. Quadr. p. 11.

Bison. *Raj. Syn. Quadr. p. 71. No. 3.*

Gesn. Quadr. p. 143.

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 31. (Fig. bona)

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 83

Aldro. Quadr. Bif. p. 353. Fig. p. 355. [Fig. bona].

Jonst. Quadr. p. 36. Fig. T. 17. sub illo nomine, Bison jubatus. [Fig. bona].

Charlet. Exer. p. 8.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 214.

Les Grecs l'appellent βίον.

Les Allemands, WISENT. Raj. Gefn. Aldro. Jonst.

Les Polonois, ZUBER. Gefn. Rzac.

Les Lithuaniens, SUBER. Gefn.

Bovem domesticum magnitudine circiter æquat : ab illo autem differt cornuum amplitudine, barbâ longissimâ, collo ad armos usque júbis horrido, & dorso in gibbum assurgente. Habitat in Germaniâ.

Il est à peu près de la grandeur du *Bœuf domestique* : il en diffère par la grandeur de ses cornes, par sa grande barbe, par les longs poils dont son col est couvert jusqu'aux épaules, & par la bosse qu'il a sur le dos. On le trouve en *Allemagne*.

7. LE BISON D'AMÉRIQUE.

Bos cornibus sursùm reflexis, dorso gibbofo, capite pilis longissimis obfito... BISON AMERICANUS.

Bos jubâ longissimâ, dorso gibbofo. Taurus Mexicanus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 3.

Bison Indicus. Klein. Quadr. p. 13.

Taurus Mexicanus. Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 587. (Fig. bona).

Taurus Quiviræ regionis. Fern. Hist. N. Hsp. p. 104.

Taurus Quiviræ Provincie. Jo. de Laet. p. 503.

Taurus Quivirensis. Euf. Nuremb. Fig. p. 181. (Fig. bona).

Bison Americain. Cat. App. Fig. p. 20. (Fig. tres bonne).

Buffle. Cat. Roc. des Bêtes. p. 27.

Bovis domestici altitudinem non attingit. Femora & crura habet brevia & crassa; caput amplum, sicut & pectus, corporis posteriore parte multò strictiore; caudam 1 pede longam, per totam longitudinem nudam, extremitate tantùm pilis longis obfitam;

Il est moins haut que le *Bœuf domestique*. Ses cuisses & ses jambes sont courtes & grosses; sa tête large, ainsi que sa poitrine; & la partie postérieure de son corps étroite : sa queue, qui a un pied de long, n'a de poils qu'une touffe de longs crins à son extrémité : ses cornes sont grosses à leur ra-

Lij

cine, recourbées en enhaut, & rentrantes en dedans. Il a sur le dos une bosse très grosse & très élevée. La couleur de son poil est un brun noirâtre : tout son corps est couvert, en hyver seulement, d'un poil long & rude, qui tombe en été, & laisse voir une peau noire & ridée : il n'y a que la tête qui demeure velue toute l'année. Le poil qui est sur le front du mâle, est long d'un pied, épais, & frisé. On le trouve en *Amérique*. Il se tient éloigné des endroits habités, & près des montagnes.

cornua in exortu crassa, sursum reflexa, introrsum recurva ; gibbum in dorso crassum & elatum. Pilorum color ex fusco nigrescit : per hiemem tantum corpus universum vestitur pilis longissimis, rigidis, quos æstate amittit, unde cutis nigra, rugosa, detecta remanet ; caput verò per totum annum pilis longis oblitum est. Frons maris pilis uno pede longis, densis, & crispis donatur. Habitat in *Americâ* longè à locis cultis, & propè montes.

8. LE BŒUF SAUVAGE.

Bos cornibus deorsum inflexis, jubâ suprà collum longissimâ. BONASUS.

Bos jubâ longissimâ, cornibus in se flexis. Bonafus. *Linn. syst. nat. ed. 6. 8. 34 sp. 2.*

Bonafus. *Raj. Syn. Quadr. p. 71. N°. 4.*

Gefn. Quadr. p. 145. (caput in ea Fig. sed cornua malè contorquentur).
Gefn. Icon. Quadr. p. 32. (ibi inest eadem capitis figura, ut suprà ; sed cranium & cornua benè figurantur).

Aldro Quadr. Bif. p. 358. Fig. p. 361. (eadem sunt figura ac in Gefn. Iconibus p. 32.)

Jonst. Quadr. p. 37. Fig. T. 18. (Fig. bona, si jubam haberet) ; & T. 19. (in T. 18 juba caret, quod malè ; in 19 verò cornua malè contorquentur).

Charlet. Exer. p. 8.

Les Grecs l'appellent Bionn.

Les Allemands, WILDE BUFFEL. Gefn.

Les Bohémiens, LONI. Gefn.

Les Péoniens, MONOPS. Gefn.

Il est de la grandeur du Bœuf domestique ; mais il est plus court, & plus large. La partie supérieure. *Bovis domestici magnitudi- ne est ; sed latior & brevior : Colli pars superior, à cervi-*

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 85.
 ce ad armos usque, jubata est, re de son col est garnie, depuis
 ut *Equi*. Capronæ ad oculos la tête jusqu'aux épaules, de poils
 usque propendent. Cornua très longs : ceux du devant de la
 pulchrè & splendide nigra tête lui descendent jusqu'aux
 sunt, & deorsum inflexa. yeux. Ses cornes, qui sont d'un
 Cauda brevis est. Color toto beau noir, sont recourbées en
 ferè corpore flavus. Habitat enbas. Sa queue est courte. Son
 in *Paoniâ*, monte *Messapo*. poil est jaune presque partout
 le corps. On le trouve en *Péonie*
 sur le mont *Messapus*.

SECTIO II.

*Ea quorum cornua sunt
ramosa.*

IN illâ Sectione unicum
est Genus, scilicet *Cervi-*
num.

XII.

Genus Cervinum.

Hujus character est
 Dentes incisores in maxillâ
 superiore nulli, in inferiore
 octo :
 Pes bifidus :
 Cornua ramosa.

Obs. In hoc Genere Ruminan-
 tium mares omnes cornua ratio-
 fa gerant; feminæ verò sunt acor-
 nes, si duas excipias, scilicet *Ran-*
giferam faminam, & *Cervam Groen-*
landicam.

SECTION II.

*Ceux dont les cornes sont
branchues.*

IL n'y a dans cette Section
qu'un seul Genre, qui est
celui des *Cerfs*.

XII.

Le Genre des Cerfs.

Son caractère est
 De n'avoir point de dents incisi-
 ves à la mâchoire supérieure ;
 d'en avoir huit à l'inférieure :
 D'avoir le pied fourchu :
 Des cornes branchues.

Obs. Dans ce Genre de Ruminants,
 tous les mâles ont des cornes bran-
 chues ; les femelles au contraire, si
 l'on en excepté celles du *Rhinoc* & du
Cerf de Groenland, n'ont point du
 tout de cornes.

Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis... CERVUS.

Cervus cornibus ramosis, teretibus, incurvis. Cervus. Linn. syst. nat. cl.

6. g. 31. sp. 3.

Faun. suec. Linn. No. 38.

Cervus nobilis. Klein. Quadr. p. 23.

Cervus. Raj. Syn. Quadr. p. 84. No. 1.

Aldro. Quadr. Bif. p. 769. Fig. p. 774. (Fig. bona).

Gefn. Quadr. Fig. p. 354. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. p. 43. Fig. p. 44. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 58. Fig. T. 32. & 35. (Fig. sat bonis).

Mus. Worm. p. 338.

Charlet. Exor. p. 11.

Rac. Hist. nat. Pol. p. 216.

Rac. Aud. p. 308.

Les François appellent le mâle CERF ; la femelle, BICHE ; & le jeune, FAON.

Les Latins le mâle, CERVUS ; la femelle, CERVA ; le jeune, HINNULUS.

Les Hébreux le mâle, AIAL ; la femelle, AIAL ; AIALA ; AIALET ; le jeune, OFER. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, AIELA. Gefn. Aldro.

Les Arabes, AIAL. Gefn. Aldro.

Les Grecs, ΕΛΑΦΗ.

Les Perses, GEVAZEN. Gefn. Aldro.

Les Espagnols le mâle, CERVO ; la femelle, CERVA. Gefn. Aldrov.

Les Italiens le mâle, CERVO ; la femelle, CERVA. Gefn. Aldrov.

Les Allemands le mâle, HIRTS, ou HIRS, ou HIRSCH ; la femelle, HINDE ; ou HINDIN ; le jeune, HINDE KALB. Gefn. Aldrov. Rac.

Les Illyriens, GELEN. Gefn.

Les Polonois le mâle, JELNENI ; la femelle, LANII. Gefn. Aldro. Jelen. Rac.

Les Suédois, HIORT ; KRONHIORT. Linn.

Les Anglois, REDDIER ; ils appellent le mâle STAGG, ou HART ; la femelle, HIND ; le jeune, CALF. Raj. Gefn.

Le Cerf est un animal si connu, qu'il n'est pas besoin d'en faire une ample description. Il a depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, environ $3\frac{1}{2}$ pieds ; & depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 6 pieds. Ses cornes ont environ $2\frac{1}{2}$ pieds

Cervus est animal ita notum, ut amplâ descriptione non indigeat. A parte superiore dorfi ad terram usque, $3\frac{1}{2}$ pedum altus est ; ab extremitate verò oris ad caudam, 6 pedes longus. Cornua ipsius $2\frac{1}{2}$ pedes circiter longa

LES QUADRUPEDES; Classe I. Ordre V. 87
 sunt, parumper ad latera incurvantur, suntque teretia & ramosa, & quisque ramus in acutum definit. Caput habet oblongum; oculos & aurículas lat magnas; collum longum & gracile; caudam brevem; crura maximè gracilia. Pilus ei mollis, in dorso ex ruffo flavescit; in ventre parumper candicat. Dorsi color in foeminis, praesertim in *Hinnulis*, plerumque maculis albis variegatur. Habitat in sylvis.

2. LE CERF D'ALLEMAGNE.

*Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis, collo infra juba-
 to...* CERVUS GERMANICUS.

Tragelaphus. Aldro. Quadr. Bif. p. 857. Fig. p. 858.

Jonst. Quadr. p. 63.

Charles. Exer. p. 12.

Tragelaphus, idest, Hirco-Cervus. Gessn. Quadr. Fig. p. 1107.

Tragelaphus quorundam. Gessn. Icon. Quadr. p. 46. Fig. p. 47.

Hippelaphus. Jonst. Quadr. Fig. T. 35.

Les Allemands l'appellent BRANDENTZ. Gessn. Charles

Præcedente majore est. Prætereà ab eo differt, quòd habeat collum pilis longis vestitum; & colore, qui in supràmà dorsi parte cinereus est, & in ventre nonnihil nigrescens. Habitat in *Misene* saltibus, *Boëmia* vicinis.

Il est plus grand que le précédent. Il en diffère en outre parce qu'il a le col garni de longs poils, & par sa couleur, qui est grise sur le dos, & un peu noire sous le ventre. On le trouve dans les forêts de *Misene*, proche la *Bohème*.

3. LE CERF DE CANADA.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad summum cute pilosâ tectis... CERVUS CANADENSIS.

Cervus Canadensis. Raj. Syn. Quadr. p. 84.

Klein. Quadr. p. 23.

Cerf de Canada. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 2. p. 67. Fig. Pl. 452 (Fig. bonne).

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, 4 pieds. Ses cornes sont longues de 3 pieds : elles sont rondes & branchues, & couvertes d'un bout à l'autre d'une peau fort dure & garnie d'un poil épais & court, de même couleur que celui du corps, qui est d'un fauve un peu obscur. Du reste il ressemble assez à notre Cerf. On le trouve dans le Canada.

A parte superiore dorſi ad terram uſque, 4 pedes altus eſt. Cornua 3 pedes longa, teretia ſunt, ramoſa, ab imo ad ſummum tecta cute undique obſita pilis brevibus & denſis, ejuſdem coloris ac pilis corporis, qui ſunt obſcure ſulvi. In reliquis Cervo noſtrati ſimilis eſt. Habitat in Cana-

4. LE CERF DE GROENLAND.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad summum cute pilosa tectis, naſo piloso... CERVUS GROENLANDICUS.

Caprea Goenlandica. Raj. Syn. Quadr. p. 90. No. 8.

Daim de Groenlande. Edwards. Part. 1. Fig. p. 51. (Fig. bonne).

Il eſt beaucoup plus épais que ne le ſont tous les Animaux de ce genre. Par la proportion de toutes ſes parties, il reſſemble plus à un Veau, qu'à un Cerf. Il a, depuis le haut des épaules juſqu'à terre, environ 3 pieds. Son col eſt beaucoup plus court, & ſes jambes plus groſſes qu'elles ne ſont ordinairement dans le genre des Cerfs : ſa queue eſt courte ;

Multò craſſior eſt quàm alia omnia hujus generis Quadripeda. Craſſitie ſuorum omnium partium, Vitulo magis ſimilis eſt, quàm Cervo. A parte ſuperiore humerum uſque ad terram, 3 circiter pedes altus eſt. Collum multò brevius, & crura craſſiora, quàm in Cervino genere eſſe ſolent, Cauda brevis ; oculi ſat

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 89

fat magni ; cornua $1 \frac{1}{2}$ pede circiter longa, teretia sunt, ramosa , & sicut in precedente, testa ab imo ad summum cute pilis fulvis undique obiecta ; & (quod ei maxime singulare) nasus pilis undique tectus est, in ea etiam parte, quæ in aliis hujus generis cute nudâ & humidâ regitur. In æstu pili ei breves sunt, molles & dilutè cinerei ; in hieme verò , inter hosprimos proveniunt alii pili longi & rigidi, ex fulvo, fusco, & albo variegati. Hujus speciei foemina cornigera est sicut & mas. Habitat in Groenlandid.

ses yeux assez grands : ses cornes sont longues d'environ $1 \frac{1}{2}$ pied ; elles sont rondes & branchues, & couvertes , comme dans le précédent, d'un bout à l'autre d'une peau garnie de poils fauves. Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est son nez qui est tout-à-fait garni de poils, même dans cette partie qui, dans les autres n'est qu'une peau nue, & humide. Il est couvert en été d'un poil doux & court, d'un joli petit gris ; & en hyver, il sort du fond de ce premier poil, d'autres poils longs & rudes , variés de fauve, de brun, & de blanc. La femelle de cette espèce a des cornes comme le mâle. On le trouve dans le Groenland.

* * 5. LE CHEVREUIL :

Cervus cornibus teretibus erectis... CAPREOLUS.

Cervus cornibus ramosis teretibus erectis. Capreolus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 6.

Faun. Suec. Linn. No. 41.

Cervus Minimus, Capreolus: Cervulus. Caprea. Klein. Quadr. p. 24.

Caprea Plinii, Capreolus vulgò. Raj. Syn. Quadr. p. 89. No. 6.

Caprea Plinii, sive Capreolus. Aldro. Quadr. Bif. p. 378.

Caprea, sive Capreolus, sive Dorcas. Gessn. Quadr. Fig. p. 324. & 1098.

(Fig. sat bonis).

Gessn. Icon. Quadr. p. 48. Fig. p. 49. (Fig. sat bona).

Caprea Plinii. Jonst. Quadr. p. 54. Fig. T. 33. sub isto nomine, Capreolus

Matin. (Fig. sat bona).

Capreolus ; Dorcas. Mus. Worm. p. 933.

Dorcas, Charlet. Exer. p. 12.

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 217.

Rac. Aut. p. 309.

Chevreuril. Kolbe, Tom. III. p. 34. Fig. p. 4. F. 30

Les Hébreux appellent le mâle ZEBI ; la femelle, ZEBIAM ; le jeune, OUBEN.
Gefn.

Les Chaldéens, THABIA. Gefn.

Les Arabes, THABIU. Gefn.

Les Grecs, *Aspidonotus*.

Les Perses, ANU. Gefn.

Les Espagnols, ZORLITO, ou CABRONZILLO-MONTES. Gefn. Aldro.

Les Italiens le mâle, CAPRIOLO, ou CAVRIOLO ; & la femelle, CAPRIOLA, ou CAVRIOLA. Gefn.

Les Allemands, REECH ; ils appellent le mâle REECHBOCK ; & la femelle, REECHGEISS. Gefn. Aldro. Rzac.

Les Illyriens, SARNA, ou SARNA. Gefn. Aldro.

Les Polonois, SARN ; SARNA ; KOZALISMA. Rzac.

Les Danois, RADDIUR. Worm.

Les Suédois, RËDIUR. Linn.

Les Anglois, ROE-DEER. Raj.

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, 2 pieds de haut ; & depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ $3\frac{1}{2}$ pieds ; ses cornes ont 8 pouces de long ; elles sont droites, rondes & branchues, & chaque petite branche se termine en pointe : ses oreilles sont longues de $4\frac{1}{2}$ pouces : sa queue est courte. La couleur de ses poils est variée de brun, de gris & de blanc sale. Le brun domine un peu sur le dos ; & le ventre est tout d'un blanc sale. On le trouve dans les forêts.

A parte superiore dorſi ad terram uſque, 2 pedum altus eſt ; ab extremitate oris ad caudam, $3\frac{1}{2}$ pedum circiter longus. Cornua, 8 pollices longa, erecta ſunt, teretia & ramoſa ; & unusquiſque ramus in acumen deſinit ; auriculæ $4\frac{1}{2}$ pollices longæ ; cauda brevis. Pilorum color ex fuſco, cinereo, & ſordidè candido variegatur. In dorſo magis fuſcus eſt : in ventre verò ſordidè albicat. Habitat in Sylvis.

Obſ. Les Chevreuils du Bréſil, décrits par Maregrave, *Hiſt. Br.* p. 235. & Pinſon, *Hiſt. Nat.* p. 97. ſous les noms de Cuguacu-Eté & Cuguacu-Apara, ne paroiffent être qu'une variété de cette eſpece, ainſi que les deux petits Cerfs cités par Barrère, *Hiſt. Fr. Eq.* p. 151. l'un ſous le nom de Biche des bois, & l'autre ſous celui de Biche des Paleuviers.

Obſ. Capreoli Braſiliiani à Marco grave, *Hiſt. Br.* p. 235. & Piſone, *Hiſt. Nat.* p. 97. deſcripti, ſub iſtis nominibus, Cuguacu-Ere, & Cuguacu-Apara, hujus ſpeciei variationes mihi videntur, ſicut & duo cervi à Barrère, *Hiſt. Fr. Eq.* p. 151. citati, unus ſub titulo, Cervus major corniculis breviffimis ; alter ſub iſto, Cervus minor paluſtibus corniculis breviffimis.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre V. 31

* 6. LE KARIBOU.

Cervus cornibus rectis, ad basim ramo unico antrorsum verso.

Cervus Burgundicus. Jonst. Quadr. Fig. T. 35. (Fig. sat bona).

Nulibi descriptionem ipsius inveni; caput tantummodo vidi; 14 circiter pollices longum est; auriculæ pollices. Cornua recta 10 pollices longa, ad basim ramo unico 2 ½ pollices longo, antrorsum verso donantur. Pili breves, ex fulvo fuscis, caput obtungunt. Habitat in Canada.

Je ne l'ai trouvé décrit nulle part. Je n'en ai jamais vu que la tête, qui a environ 14 pouces de long; les oreilles 4 pouces. Les cornes sont droites, & longues de 10 pouces; elles ont à leur base une petite branche longue de 2 ½ pouces, tournée vers le devant. La tête est couverte d'un poil court, d'un fauve rembruni. On le trouve en Canada.

* 7. LE DAIM.

Cervus cornuum unica & altiore summitate palmata... DAMA VULGARIS.

Cervus cornibus ramosis, compressis, summitatibus palmatis. Dama. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 5.

Faun. Suec. Linn. No. 40.

Cervus Platyceros, vel Platyceros simpliciter dictus; Dama vulg. Raf.

Syn. Quadr. p. 85. No. 2.

Sloane. Vol. II. p. 328.

Cervus palmatus, Dama; Dama-Cervus. Klein. Quadr. p. 25.

Dama. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 217.

Dama vulgaris. Aldro. Quadr. Bij. Fig. p. 741. (Fig. mala).

Jonst. Quadr. p. 55. Fig. T. 31. sub isto nomine, Dama-Cervus. (Fig. sat bona).

Dama recentiorum. Rzac. anth. p. 308.

Dama vulgaris, sive recentiorum. Gsf. Quadr. p. 335. Fig. p. 1100. (Fig. bona).

Platyceros. Gsf. Icon. Quadr. p. 50. Fig. p. 51. (Fig. bona).

Daim. Kolbe Tom. III. p. 39.

Les Espagnols l'appellent GAMO, ou CORZA. Aldrov. Gsf.

Les Italiens, DAIMO, ou DANIO. Gsf. Aldro. Rzac.

Les Allemands, DAMHIRSCH. Raf. Jonst. Rzac. DAM, ou DÄMLIN, ou DAMHIRTS. Gsf. Aldro.

LE REGNE ANIMAL.

Les Polonois, LANII. Gsf. Aldro. DANIEL. Rzac.

Les Suldois, DOF; DOFHORT. Linn.

Les Anglois, FALLOW-DÉER. Ils appellent le mâle BUCK; la femelle, DOE; le jeune, FAWN Raj.

Il est beaucoup plus petit que notre *Cerv* : il en diffère encore par ses cornes, dont la plus haute branche est en palme, & par sa couleur, qui est d'un gris jaunâtre sur le dos, & blanche sous le ventre; & quelquefois cette couleur grise, sur tout dans les jeunes, est variée de taches blanches.

Obs. Cette espèce varie beaucoup. Les *Daims de Virginie* sont plus grands & plus forts que les nôtres. Ceux d'*Espagne* sont de la grandeur des *Cervs*, mais ils sont d'une couleur plus foncée. Il y en a d'autres qui sont variés de différentes couleurs.

Multi minor est *Cervo* nostrate, à quo etiam differt cornibus, quorum ramus excelsior palmaris est, & colore ex cinereo flavicante in dorso, in ventre albo : qui color cinereus interdum, præsertim in junioribus, maculis albis variegatur.

Obs. Hujus speciei multæ sunt varietates. *Virginiana Dama* majores sunt & validiores nostratibus. *Hispanica Cervorum* magnitudinem adæquant, & coloris sunt obscurioris. Dantur alii variis coloribus variæ.

* 8. LE R H E N N E.

Cervus cornuum summitatibus omnibus palmatis... RANGIFER.

Cervus cornibus ramosis, æretibus, summitatibus palmatis. Rangifer. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 4.

Faun. Suec. Linn. No. 39.

Cervus Rangifer. Raj. Syn. Quadr. p. 88. N°. 4.

Klein. Quadr. p. 23.

Cervus palmatus. Jonst. Quadr. Fig. T. 37. (Fig. sat bona).

Aldro. Quadr. Bif. Fig. p. 857. (Fig. sat bona).

Cervus mirabilis. Jonst. Quadr. Fig. T. 36. (Fig. sat bona).

Rangifer. Aldrov. Quadr. Bif. Fig. p. 363. (Fig. pessima).

Gsf. Quadr. Fig. p. 956. (Fig. pessima).

Jonst. Quadr. p. 64. Fig. T. 37. (Fig. pessima).

Mus. Worm. p. 337.

Charlet. Exer. p. 12.

Tarandus. Aldro. Quadr. Bif. p. 859. Fig. p. 861. (Fig. sat bona).

Gsf. Icon. Quadr. p. 57. Fig. p. 58. (Fig. sat bona). & p. 59. (Fig. pessima).

Charlet. Exer. p. 12.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 93

Tarandus Agricola, & Eliotæ. *Raj.*

Machlis Plinio. *Raj.*

Les Grecs l'appellent *ἰστίλαφν.*

Les Allemands, REIN, ou REEN, ou REYNER, ou RAINGER, ou REINS-STHIER. *Gefn.*

Les Polonois, RENSCHERON. *Gefn.*

Les Suédois, RHEM. *Linn.*

Les Norvégeois, REINEN, ou REINSDIUR. *Worm.*

Les Lapons, REEN. *Gefn.*

Les Anglois, RAIN-DEER. *Raj.*

Ad magnitudinem & figuram Cervi quàm proximè accedit: membra tamen ipsius graciliora sunt. Cornua magna, ramosa, juxta caput tectia, omnibus extremitatibus palmatis, mucronibus in extremo palmarum exstantibus. Pilorum color griseus, qui tamen secundum anni tempus mutat. Hujus speciei fœminæ cornigeræ sunt, sicut & mares; sed cornibus minoribus. Habitat in Septentrionalibus regionibus.

Il est à peu près de la grandeur & de la figure d'un Cerf: mais tous ses membres sont plus déliés. Ses cornes sont grandes, branchues, rondes proche de la tête, & toutes leurs extrémités sont en palmes terminées par des pointes. La couleur de son poil est grise; elle change cependant selon les saisons. Les femelles de cette espece ont des cornes, mais plus petites que celles des mâles. On le trouve dans tous les pays du Nord.

** 9. L'ÉLAN.

Cervus cornibus ab imo ad summum palmatis... ALCES.

Cervus cornibus acaulibus palmatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 2.*

Faun. Succ. Linn. N. 37.

Cervus palmatus. Alce; vera & legitima. Magnum animal vulgò. *Klein. Quadr. p. 24.*

Alce. *Raj. Syn. Quadr. p. 86. No. 3.*

Aldro. Quadr. Bif. p. 866. Fig. p. 869. & 870. (Fig. pessime).

Gefn. Quadr. Fig. p. 1. (Fig. sat bona).

Gefn. Icon. Quadr. p. 52. Fig. p. 53. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 65. Fig. T. 30. & 31. (Fig. sat bona); in eo tamén peccant figura Gefneri & Jonstoni, quod pilis supra collum longissimis, & caruncula sub mento donentur.

Mus. Worm. p. 336.

Alces, *Charlet. Exer. p. 12.*

M iiij

Alce, sive Alces. *Rzac. auct. p. 304.*

Alce, seu Alces. *Equicervus. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 212.*

Elant. *Hist. de l' Acad. T. III. Part. I. p. 179. Fig. Pl. 25. (Fig. tres bonne).*

Les Grecs l'appellent *ΑΛΚΗ.*

Les Italiens, GRANBESTIA. Rzac.

Les Allemands, ELK, ou ELLEND. Raj. Gsf. Worm. Charlet. Aldrov. Rzac.

Les Illyriens, LOS, ou GELM. Gsf. Aldro.

Les Polonois, LOS. Gsf. Aldro. Rzac.

Les Moscovites, LOS. Gsf. LOZZOS. Aldro.

Les Suédois, ÄLG. Linn.

Les Danois, ELSDIUR. Worm.

Les Anglois, ELK. Raj. Charlet.

Les Septentrionaux, ANIMAL MAGNUM. Hist. de l' Acad.

Les Canadiens, ORIGNAL.

Il est à peu près de la grandeur d'un Cheval. Il a la tête longue; le col court; les lèvres, & surtout la supérieure, grandes & épaisses; l'ouverture de la bouche grande; les oreilles longues & semblables à celles d'un Ane; la queue très courte; le derrière un peu plus élevé que les épaules; les poils très gros, & longs de 3 pouces. La couleur de tout son corps est grise. Ses cornes sont en palme du haut au bas, & garnies de pointes à leur côté extérieur. On le trouve dans la Lithuanie, la Scandinavie, la Moscovie & le Canada.

Equi magnitudinem ferè attingit. Caput habet longum; collum breve; labia, praesertim superius, magna & crassa; oris rictum magnum; auriculas longas Asininis similes; caudam brevissimam; clunes humeris parumper atiores; pilos crassos, 3 pollices longos, cinereos. Cornua ab imo ad summum palmata sunt, mucronibus aliquot in ambitu exteriori extantibus. Habitat in Lithuanid, Scandinavid, Moscovid, & Canad.

SECTION III.

Ceux qui n'ont point de cornes.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul genre, qui est celui des QUADRUPÈDES ruminants à pied fourchu, auxquels j'ai donné le nom de *Chevrotains*.

SÉCTIO III.

Ea que sunt acornia.

IN illa Sectione unicum est genus, scilicet QUADRUPEDUM ruminantium pede bisulco, quibus *Traguli* nomen imposui.

XIII.

XIII.

Genus Traguli.

Le Genre du Chevreton.

Hujus character est	Son caractère est
Dentes incisores in maxilla superiore nulli, in inferiore octo:	De n'avoir point de dents incisives à la mâchoire supérieure, d'en avoir huit à l'inférieure:
Pes bifidus:	D'avoir le pied fourchu:
Cornua nulla.	Point de cornes.

** 1. LE CHEVROTAIN DES INDES.

Tragulus pilis brevibus supra fulvis, infra albicantibus... *TRAGULUS INDICUS.*

Capra pedibus digito humano angustioribus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 4.

Tragulus; Cervula parvula Africana ex Guineâ acornis. Klein. Quadr. p. 22.

Tragulus, sive Hinnulus, aut Cervus juvenus pergracilis Africanus, cujus pedes antè circumcluduntur. Klein. Quadr. p. 22.

Cerva parvula Africana ex Guineâ, rubida, sine cornibus. Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. Fig. 1. (Fig. bona).

Hinnulus, seu Cervus juvenus, pergracilis, Africanus. Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. F. 2. (Fig. bona).

Cervus juvenus, perpusillus Guineensis. Seb. Vol. I. p. 70. Fig. T. 43. F. 3. (Fig. bona).

Chevre de Congo. Kolbe. Tom. III. p. 39.

A parte superiore dorsi ad terram usque, 7 pollicum altus est; à vertice ad caudam, 1 circiter pede longus. Caput 3 pollices longum; auriculæ 1 circiter pollice; cauda brevis, pilis longis dispersisque, ex ruffo & albo variegatis, vestita. Diameter crurum in parte strictiore 2 tantum linearum est. Pilus ei brevis & fulvus in parte superiore capitis,

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, 7 pouces de haut; depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, environ 1 pied. Sa tête a 3 pouces de long; ses oreilles environ 1 pouce. Sa queue est courte, & garnie de poils longs & clair-semés, variés de roux & de blanc. Ses jambes dans l'endroit le plus menu, n'ont que 2 lignes de diamètre. Son

poil est court & fauve, mêlé d'un peu de brun dans la partie supérieure de la tête, du col & du dos. La gorge, le ventre, & l'intérieur des cuisses sont blancs. Il a en tout 26 dents; savoir, à la mâchoire inférieure 8 dents incisives, dont les 2 du milieu sont en forme de spatule, & les autres sont étroites dans toute leur longueur; & 8 molaires, 4 de chaque côté : & à la mâchoire supérieure pareil nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côté. On le trouve en Guinée, & dans l'Inde.

colli & dorfi, ex fusco admixtus. Guttur, venter, & femorum pars interior albescent. Dentes habet 26, scilicet in maxilla inferiore 8 incisores, quorum duo intermedii spatiformes sunt, ceteri verò per totam longitudinem strictiores; & 8 molares, 4 utrinque : in superiore verò maxilla molarium parem numerum, & insuper caninos 2, utrinque unum. Habitat in Guinæa & Indiâ.

2. LE CHEVROTAIN DE GUINÉE.

Tragulus pilis longissimis obscure fulvis... TRAGULUS GUINEENSIS.

Tragulus Guineensis pilo rubro longiore. Klein. Quadr. p. 22.
Cervus Africanus pilo rubro. Seb. Vol. I. p. 73. Fig. T. 45. F. 1. (Fig. bona).

Il est de la grandeur du précédent; il en diffère par ses jambes, qui sont plus longues; & par son poil, qui est plus long, & d'une couleur fauve beaucoup plus foncée. On le trouve vers les confins de la Guinée.

Præcedentis magnitudinem æquat : ab eo tamen differt cruribus longioribus; & pilo longiori, coloris fulvi longè obscurioris. Habitat in oris Guinæa.

3. LE CHEVROTAIN DE SURINAM.

Tragulus ex ruffo luteus, maculis albis variegatus... TRAGULUS SURINAMENSIS.

Tragulus Surinamensis sabruba : Cervula albis maculis notata. Klein. Quadr. p. 22.

Cervula

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre V. 27

Cervula Surinamensis subrubra, albis maculis notata. Seb. vol. I. p. 71. Fig. T. 44. F. 1. (Fig. bona).

Præcedentes magnitudine circiter æquat. Auriculæ magnæ sunt & longæ; cauda brevis & obtusa. Pilus ex rufo luteus, in dorso & parte colli superiore maculis albis variatur. Habitat in *Surinamensi Insula*.

Il est à peu près de la grandeur des précédens. Ses oreilles sont grandes; sa queue courte & obtuse. Son poil est d'un roux jaunâtre, tacheté de blanc sur le dos & la partie supérieure du col. On le trouve à *Surinam*.

4. LE CHEVROTAIN D'AFRIQUE.

Tragulus in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens.;

TRAGULUS AFRICANUS.

Capra capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 10.

Capra Sylvestris Africana Grimmii. Raj. Syn. Quadr. p. 80. No. 7.

Tragus, Capra Sylvestris Africana Grimmii. Klein. Quadr. p. 19.

Colore est obscurè cinereo. In medio capite fasciculum pilosum erectum gerit. In utroque latere, nasum inter & oculos, duas cavitates exhibet, quæ pinguem & oleosum flavum liquorem continent, qui in nigram materiam coagulatur, odoreque inter castoreum & moschum mediopollent. Habitat in *Africa*.

La couleur de son poil est un gris foncé. Il porte au milieu du front un bouquet de poils élevé. Entre le nez & les yeux, il a de chaque côté une cavité, qui contient une liqueur jaune, grasse & huileuse, qui devient noire en se coagulant, & qui a à peu près l'odeur du musc. On le trouve en *Afrique*.

5. LE MUSC.

Tragulus ad umbilicum folliculum moschiferum gerens.;

MOSCHUS.

Animal Moschiferum. Raj. Syn. Quadr. p. 127.

Elf. Nieremb. p. 184.

Tragus Moschiferus, Moschus. Klein. Quadr. p. 18.

Moschus. Linn. syst. Nat. ed. 6. g. 30. sp. 1.

N

Moschi Capreolus. *Gefn. Quadr. p. 786.*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 52. (Fig. sat bona).

Capra Moschi. *Aldro. Quadr. Bif. p. 743. Fig. p. 744 (Fig. sat bona)*

Jonst. Quadr. p. 55. Fig. T. 29. sub illo nomine, Capreolus Moschi. (Fig. sat bona).

Charlet. Exer. p. 10.

Cervus odoratus aliis. *Charlet.*

Hiam, Animal Musci. *Flor. Sin. Fig. p. Z. (Fig. sat bona).*

Les Chinois l'appellent HIAM. *Boym.*

Les Italiens, CAPRIOLO DEL MUSCO. *Gefn.*

Les Allamands, BISMUTHIER, ou BISEMARCH. *Gefn.*

Il a, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, 3 pieds de long. La tête a plus d'un demi-pied; le front 3 pouces de large; les oreilles, qui ressemblent à celles de nos *Lapins*, sont longues de 4 pouces; les jambes de devant de 14 pouces; la queue de 2 pouces au plus. Le museau est pointu. Toute la partie supérieure du corps est couverte de poils variés, depuis leur origine jusqu'à leur extrémité, de jaune, de maron, & de blanc. La tête & les jambes sont brunes; le ventre & le dessous de la queue blancs. Après du nombril est une espèce de petite bourse, qui contient le musc, qui a 3 pouces de long, & 2 pouces de large; & s'élève au-dessus du ventre d'environ 1 pouce. Elle est garnie de poils extérieurement, & intérieurement d'une pellicule, qui renferme le musc, & qui est garnie de glandes, qui, selon les apparences, servent à en faire la sécrétion. Il a en tout 26 dents; savoir, à la mâchoi-

A vertice ad caudam, 3 pedes longus est. Caput semi pedem longitudine superat. Frons 3 pollicum latus. Auriculae Cuniculorum nostratum similes, 4 pollices longae, & erectae. Crura anteriora 14 pollices longa. Cauda 2 pollices non excedit. Os valde acutum. Corporis pars superior undique testae est pilis è luteis, castaneis, & albis portiunculis alternis, à radice ad apicem usque, variis. Pili in capite & cruribus fusci, seu brunnei, in ventre verò & sub caudâ albi sunt. Ad umbilicum folliculus est moscho continendo inferiens, 3 pollices longus, 2 latus, à ventre ad unius circiter pollicis spatium protuberans. Extus pilosus est; in interiore verò superficie speciem habet pelliculam moschum cingentem, in qua plures glandulae, ad moschi procul dubio secretionem infervientes, reperiuntur. Den-

LES QUADRUPEDES; *Classe I. Ordre V.* 99

tes habet 26; scilicet in maxilla inferiore incisores octo, & molares totidem, 4 utrinque; in superiore verò molarium parem numerum, & insuper caninos duos, unum utrinque. Habitat in *Sigenfi* regione.

re inférieure 8 dents incisives, & 8 molaires, 4 de chaque côté; & à la mâchoire supérieure même nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côté. On le trouve à la *Chine*.





ORDRE VI.

ORDO VI.

LES QUADRUPÈDES.

QUADRUPEDA

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & la corne du pied d'une seule pièce.

Dentibus incisivis in utraque maxilla & pede solidungulo donata.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul Genre, qui est celui du Cheval..

GENUS *Equinum* unicum: est ad hunc Ordinem: constituendum..

XIV.

XIV.

Le Genre du Cheval..

Genus *Equinum*..

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire :
La corne du pied d'une seule pièce.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque maxilla sex:
Pes solidungulus..

** I. LE CHEVAL.

Equus auriculis brevibus erectis, juba longa... EQUUS.

Equus caudâ undique setosa. Equus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 27. sp. 1; Faun. Suec. Linn. No. 34.

Equus domesticus, cinctatus. Klein. Quadr. p. 4.

Equus. Raj. Syn. Quadr. p. 62. No. 1.

Aldro. Quadr. Solid. p. 12. Fig. p. 21. (Fig. bona).

Gesn. Quadr. p. 442. Fig. p. 443. (Fig. bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 19. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 1. Fig. T. 1, 2, 3 & 4. (Fig. bonis).

Charlet. Exer. p. 3.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 240.

Rzac. Aud. p. 332.

Sloane. Vol. II. p. 327.

Cheval. Hist. Nat. gen. & part. ed. in-4o. Tom. IV. p. 258. Fig. Pl. 1; &

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre VI. 101

ed. in-12. Tom. VII. p. 372. Fig. Pl. I. [Fig. tres bonnes].
 Les François appellent le mâle CHEVAL & lorsqu'il est coupé, CHEVAL ON-
 GRE; la femelle, JUMENT; le jeune, POULAIN.
 Les Hébreux, le mâle, SUS; la femelle, SUSAH. Aldro. Gefs.
 Les Chaldéens, SUSUATHA. Aldro. Gefs.
 Les Grecs, ἵππος.
 Les Arabes, BAMEL. Gefs.
 Les Perses, ASBECHA. Gefs.
 Les Espagnols, & les Italiens, CAVALLLO. Aldro. Gefs.
 Les Allemands, ROSS. Aldro. Gefs.
 Les Bohémiens, KUN. Aldro. Gefs.
 Les Illyriens, KOBILA. Aldro.
 Les Polonois, KON. Aldro. Gefs. Rzac.
 Les Suédois, HÄST. Linn.
 Les Flamands le mâle, PEERT, ou HAINST; lorsqu'il est coupé, RUYN; la
 femelle, MERRI. Aldro.
 Les Anglois, HORSE. Aldro. Gefs.

Equus est animal ita no- Le Cheval est un animal si-
 tum, ut descriptione non connu, qu'il n'a pas besoin de
 digeat. Amplissimè describi- description. On le trouvera am-
 tur in Libro cui titulus, His- plement décrit dans l'Histoire
 toire Naturelle, Générale & Naturelle, Générale & Particu-
 Particuliere, avec la Descrip- lière, avec la Description du Ca-
 tion du Cabinet du Roi, &c. Ed. binet du Roi, &c. Ed. in-4°. in-4°. Vol. IV. p. 258. & seq. Tom. IV. p. 258 & suiv. & Ed. in-12. Vol. VII. p. 372 in-12. Tom. VII. p. 372 & suiv.
 & seq. Habitat ubique terra- On le trouve partout.
 rum.

* * 2. LE ZÉBRE, OU L'ANE RAYÉ.

Equus auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis transversis
 versicolor... ZÉBRA.

Equus lineis transversis versicolor. Zebra. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 27.
 sp. 3.

Equus ferus genere suo. Zebra. Klein. Quadr. p. 5. B.

Zebra. Raj. Syn. Quadr. p. 64. N°. 4.

Euf. Nuremb. p. 168.

Zebra Indica. Aldro. Quadr. Solid. p. 416. Fig. p. 417. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 17. Fig. T. 5. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 4.

Ane Sauvage. Kolbe. Tom. III. Fig. p. 22. [Fig. bonne].

Les Portugais l'appellent BURRO DO MATTO. Klein.

Il est à peu près de la grandeur d'un petit Cheval. Ses oreilles sont un peu plus longues que celles du Cheval ; sa crinière est courte. Tout son corps est rayé de rayes transversales, alternativement noires & jaunes dans le mâle, & alternativement noires & blanches dans la femelle. On le trouve en Afrique, & sur tout au Cap de Bonne Espérance.

Equum mediocrem magnitudine circiter adæquat. Auriculas habet auriculis Equinis paulò longiores; jubam multò brevior. Per totum corpus lineis transversis, alternatim nigris & flavis in mare, & alternatim nigris & albicantibus in fœminâ, variegatur. Habitat in Africa, & præsertim in Cap. B. Sp.

* * 3. L' A N E.

Equus auriculis longis, flaccidis, jubâ brevi... ASINUS.

Equus caudâ extremo striatâ. Asinus. Linn. Syst. nat. ed. 6. p. 27. Sp. 2.

Faun. Suec. Linn. N°. 35.

Asinus. Raj. Syn. Quadr. p. 63. N. 2.

Klein. Quadr. p. 6. A.

Aldro. Quadr. Solid. p. 295.

Gesn. Quadr. p. 3. Fig. p. 4. (Fig. bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 20. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 12. Fig. T. 6. [Fig. bona].

Sloane. Vol. II. p. 327.

Asinus domesticus. Charlei. Exer. p. 4.

Ano. Hist. Nat. gen. & part. ed. in-4°. Tom. IV. p. 404. Fig. Pl. XL. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 40. Fig. Pl. I. [Fig. tres bonnes].

Les Hébreux l'appellent CHAMOR. Aldro. Gesn.

Les Grecs, ὄν.

Les Perses, CARR. Aldro. Gesn.

Les Espagnols, ASINO. Aldro. Gesn.

Les Italiens, LASINO. Gesn.

Les Allemands, ESSEL. Aldro. Gesn.

Les Illyriens, OVEL. Aldro. Gesn.

Les Suédois, ÖSNA. Linn.

Les Anglois, ASSE. Aldrov. Gesn.

Il est plus petit qu'un Cheval d'une taille ordinaire; il a les oreilles beaucoup plus longues, plus larges, & ordinairement pendantes : sa crinière est très

Minor est Equo magnitudinis vulgaris; auriculas habet multò longiores, latiores, & flaccidas; jubam brevem; caudam caudâ Equinâ longior.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre VI. 103

rem, in extremitate tantum fetosam. Asini color vulgaris ex cinereo griseus est. Dantur etiam albi, rufi, fufci & nigri. Per dorsi longitudinem extenditur linea nigra, alterâ lineâ transversâ etiam nigrâ per scapulas ductâ. Hæ 2 lineæ simul crucem efformant. Habitat ubique, exceptis locis frigidissimis. Amplissimè describitur in Libro cui titulus, *Histoire Naturelle, Générale & Particulière, &c.* Ed. in-4o. Vol. IV. p. 404 & seq. & Ed. in-12. Vol. VIII. p. 40 & seq.

courte : la queue est plus longue que celle du Cheval, & n'est garnie de crins qu'à son extrémité. Sa couleur la plus ordinaire est un gris cendré : il y en a de roux, de bruns, de blancs, & de noirs. Il a une raye ordinairement noire, qui s'étend sur toute la longueur du dos, & qui est coupée transversalement par une seconde, qui descend sur les deux épaules. Ces 2 rayes ensemble forment une croix. On le trouve par tout, excepté dans les Pays froids. On le trouvera amplement décrit dans l'*Histoire Naturelle, Générale & Particulière, &c.* Ed. in-4o. T. IV. p. 404 & suiv. & Ed. in-12. Tom. VIII. p. 40 & suiv.

* * 4. LE MULET.

Equus auriculis longis, erectis, jubâ brevissimâ. MULUS.

Equus caudâ extremo fetosâ. Mulus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 27. sp. 1, 2.

Faun. Suec. Linn. N^o. 35. a.

Asinus biformis hybridus. Mulus. Klein. Quadr. p. 6. B.

Mulus. Raj. Syn. Quadr. p. 64.

Aldro. Quadr. Solid. p. 358.

Gesn. Quadr. p. 794. Fig. p. 793. (Fig. bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 21. [Fig. bona].

Jonst. Quadr. p. 15. Fig. T. 6. (Fig. sat bona).

Charlet. Exer. p. 4.

Sloane. Vol. II. p. 327.

Les François appellent le mâle MULET ; la femelle, MULE.

Les Hébreux le mâle, PERED ; la femelle, PIRDAH. Gesn. Aldrov.

Les Chaldéens, CUBANA. Gesn. Aldro.

Les Grecs, ΜΥΛΟΣ.

Les Arabes, BEAL. Gesn. Aldro.

Les Espagnols, & les Italiens le mâle, MULO ; la femelle, MULA. Gesn.

Les Allemands, MULTHIER, ou MULESEL. Gesn.

Les Illyriens, MEZECK. *Gefn.* Aldro.

Les Suédois, MULRSNA. *Linn.*

Les Anglois, MULE. *Gefn.*

Le Mulet n'est pas une espèce certaine & constante qui puisse se reproduire, mais plutôt une bêtise, qui provient d'un *Ane* & d'une *Jument*. Il ressemble beaucoup au père par la forme du corps, la longueur des oreilles, & la brièveté de la crinière; mais il ressemble plus à la mère par la grandeur. Comme l'*Ane*, il a la queue longue, & qui n'a des crins qu'à son extrémité. Sa couleur la plus ordinaire est noire, ou d'un brun noir: il a, comme l'*Ane*, sur le dos une croix d'une couleur plus foncée.

Mulus non est certa & constans animalis species; sed hybrida, & spuria ab *Asino Equam* ineunte genita, quæ sibi similem procreare nequit. Quoad formam corporis exteriorem, auricularum longitudinem, jubæ brevitatem patri, quoad magnitudinem matri similis est. Sicut *Asinus* caudam habet longam, in extremitate tantum setosam. Color ipsius vulgaris est niger, vel ex fusco nigrescens. Crucem saturationis coloris, sicut *Asinus*, in dorso gerit.

5. L'ANE SAUVAGE.

Equus auriculis longis, jubâ brevi, pelle tuberculis parvis scabra... ONAGER.

Equus caudâ extremo setosâ. Onager. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 27. sp. 2. a.*

Asinus sylvestris; Asiniferus; Onager. Klein. *Quadr. p. 7. C.*

Onagrus, sive Asinus sylvestris. Gefn. *Quadr. p. 19.*

Onager. Raj. Syn. Quadr. p. 63. No. 3.

Aldro. Quadr. Solid. p. 352.

Jonst. Quadr. p. 14. Fig. T. 12. [Fig. cornuta, quod male.]

Charlet. Exer. p. 4.

Les Grecs l'appellent ὄννη.

Les Allemands, WALDEEL. *Gefn.*

Les Anglois, WILD ASS. *Raj.*

Il ressemble beaucoup à l'*Ane domestique*; il n'en diffère que par les petits tubercules dont sa peau est couverte. C'est avec cette peau que l'on fait ce que nous appelons en François le *Chagrin*.

Asino domestico perquam similis est; in eo tantum ab illo differt, quod pellis ejus tuberculis parvis seu scabra, quâ pelle efficitur quod Gallicè *Chagrin* vocatur.

ORDO VII.



ORDO VII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisiforibus in utrâque maxillâ, & pede bifulco donata.

IN hoc Ordine unicum continetur Genus, scilicet *Suillum* : in quo Genere dentium incisiforum numerus sæpissimè variat. Hujus enim Generis QUADRUPEDA dentibus incisiforibus, maxillæ superiori, modò 4, modò 5, modò 6; maxillæ verò inferiori modò 4, modò 6, modò 8 donantur. Quæ varietas in numero dentium in errorem inducere nequit, quoniam Genus istud unicum est quod *dentibus incisiforibus* in utrâque maxillâ, & simul *pede bifulco* donetur.

X V.

Genus Suillum.

Hujus character est
Dentes incisifores in utrâque
maxillâ:
Pes bifulcus;

ORDRE VII.

LES QUADRUPES

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & le pied fourchu.

LE Genre des *Cochons* est le seul qui compose cet Ordre. Il est aussi le seul dont le nombre des dents incisives varie. Les QUADRUPES de ce genre ont à la mâchoire supérieure tantôt 4, tantôt 5, tantôt 6 dents incisives; & à la mâchoire inférieure, tantôt 4, tantôt 6, & tantôt 8. Cette variété ne peut point induire en erreur, parce que ce genre est le seul qui ait des *dents incisives* aux deux mâchoires, & en même tems le *pied fourchu*.

X V.

Le Genre du Cochon.

Son caractère est
D'avoir des dents incisives aux
deux mâchoires:
Le pied fourchu.

Obf. 10. Lorsque le nombre des dents incisives est égal dans les deux mâchoires, il est de 4 ou de 6 en chacune.

Obf. 20. Lorsqu'il est inégal, le plus grand nombre est toujours à la mâchoire inférieure.

Obf. 30. Le plus grand nombre de dents incisives n'excède jamais l'autre que de 2 au plus, savoir une de chaque côté.

Obf. 40. Cette variété n'est point propre à faire distinguer les unes des autres les différentes espèces de ce Genre; puisque dans les individus de la même espèce le nombre des dents incisives varie. J'avois cru d'abord qu'elle pourroit indiquer au moins le sexe; mais il n'en est rien; car j'ai observé plusieurs *Cochons domestiques* mâles & femelles, & j'ai trouvé dans les deux sexes indifféremment toutes ces variétés.

Obf. 50. Les dents incisives de la mâchoire supérieure sont convergentes; & celles de la mâchoire inférieure, au moins les intermédiaires, sont couchées obliquement, & avancent en avant.

Obf. 60. Tous les *QUADRUPÈDES* de ce Genre ont le museau allongé, & terminé par un plan arrondi, dans lequel sont les narines.

Obf. 10. Si dentium incisorum numerus sit æqualis in duobus maxillis, sunt vel 6 dentes in utraque.

Obf. 20. Si verò sit inæqualis, maxilla inferior semper majore numero donatur.

Obf. 30. Major ille numerus dentium incisorum minorem duobus dentibus tantum excedit, utrinque uno.

Obf. 40. Varius ille dentium incisorum numerus ad distinguendas inter se hujus generis species varias inservire nequit: in diversis enim ejusdem speciei individuis variat ille numerus. Ad sexus etiam distinctionem nequaquam aptus est; plures enim *Porcos domesticos* mares & feminas observavi, in quibus in utroque sexu indifferenter omnes illas varietates reperi.

Obf. 50. Dentes incisores in maxilla superiore sunt convergentes; in inferiore verò, saltem intermedii, obliquè inclinati & prominentes.

Obf. 60. Omnia hujus Generis *QUADRUPÈDA* rostrum habent oblongum, in planum rotundum terminatum, in quo sunt nares.

** I. LE COCHON DOMESTIQUE.

Sus caudatus, auriculis oblongis, acutis, caudâ pilosâ... Sus DOMESTICUS.

Sus dorso antice setosâ, caudâ pilosâ. Sus, seu. Porcus domesticus. Linn.
sys. nat. ed. 6. g. 28. sp. 1. a.

Fhun. Succ. Linn. N°. 36.

Sus seu Porcus domesticus. Raj. syn. Quadr. p. 91, N°. 12.

Sloane. Vol. II. p. 328.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre VII. 107

[Porcus: Sus: Scropha: Verres. Klein: Quadr. p. 23.

Sus. Gêsn. Quadr. p. 982. Fig. p. 983. [Fig. bonis].

Aldro. Quadr. Bif. p. 937. Fig. p. 1006. [Fig. bona].

Sus, vel Scropha: Verres. Gêsn. Icon. Quadr. Fig. p. 24. [Fig. bonis].

Sus, Porcus, Scropha, Verres, & Majalis. Jonst. Quadr. p. 70. Fig. T. 47.

(Fig. bonis).

Charles. Exer. p. 13.

[Porcus. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 243.

Rzac. Auth. p. 333.

Les François l'appellent PORC. Ils appellent le mâle VERRAT; lorsqu'il est châtré, COCHON; & la femelle, TRUVE.

Les Latins, SUS. Ils appellent le mâle VERRIS; lorsqu'il est châtré, MAMALIS; la femelle, SCROPHA; le jeune, PORCELLUS.

Les Hébreux, CHASIR. Gêsn.

Les Chaldéens, CHASTRA. Gêsn.

Les Arabes, KANISIR. Gêsn.

Les Grecs, Ψ, ou ΨΙΝ.

Les Perses, MAR, ou BUK. Gêsn.

Les Espagnols, PUERCO. Gêsn.

Les Italiens, PORCO; le mâle, VERRO; lorsqu'il est châtré, PORCO CASTRATO, ou MAIALE; la femelle, SCROPHA, ou TROIATA. Gêsn.

Les Allemands, SAW, ou SUW; SU; SCHWYN, ou SCHWEIN. Ils appellent le mâle, EBER; lorsqu'il est châtré, BARO; la femelle, MOS, ou LOOSS; lorsqu'elle est châtrée, GALT; le jeune, FÄRL; SEUWLE; lorsqu'il est encore, SPAN FÄRL. Gêsn.

Les Polonois, WIEPRZ. Rzac.

Les Anglois, HOG; le mâle, BOAR; la femelle, SOW; le jeune, PIG. Raj. Gêsn.

Sus domesticus est animal satis notum, ut longâ descriptione non indigeat. Pilis rigidis, sêta vocatis, toto corpore vestitur. Oculi sunt exigui; auriculæ oblongæ & acutæ. Color vulgaris albicans, interdum ex nigro variegatus.

Le Cochon est un animal assez commun, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. Tout son corps est couvert de poils roides que nous appelons sêtes. Ses yeux sont petits; ses oreilles oblongues & pointues. Sa couleur est ordinairement blanchâtre, quelquefois variée de noir.

** 2. LE COCHON DE LA CHINE.

Sus caudatus, ventre ad terram usque propendente, caudâ pilosâ... SUS SINENSIS.

Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ. Sus Chinenfis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 1. d.*

Il est plus petit que le précédent; il en diffère aussi par ses jambes courtes, & parce que son ventre pend presque jusqu'à terre. Il varie en couleur: Il y en a qui sont variés de noir & de blanc; d'autres sont de la couleur du Sanglier, c'est-à-dire, noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre.

Præcedente minor est; ab illo etiam differt crurum brevitate, & ventre ferè ad terram usque propendente. Colore variat. Dantur ex albo & nigro variegati; dantur etiam colore Apri, scilicet è nigro paululùm canescentes.

** 3. LE SANGLIER.

Sus caudatus, auriculis brevibus, subrotundis, caudâ pilosâ... APER.

Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ. Sus Agrestis, sive Aper. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 1. e.*

Faun. Suec. Linn. No. 36.

Sus Agrestis, sive Aper. *Raj. syn. Quadr. p. 96. No. 2.*

Aper, Porcus sylvestris. *Klein. Quadr. p. 25.*

Aper simpliciter, vel Aper Agrestis: Sus ferus vel sylvaticus. *Gefn. Icon. Quadr. p. 81. Fig. p. 82. (Fig. bona).*

Aper. *Gefn. Quadr. p. 1039. Fig. p. 1040. (Fig. bona).*

Aldro. Quadr. Bij. p. 1013. Fig. p. 1015. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 74. Fig. T. 47. & 48. [Fig. bonis].

Charlet. Exer. p. 13.

Aper, seu Verres sylvaticus. *Rac. Hist. Nat. Pol. p. 215.*

Aper, seu Sus sylvaticus. *Rac. aud. p. 305.*

Les François appellent le mâle SANGLIER; la femelle, LAYE; le jeune; MARCASSIN.

Les Grecs appellent κύναι, ou κυνέ αἶμα.

Les Espagnols, PUERCO SYLVESTRE, ou PUERCO MONTES, ou JAVALI.

Gefn.

Les Italiens, PORCO SYLVATICO, ou CINGHIALE, ou CINGHIARE. *Gefn.*

Les Allemands, WILD SCHWEIN. *Gefn. Rac.*

Les Illyriens, WEPERZ. *Gefn.*

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre VII. 109

Les Polonois, WIEPRZ LESNY. Rzac.

Les Suédois, WILL-SWIN. Linn.

Les Anglois, WILD BOAR, ou WILD-SWINE. Raj. BOËRE. Gefn.

Suem domesticum magnitudine circiter adæquat. Dentes habet caninos, (Gallicè Défenses) multò longiores; auriculas breviores, subrotundas, & nigras; cujus etiam coloris sunt & cauda & pedes. Per totum corpus vestitur pilis rigidis, è nigro paulum canescentibus. Habitat in sylvis.

Il est à peu près de la grandeur du *Cochon domestique*. Il a les dents canines, (appelées en François, *Défenses*) beaucoup plus longues; les oreilles plus courtes, arrondies & noires, ainsi que les pieds & la queue: tout le reste de son corps est couvert de poils roides & noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre. On le trouve dans les forêts.

4. LE COCHON DE GUINÉE.

Sus caudatus, auriculis longis & acuminatis, caudâ nudâ. SUS GUINEENSIS.

Sus dorso ponè seroso, caudâ nudâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 18. sp. 2.

Porcus Guineensis Marcgravii. Raj. Syn. Quadr. p. 96. No. 3.

Porcus Guineensis. Klein. Quadr. p. 16.

Jonst. Quadr. p. 73. Fig. T. 46. [Fig. bona].

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 130. [Fig. bona].

Figurâ est ut nostrates domesticus Sues: ab eis tamen differt, quòd habeat auriculas longas, planè acutas, & prolatis acuminibus; & caudam longam usque ad talos propendentem, pilorum expertem. Setis omninò caret; sed totum corpus tegitur pilis brevibus, rufis splendentibus. Attamen versus caudam in dorso, & circà collum paulò longiores habet pilos. Habitat in Guinée, & Brasiliâ.

Il a la figure de nos *Cochons domestiques*: Il en diffère par ses oreilles, qui sont très longues, & terminées par une pointe longue & aiguë; & par sa queue, qui lui descend jusqu'aux talons, & qui est tout-à-fait dénuée de poils. Il n'a point du tout de foyes; mais tout son corps est couvert de poils courts, d'un roux brillant. Il a aussi quelques poils plus longs sur le dos vers la queue, & vers le col. On le trouve en Guinée, & au Brésil.

Oùj,

5. LE SANGLIER DES INDES ORIENTALES.

Sus caudatus, dentibus caninis superioribus ab origine fursum verſis, arcuatis, caudâ floccosâ... *APER ORIENTALIS*.

Sus dentibus duobus fronti innatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 18. ſp. 4.*

Porcus Indicus, *Babyrouſſa* dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 96. No. 4.*

Porcus Babyrouſſa. *Klein. Quadr. p. 25.*

Babyrouſſa, ſeu *Porcus Indicus*. *Charlet. Exer. p. 14.*

Babyrouſſa. *Bont. Ind. Ori. Fig. p. 61. [Fig. mala].*

Aper Indicus orientalis, *Babi Roefa* dictus. *ſeb. Vol. I. p. 80. Fig. T. 50; F. 1. (Fig. optimâ).*

Les Habitans de l'Iſle de Boïro l'appellent BABI-ROEFA. Seba.

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cerf*, & il reſſemble aſſez au *Cochon* par ſa figure. Sa tête eſt oblongue & étroite; ſon muſeau long; ſes oreilles petites & pointues; ſes yeux petits; ſes jambes longues & déliées; ſa queue longue, friſée, & terminée par un bouquet de poils. Son corps eſt couvert de poils courts, laineux, & très doux au toucher: ceux qui garniſſent le dos ſont ſoyeux, & plus rudes. Sa couleur eſt ou blanchâtre, ou d'un brun mêlé de griſ. Ses dents canines ſupérieures ſont ſingulières: elles tendent vers le haut dès leur origine, & enſuite ſont courbées en arc. Lorsque l'animal eſt vieux, elles vont lui percer la peau au deſſous des yeux. Ses dents canines inférieures ſont très longues & reſſemblent aux défenſes des Sangliers. On le trouve dans les Indes Orientales.

Cervum magnitudine circiter adæquat, & *Porcum* formâ corporis ſarbenè imitatur. Caput habet oblongum & anguſtum; roſtrum prolixum; auriculas parvas, & acutas; oculos parvos; crura longa & gracilia; caudam prolixam, criſpatam, & in floccum deſinentem. Pili breves, quaſi lanci, & molliſſimi totum ejus corpus obtegunt: rigidiores tamen & magis ſetoſi ſunt qui dorſum veſtiunt. Color eſt albicans, aut fuſcus & grifeus. Dentes habet caninos ſuperiores maxime ſingulares: ab origine fursum vertuntur, & deindè arcuantur. Cum ſenefeſcit animal, ipſi infra oculos cutem perforant. Canini inferiores ſunt longiſſimi, & *Aprorum* caninis (Gallicè *deſenſes* dictis) ſimiles. Habitat in Indiâ Orientali.

6. LE SANGLIER DU MEXIQUE.

Sus ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens... APER MEXICANUS.

Sus dorso Cyttifero, caudâ nullâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 3.

Porcus Moschiferus umbilicum in dorso habens. Klein. Quadr. p. 25.

Sus umbilicum in dorso habens. Aldro. Quadr. Bij. p. 939.

Sus minor umbilico in dorso. Barr. Hist. Fr. Eq. p. 161.

Tajacu, seu Aper Mexicanus Moschiferus. Raf. Syn. Quadr. p. 9.

Tajacu. Plon. Hist. nat. Fig. p. 98. [Fig. bona, si caudam non haberet].

Tajacu; Caaigoara Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 229. (Fig. eadem, ut supra).

Porcus Americanus. Charlet. Exer. p. 14.

Zainus. Jonst. Quadr. p. 75. Fig. T. 46. sub isto nomine, Zainus, S. Tajacu;

Porcus Sylvestris. [Fig. ut supra].

Euf. Nierimb. Fig. p. 170. (Fig. eadem).

Aper Indicus, Zainus; aliis Coja-Metl. Mus. Worm. p. 340.

Quauhtla Coymarl. Quapizotl. Aper Mexicanus. Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 637. [Fig. bona].

Coyametl, seu Quauhcoyametl. Ferh. Hist. N. Hisp. p. 8.

Sanglier appelé Petaris. Des March. Tom. III. p. 312.

Les François de la Guiane l'appellent COCHON NOIR. Barr.

Les Mexiquains, Mux-Hoa. Klein.

Porco domestico magnitudine cedit. Collum habet breve & crassum; auriculas erectas, & acuminatas, 3 circiter pollices longas; oculos parvos; caudam nullam. Corpus undique obsitum est setis porcinis crassioribus, è nigro canescentibus, vel è nigro & incano variegatis; quæ setæ in imis lateribus breviores, paulatim longitudine augentur ad medium usque dorsum, ubi nonnullæ 5 aut 6 digitos longæ sunt. Ab aliis

Il est un peu plus petit que le Cochon domestique. Il a le col court & épais; les oreilles droites, pointues, & longues d'environ 3 pouces; les yeux petits. Il n'a point du tout de queue. Tout son corps est couvert de soyes plus grosses que celles des Cochons ordinaires, noires, mêlées d'un peu de blanchâtre. Ces soyes sont courtes vers le bas des côtés, & elles sont de plus en plus longues à mesure qu'elles s'approchent du dos, où il y en a qui ont 5 ou 6 doigts de longueur.

Il diffère principalement des autres especes de ce genre par une espece de bourse qu'il a sur le dos vers la partie postérieure, d'où découle une liqueur d'une odeur désagréable. On le trouve au *Mexique*, dans la *Guiane*, & au *B Brésil*.

hujus generis speciebus præcipuè differt folliculo, quem versùs clunes in dorso gerit, ex quo ingrati odoris liquor emanat. Habitat in *Mexico*, *Guiana*, & *Brasilia*.





ORDO VIII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisforibus in utraque maxillâ, & tribus digitis unguulatis in singulis pedibus donata.

R HINOCEROS solus hunc Ordinem constituit.

XVI.

Genus Rhinocerotis:

Hujus character est

Dentes incisores in utraque maxillâ duo, à se invicem plurimum remoti:

In singulis pedibus digiti tres unguulati:

Cornu in naso.

Obs. Uniuscujusque maxillæ pars anterior aliquo modo plana est, vel potius quasi quadratim truncata; & unusquisque dens incisforius in angulis, partibus maxillarum anterioribus & lateralibus constitutus, situs est. Dentes caninos non habet; sed 12 sunt molares in utraque maxillâ, 6 utrinque.

ORDRE VIII.

LES QUADRUPÈDES

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & trois doigts ongués à chaque pied.

I L n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUPÈDE, qui est le *Rhinoceros*.

XVI.

Le Genre du Rhinoceros.

Son caractère est

D'avoir à chaque mâchoire deux dents incisives, très éloignées l'une de l'autre:

Trois doigts ongués à chaque pied:

Une corne sur le nez.

Obs. La partie antérieure de chacune de ses mâchoires est en quelque façon aplatie, ou plutôt comme coupée quarrément, & chacune des dents incisives est placée à peu-près dans un des angles formés par le devant des mâchoires & leurs côtés. Il n'a point de dents canines; mais il a à chaque mâchoire 12 dents molaires, 6 de chaque côté.

** 1. LE RHINOCEROS.

RHINOCEROS.

Rhinoceros cornu unico conico. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 25. sp. 2.

Rhinoceros. Raj. Syn. Quadr. p. 122.

Klein. Quadr. p. 26.

Gefn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (Fig. mala).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. (Fig. mala).

Aldro. Quadr. Bis. p. 878. Fig. p. 884. (Fig. mala).

Jonst. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (Fig. mala).

Mus. Worm. p. 336.

Charlet. Exer. p. 12.

Abada, sive Rhinoceros. Bont. Ind. Ori. p. 50. Fig. p. 51. (Fig. fac. bona, & digiti ungulati essent).

Naricornis Cavelani. Klein.

Rhinoceros. Kolbe. Tom. III. p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauvaise).

Porte-Corne. Klein.

Les Hébreux l'appellent REEM. Gefn.

Les Chaldéens, KARAS, ou KARASCH. Gefn.

Les Grecs, Πίνυξ.

Les Perses, ELKERKEDOM. Klein.

Les Italiens, RHINOCEROTE. Klein.

Les Polonois, NOZOROZEC; ZEBATI. Klein.

Les Suédois, ENHÖRNING. Linn.

Les Habitans du Cap de B. Esp. TOABBA; NABBA. Klein.

Les Indiens, SANDA BENAMET. Gefn. GOMELA. Klein.

Les Habitans de Java, ARADA; NOEMBA. Klein.

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, environ 6 pieds; depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 12 pieds: le tour de son corps est égal à sa longueur. Sa tête est oblongue; ses yeux petits; ses oreilles semblables à celles d'un Cochon: sa lèvre supérieure, qu'il peut étendre & retirer à volonté, est beaucoup plus longue que l'inférieure, & pointue. Il porte une corne sur le nez; (Quelques Au-

A parte superiore dorsi ad terram usque; 6 pedes circiter altus est; ab extremitate oris ad caudam, 12 pedes circiter longus: ambitus corporis longitudini aequalis. Caput habet oblongum; oculos parvos; aurículas porcinis similes; labium superius, quod extendere & contrahere potest, inferiore multò longius, & valdè acutum; in naso cornu unum, (quandoque duo, secundum Authores quos-

LES QUADRUPEDES, *Classe I. Ordre VII.* 115

dam) ; caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigrescit, estque admodum rugosa, cum profundis plicaturis in collo, dorso, lateribus & cruribus. Pilos non habet, nisi in caudâ, & auriculis. Habitat in *Africa* desertis, inque regnis *Bengala*, & *Patana* *Asia*.

teurs prétendent qu'il en a quelquefois deux. Sa queue est longue de 2 pieds. Sa peau est d'un gris presque noir, très raboteuse, avec des plis considérables au col, sur le dos, aux côtés, & aux jambes. Il n'a des poils qu'aux oreilles, & à la queue. On le trouve dans les déserts de l'*Afrique*, & dans les Royaumes de *Bengale*, & de *Patane* en *Asie*.





ORDRE IX.

ORDO IX.

LES QUADRUPÈDES QUADRUPEDA

Qui ont deux dents incisives à chaque mâchoire, & quatre doigts onglés aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière.

Dentibus incisivibus in utraque maxilla duobus, & quatuor digitis unguulatis in pedibus anticis, & tribus in posticis donata.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUPÈDE, qui est le Cabiai.

UNICUM QUADRUPÈDEM continet hic Ordo, scilicet, *Hydrocharum*.

XVII.

XVII.

Le Genre du Cabiai.

Genus *Hydrochari*.

Son caractère est

Hujus character est

D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire:

Dentes incisores in utraque maxilla duo:

Quatre doigts onglés aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière.

Quatuor digiti unguulati in pedibus anticis, & tres in posticis.

Obs. Il n'a point de dents canines; mais ses dents molaires sont singulières: il en a 8 à chaque mâchoire, 4 de chaque côté, chacune desquelles équivaut à trois; car elles sont fendues à demi, chacune en trois parties, & représentent 3 dents attachées les unes aux autres.

Obs. Dentibus caninis caret. Dentes verò molares maximè sunt singulares: 8 sunt in quilibet maxilla, 4 utrinque: unusquisque dens tribus æquivalens dentibus; tripartitus enim est secundum dimidiam altitudinem, tresque dentes inseparabiles representat.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre IX. 117

I. LE CABIAI.

HYDROCHÆRUS.

Capybara Brasiliensis : *Porcus fluviatilis*, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr.* p. 126.

Capybara Brasiliensis, Marcgr. *Hist. Br. Fig.* p. 230. (*Fig. bona*).

Capybara, Pison. *Hist. nat. Fig.* p. 99. (*Fig. bona*).

Porcus fluviatilis, Jonst. *Quadr.* p. 73. *Fig. T. 60.* (*Fig. bona*).

Sus maximus palustris, Barr. *Hist. Fr. eq.* p. 160.

Cochon d'eau, Des March. *T. III.* p. 314.

Les Européens de la Guiane l'appellent COCHON D'EAU, Des March.

Les Guianois, CABIAI, & CABONARA, Barr.

Les Indiens, CAPYBARA, Des March.

Bimum Portum magnitudine circiter exæquat. Longitudo corporis, à capite ad anum, circiter 2 pedum est. Caput 7 aut 8 pollices longum, & totidem ferè crassum; os crassum & obtusum; maxilla inferior superiore brevior; oculi magni nigri; auriculæ parvæ, parumper acutæ. Barbam habet *felinam*, pilis longis & rigidis compositam: caudâ caret. In singulis pedibus anterioribus quatuor habet ungulas, quarum media longior est, duæ laterales breviores, & quarta minima; in posterioribus verò pedibus tres tantum ungulas, quarum media aliis longior. Pilus totius corporis fuscus est, rigidus, brevis, & densus. Habitat in Guianâ & Brasiliâ.

Il est à peu près de la grandeur d'un Cochon de 2 ans. Il a, depuis la tête jusqu'à l'anus, environ 2 pieds. Sa tête a 7 à 8 pouces de longueur, & presque autant d'épaisseur: son museau est gros & obtus; la mâchoire inférieure plus courte que la supérieure; ses yeux grands & noirs; ses oreilles petites & pointues. Il a des moustaches longues & dures, comme celles d'un Chat: il n'a point de queue. Il a à chaque pied de devant 4 ongles: celui du milieu est le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatrième le plus petit; & aux pieds de derrière trois seulement, dont le milieu est plus long que les deux autres. Tout son corps est couvert d'un poil brun, rude, court, & assez épais. On le trouve dans la Guiane & au Brésil.



ORDRE X.

ORDO X.

LES QUADRUPEDES QUADRUPEDA

Qui ont dix dents incisives à chaque mâchoire, & quatre doigts onglés aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière.

Dentibus incisivis in utraque maxillâ decem, & quatuor digitis unguatis in pedibus anticis, & tribus in posticis donata.

CET Ordre ne contient qu'un seul QUADRPEDE, savoir le Tapir ou Manipouris.

UNICUM est in hoc Ordine QUADRUPES, scilicet Tapirus.

XVIII.

XVIII.

Le Genre du Tapir, ou Manipouris.

Genus Tapiri.

Son caractère est

D'avoir dix dents incisives à chaque mâchoire :

Quatre doigts onglés aux pieds de devant, & trois à ceux de derrière.

Obs. La partie antérieure de chaque mâchoire se termine en pointe, & est garnie de 10 dents incisives : il n'a point de dents canines ; mais il en a dix grandes molaires à chaque mâchoire, 5 de chaque côté, un peu distantes des incisives : ce qui fait en tout 40 dents.

Hujus character est

Dentes incisores in utraque maxillâ decem :

Quatuor digiti unguati in pedibus anticis, & tres in posticis.

Obs. Maxillæ ambæ anteriùs fastigatæ sunt, & in qualibet decem sunt dentes incisores ; canini nulli ; molares 10, quinque utrinque, magni, ab incisivis distant. Summa dentium 40.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre X. 115

LE TAPIR, OU MANIPOURIE.

TAPIRUS.

Tapiiereze Brasiliensibus, Raj. Syn. Quadr. p. 126.

Klein. Quadr. p. 36.

Jonst. Quadr. p. 74.

Marogr. Hist. Br. Fig. p. 229. (Fig. bona).

Tapiietete. Pison. Hist. nat. Fig. p. 101. (Fig. bona).

Sus aquaticus multifulcus. Barr. Hist. Fr. eq. p. 161.

Les Portugais l'appellent ANTA. Raj. Jonst. Marogr. Pison.

Les Guianois, TAPIR; MAYPOURY, ou MANIPOURIE. Barr.

Magnitudine *Juvenum* semestrem exæquat. Figurâ corporis quodammodo ad *Porcum* accedit; capite tamen crassiori, oblongo, superius in acumen desinente; labio superiore quàm inferius multò longiore, præminente, fissuris oblongis donato, quodque validissimo nervo contrahere & extendere potest. Oculos habet parvos *porcinos*; aurículas obrotundas, majusculas; caudam brevissimam, conicam, pilis nudam; crura vix *porcinis* longiora, at crassiuscula; in anterioribus pedibus quatuor ungulas nigricantes, quarum media longior est, duæ laterales breviores, & quarta posterior minima; in posterioribus verò pedibus tres tantum ungulas, quarum media aliis longior. Pili breves sunt: color ipsorum in junioribus est umbræ lucidæ, maculis albis

Il est de la grandeur d'un *Véau* de 6 mois. Quant à la figure du corps, il approche de celle d'un *Cochon*; il a cependant la tête plus grosse, oblongue, & dont la partie supérieure se termine en pointe. La lèvre supérieure, qu'il peut étendre & contracter à volonté, est beaucoup plus longue que l'inférieure, très élevée, & comme garnie de sillons dans sa longueur. Il a de petits yeux de *Cochon*; des oreilles arrondies, assez grandes; la queue très courte, conique & dénuée de poils; les jambes à peu près de la longueur de celles d'un *Cochon*; mais un peu plus grosses: il a à chacun des pieds de devant 4 ongles noirs; celui du milieu est le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatrième; qui est extérieur, le plus petit; & aux pieds de derrière 3 seulement; dont le milieu est plus long que les deux autres. Son poil est court: dans

les jeunes ; il est de couleur *variegatus* ; in adultis *fuscus* ,
 d'ombre brillante , variée de ta- *sive nigricans, sine maculis.*
 ches blanches ; & dans les adul- *Habitat in Guiana & Bre-*
 tes il est brun , ou noirâtre , sans *silia.*
 taches. On le trouve dans la
Guiane & au Brésil.





ORDO XI.

ORDRE XI.

QUADRUPEDA LES QUADRUPÉDES

Dentibus incisifibus in utrâque maxillâ, & quatuor digitis ungulatis in singulis pedibus donata. Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & quatre doigts ongulés à chaque pied.

HIC Ordo, sicut & tres præcedentes, unico QUADRUPÉDE constituitur, scilicet Hippopotamo.

IL n'y a dans cet Ordre; comme dans les trois précédents, qu'un seul QUADRUPÉDE, sçavoir l'Hippopotame.

XIX.

XIX.

Genus Hippopotami.

Le Genre de l'Hippopotame.

Hujus character est

Son caractère est

Dentes incisores in utrâque maxillâ quatuor; superiores per paria remoti; inferiores rectè antrorsum prominentes, intermediū lateribus multò longiores;

D'avoir à chaque mâchoire quatre dents incisives; dont les supérieures sont séparées par paires, & les inférieures avancent en avant parallèlement à la mâchoire, & les deux du milieu sont beaucoup plus longues que celles des côtés: Quatre doigts ongulés à chaque pied.

In singulis pedibus digiti quatuor ungulati.

Quatre doigts ongulés à chaque pied.

Obs. Hippopotami dentium numerus 44; scilicet incisores 8, 4 in utrâque maxillâ; canini 4, duo utrinque; omnes cylindrici: canini oblique truncati: molares 32, octo utrinque in utrâque maxillâ.

Obs. L'Hippopotame a en tout 44 dents, sçavoir 8 incisives, 4 à chaque mâchoire; 4 canines, 2 de chaque côté; toutes ces dents sont cylindriques: les canines sont comme coupées en biseau: 32 molaires, 8 de chaque côté à chaque mâchoire.

Q

* 1. L'HIPPOTAPOTE.

HIPPOPOTAMUS.

Hippopotamus. Bupotamus. Klein. *Quadr. p. 34. Fig. T. 3.* (*Fig. mala*).

Hippopotamus. Raj. *Syn. Quadr. p. 123.*

Linn. *syft. nat. ed. 6^{me} g. 26. fp. 1.*

Gefn. *Icon. Quadr. Fig. p. 82.* (*Fig. peffima*).

Gefn. *Icon. Aquat. Fig. p. 354.* (*Fig. eadem, ut fuprà*).

Gefn. *Pife. Fig. p. 494.* (*Fig. eadem*).

Aldro. *Quadr. Dig. Viv. p. 181. Fig. p. 183; & 184.* [*Fig. fat bonis*].

Jonft. *Quadr. p. 76. Fig. T. 49.* (*Fig. peffimis*).

Bell. *de Aquat. p. 22. Fig. p. 23.* [*Fig. mala*].

Charlet. *Exer. p. 14.*

Profp. *Alp. Ægypt. Vol. II. p. 246. Fig. T. 23.* (*Fig. fat bona*).

Hippopotamus Antiquorum. Colum. *Aquat. p. 28. Fig. p. 30.* (*Fig. bona*).

Caballus marinus. Flor. *Sin. p. 1. Fig. T. I.* (*Fig. bona, exceptis pedibus*).

Cheval marin, ou Hippotapote. Kolbe. *Tom. III. p. 27. Fig. p. 64. F. 1.* (*Fig. mauv.*).

Bomarin. Klein.

Les Grecs l'appellent *ἵπποπόταμος*.

Les Egyptiens, FORAS FLEBAR. Aldrov.

Les Chinois, HAYMA. Flor. *Sin.*

Les Suidoïs, BEHEMOT. Linn.

Il a, depuis la tête jufqu'à la queue, 13 pieds de long : le diamètre vertical de fon corps a $3\frac{1}{2}$ pieds, & le diamètre horizontal $4\frac{1}{2}$ pieds. Le tour de fon corps eft de 13 pieds. Sa tête a $2\frac{1}{2}$ pieds de large, & 3 pieds de de long ; l'ouverture de la bouche 1 pied ; fes jambes $3\frac{1}{2}$ pieds de long depuis le ventre jufqu'à terre, & 3 pieds de tour. Son museau eft gros & charnu ; fes yeux petits ; fes oreilles minces, & longues de 3 pouces. Sa queue, qui a un pied de long, eft groffe à fon origine, & fe termine tout à coup en pointe. Longitudo corporis, à capite ad caudam, 13 pedum est : corporis diameter verticalis $3\frac{1}{2}$ pedum, diameter horizontalis $4\frac{1}{2}$ pedum. Ambitus corporis longitudini æqualis ; caput $2\frac{1}{2}$ pedes latum, 3 pedes longum ; oris riētus 1 pedem ; crura à terrâ ad ventrem $3\frac{1}{2}$ pedes longa ; crurum ambitus 3 pedes. Rostrum crassum & carnosum ; oculi parvi ; auriculæ 3 uncias longæ, & tenues. Cauda 1 pede longa, ab origine crassa, & statim in acutum desinens. Cutis admodum

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XI. 123
crassa, dura, & colore obs- Sa peau est très épaisse, dure,
curo. Pilos non habet, nisi & d'une couleur obscure. Il n'a
in extremitate caudæ, & in point de poil, excepté au bout
rostro, in quo est barba Leo- de la queue, & au museau, où
nine & Felina similis. Habitat il a une moustache pareille à celle
in Africâ, & in Indo India des Lions & des Chats. On le
fluvio, trouve en *Afrique*, & dans l'*Inde*,
de sur le fleuve Indus,



ORDRE XII. ORDO XII.
LES QUADRUPÈDES QUADRUPEDA

Qui ont deux dents incisives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

Dentibus incisivis in utraque maxillâ duobus, & digitis unguiculatis donata.

LE plus grand nombre des QUADRUPÈDES de cet Ordre n'a point de dents canines ; quelques uns en ont. Parmi les uns & les autres, il y en a qui ont des piquans sur le corps, les autres n'ont que du poil. Ils se divisent en quatre Sections. La première contient ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquans sur le corps, comme le *Porc-Epic*. La seconde de ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans sur le corps, mais qui l'ont seulement couvert de poils, comme le *Castor*, le *Lièvre*, le *Rat*, &c. La troisième ceux qui ont des dents canines, & qui n'ont point de piquans sur le corps, comme la *Musaraigne* : & la quatrième ceux qui ont des dents canines, & des piquans sur le corps, comme le *Hériflon*.

PLeraque hujus Ordinis QUADRUPEDA dentibus caninis carent ; quædam verò illis dentibus donantur. Ex utrisque quædam habent corpus aculeatum, vel aculeis tectum, alia sunt corpore tantummodo piloso. In quatuor Sectiones dividuntur. Prima continet ea quæ dentibus caninis carent, quæque corpus aculeatum habent, sicut *Hystrix*. Secunda ea quæ nec dentes caninos, nec corpus aculeatum, sed tantummodo pilosum habent, sicut *Castor*, *Lepus*, *Mus*, &c. Tertia ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis destitutum habent, ut *Musaraneus*. Quarta denique ea quæ dentes caninos habent, & corpus aculeatum, vel aculeis tectum, sicut *Erinaceus*.

SECTIO I.

SECTION I.

Ea quæ dentibus caninis carent ; quæque corpus aculeatum habent.

Ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquants sur le corps.

UNICO Genere, scilicet *Hystricis*, constituitur hæc Sectio.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul genre, sçavoir celui du *Porc-Epic*.

XX.

XX.

Genus Hystricis.

Le Genre du Porc-Epic.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeatum.

Son caractère est
D'avoir deux dents incisives à
chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Des piquans sur le corps.

Obs. Omnium hujus Generis specierum dentes incisores contigui sunt & cultrati.

Obs. Les dents incisives de toutes les espèces de ce Genre sont contigues & tranchantes.

** I. LE PORC-EPIC.

Hystrix, capite cristato... HYSTRIX.

Hystrix manibus retradaçtylis, plantis pentadaçtylis, capite cristato: Linn. syst. nat. ed. 6. g. 17. sp. 1.

Hystrix. Gessn. Quadr. p. 631. Fig. p. 632. (Fig. bona, exceptis dentibus).

Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 87. (Fig. eadem, ut supra).

Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p. 471. Fig. p. 474. (Fig. ut bona).

Jonst. Quadr. p. 119. Fig. T. 68. (Fig. bona).

Raf. Syn. Quadr. p. 206.

Charlet. Exer. p. 19.

Mus. Worm. p. 335.

Hystrix Orientalis cristata. Seb. Vol. I. p. 79. Fig. T. 50. F. 1. [Fig. bona].

Acanthion cristatus. Klein. Quadr. p. 66.

Porc-Epic. Kolbe. T. III. p. 44. Fig. p. 64. F. 2. [Fig. bonne].

Hist. de l'Acad. T. I. l. Part. 2. p. 33. Fig. Pl. 41. (Fig. bonne).

Q iiij

Les Grecs l'appellent *†††††.*

Les Espagnols, PUERCO-ESPIN. Gsf. Aldro.

Les Italiens, HISTRICE, ou PORCO SPINOSO. Gsf. Aldro.

Les Anglois, PORCUPINE. Raj. PORTEPYNE. Gsf. Aldro.

Les Illyriens, PORCO SPINO. Gsf. Aldro.

Les Allemands, MEERSCHWEYN ; DORNSCHWEYN ; STACHELSCHWEYN ;

PORCOPIC ; TARAN. Gsf.

Les Suédois, PIGG SWIN. Linn.

Il a 2 $\frac{1}{2}$ pieds de long, depuis le museau jusqu'à l'anus. Ses jambes sont fort courtes : celles de devant n'ont que quatre pouces depuis le ventre jusqu'à terre, & celles de derrière 6. Sa tête a 5 pouces de long. Sa lèvre supérieure est fendue comme celle d'un Lièvre : ses yeux sont petits ; ses oreilles ressemblent à celles de l'homme. Il n'a point de queue. Il a à chaque pied 5 doigts (a) : il y en a un de ceux de devant qui est fort petit, & dont il n'y a que l'ongle qui paroît au dehors. Le dos & les côtés sont couverts de piquans un peu courbés comme des alènes, pointus, de différentes longueurs & différentes grosseurs, variés de blanc, & de brun noirâtre. Il y en a de tout à fait blancs. Les plus gros sont les moins longs ; ils ont depuis 6 jusqu'à 12 pouces : les autres ont 15 pouces, & sont flexibles. Il

Longitudo corporis, ab ore ad anum, 2 $\frac{1}{2}$ pedum est. Crura brevissima ; anteriora à ventre ad terram 4 tantum pollices, posteriora verò 6 longa sunt. Caput 5 pollices longum. Labium superius, ut in Lepore, fissum : oculi parvi : auriculæ auriculis humanis similes : cauda nulla. In singulis pedibus 5 sunt digiti (a), quorum unus pedum anteriorum minimus, ungue tantummodò exterius apparente. Dorsum & latera teguntur aculeis ad instar subularum parumper incurvis, acuminatis, longitudine & crassitie variis, ex nigro, fusco, & albo distinctis : dantur etiam omnino albi. Crassiores longitudine sunt minores ; 6 inter & 12 pollices longi sunt ; tenuiores verò 15 pollicum longitudinem attingunt, & flexibiles sunt. In

(a) Plusieurs Auteurs ne lui donnent que 4 doigts aux pieds de devant. J'ai vu au Cabinet du Roi 1 squelette de cet Animal, dont un avoit 5 doigts aux pieds de devant, & l'autre n'en avoit que 4.

(a) Secundum Authores plurimos 4 sunt tantum in pedibus anterioribus digiti. 1 Hystricis sceleta in Museo Regio vidi, quorum alter in pedibus anterioribus 5 digitis, alter verò 4 tantum donatus : ut.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 127

parte posteriore capitis & colli pulchra est quasi crista, conflata plurimis aculeis tenuissimis, & flexibilibus, fetis Apri similibus, longitudine inæqualibus, aliis unius pedis, aliis minus longis; quorum medietas versus originem alba est in aliquibus, alterâ medietate cinerea; in aliis verò reversâ. Pectus & venter similibus ornantur fetis. Habitat in *Africa, Sumatra, & Java.*

a sur le derrière de la tête & du col une espèce de panache, formée de quantité de piquans fort déliés & flexibles, assez semblables aux soies du *Sanglier*, & de longueur inégale, quelques uns ayant un pied de long, dont la moitié vers la racine est blanche dans quelques uns & le reste gris, & dans d'autres tout au contraire. La poitrine & le ventre sont couverts de soies à peu près pareilles. On le trouve en *Afrique, à Sumatra, & à Java.*

2. LE PORC-ÉPIC DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Hystrix aculeis apparentibus, caudâ brevi & crassâ... HYSTRIX NOVÆ HISPANIÆ.

Hoitzlacuatzin, seu Tlacuatziñ spinosum. *Hystrix Novæ Hispaniæ. Hermand. Hist. Mex. Fig. p. 322. (Fig. sat bona).*

Hoitzlacuatzin. *Enf. Nieemb. Fig. p. 154. (Fig. sat bona).*

Canis mediocris magnitudinem adæquat. Totum corpus, exceptis ventre & cruribus, tegitur aculeis peracutis, 3 pollices longis, tenuibus; carentibus & luteis, sed mucronibus nigricantibus; pilis tamen quibusdam mollibus, atris, sed circa exortum carentibus, si caput excipias, intermixtis. Cauda brevis est & crassa, aculeorum à media parte usque ad extremum expers. Hæc caudæ medietas, sicut & venter & crura, pilis tantum teguntur nigris. Habitat in Nord

Il est de la grandeur d'un *Chien* d'une moyenne taille. Tout son corps, excepté le ventre & les jambes, est couvert de piquans très aigus, longs de 3 pouces, menus, variés de blanc & de jaune, avec la pointe noire. Parmi ces piquans, exceptez à la tête, sont quelques poils noirs, terminés par un peu de blanc, & doux au toucher. La queue est courte & grosse; elle n'a point de piquans depuis la moitié de sa longueur jusqu'à son extrémité: cette partie est seulement couverte de poils noirs, ainsi que le ventre & les jambes. On le trou-

ve dans la Nouvelle Espagne, le *Hispaniâ*, ac montosis gaudet locis.

3. LE PORC-EPIC DE LA BAYE DE HUDSON.

Hystrix aculeis sub pilis occultis, caudâ brevi & crassâ... HYSTRIX HUDSONIS.

Cavia Hudsonis. Klein. Quadr. p. 51.

Porc-Epic de la Baye de Hudson, *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p. 56. Fig. p. 58. (Fig. bonne).*

Edwards. Tom. I. Fig. p. 52. (Fig. bonne).

Porc-Epic de l'Amérique Septentrionale. *Cat. App. p. 30.*

Il ressemble beaucoup au *Castor* par sa taille & sa grosseur. Sa tête est allongée, comme celle d'un *Lièvre*. Il a le nez plat, & tout à fait couvert de poils courts; les oreilles très courtes, & qui paroissent à peine au-dessus de la fourrure; les jambes courtes; des ongles longs & pointus, 4 aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière; la queue d'une longueur médiocre, & assez grosse, plus épaisse vers le corps qu'à son extrémité, qui est blanche en dessous. Tout son corps est couvert de poils d'un brun obscur, assez doux au toucher, longs de 4 pouces, plus courts cependant autour de la tête & proche des pattes, & un peu plus longs sur le derrière de la tête. Sous ces poils sur la partie supérieure de la tête, du corps & de la queue, sont cachés des piquans blancs, dont les pointes sont noires & très aiguës, & dont les plus

Quoad magnitudinem & crassitiem *Castorem* æmularur. Caput habet oblongum, *Leporis* capiti simile; nasum planum, pilis brevibus omnino tectum; auriculas brevissimas, sub pilis sæpe occultas; crura brevia; digitos 4 in pedibus anterioribus, 5 in posterioribus, longis & acutis unguibus munitos; caudam mediocris longitudinis, & crassam, crassiorem tamen ad originem quam in extremitate, quæ infra est alba. Per universum corpus vestitur pilis sordide fuscis, parumper mollibus, 4 pollicum longis, brevioribus tamen circa caput & propè crura, & paulò longioribus in parte capitis posteriore; sub quibus pilis in parte superiore capitis, corporis & caudæ, occultantur aculei candentes, mucronibus nigris & peracutis, quorum majores 3 pollices

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XII.* 129
 3 pollices æquant. Præter longes le sont de 3 pouces. Outre
 prædictos pilos molles, qui- ces poils doux, il y en a quelques
 dam sunt intermixti multò uns de beaucoup plus longs, roi-
 longiores, rigidi, & rari, for- des & clair-semés, dont le bout
 didè albo terminati; quibus est d'un blanc sale; ce qui fait pa-
 ope quibusdam in locis ali- roître la fourrure un peu grisâtre
 quid cinerei apparet. Habi- en quelques endroits. On le trou-
 tat in freto Hudsonis, & ve à la Baye de Hudson, & mê-
 etiam in omni America Sep- me dans toute la partie Septen-
 tentrionali regione. trionale de l'Amérique.

4. LE PORC-ÉPIC D'AMÉRIQUE.

*Hystrix caudâ longissimâ, tenui, medietate extremâ aculeo-
 rum experte... HYSTRIX AMERICANUS.*

*Hystrix pedibus tetradactylis; caudâ exsertâ prehensili seminudâ. Linn. syst.
 nat. ed. 6. g. 17. sp. 2.*

Hystrix Americanus. Raj. Syn. Quadr. p. 208.

Hystrix minor leucophæus. Barr. Hist. Fr. eq. p. 153.

Cuandu. Jonst. Quadr. Fig. T. 60. (Fig. bona).

Pison. Hist. Nat. Fig. p. 99. (Fig. bona).

Cuandu Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 233. (Fig. bona);

Chat épineux. Des March. T. III. p. 303.

*Les Portugais l'appellent OURICO CACHEIRO. Pison. Marcgr. Des March:
 ESPINHO. Pison.*

Les Indiens, CUANDU. Des March.

Les Habitans de la Guiane, GODANDOU. Barr.

Corporis longitudo, ab oc- La longueur de son corps,
 cipitio ad initium caudæ, 1 depuis l'occiput jusqu'à la
 pedis est; caudæ autem 1 queue, est d'environ 1 pied; cel-
 dis. & 5 pollicum; crurum le de sa queue d'un pied 5 pou-
 anteriorum circiter 4 polli- ces; celle des jambes de devant
 cum, posteriorum paulò ma- d'environ 4 pouces, & celle des
 jor. Caput habet parvum; jambes de derriere un peu plus.
 rostrum oblongum; oculos Sa tête est petite; son museau al-
 rotundos, prominentes, longé; ses yeux ronds, élevés &
 infar carbunculi, fulgidos; brillants comme des charbons ar-
 auriculas parvas, sub aculeis dents; ses oreilles petites & pres-
 ferè latitantes; nares paten- que cachées sous les piquans;
 tes; pedes pedibus *Simiarum* les narines ouvertes. Ses pieds

R

approchent de ceux du *Singe* ; il n'a cependant que 4 doigts à chaque pied, & point de pouce. Tout son corps, exceptez ses pieds, est couvert de piquans de 3 ou 4 pouces de longueur, jaunes depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, l'autre moitié noire ou d'un brun roux, terminée par une pointe blanche & très aiguë. Les piquans qui couvrent la tête & les jambes, sont moins longs. Il a autour des narines des poils longs de 3 ou 4 pouces, qui lui font une barbe semblable à celle des *Chats*. Sa queue n'a des piquans que depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur ; l'autre moitié n'est couverte que de quelques poils semblables aux foyes de *Cochon*, & très clair-semés. On le trouve en *Amérique*.

ferè similes, sed 4 tantummodo digitis constantes ; nam pollice caret. Totum corpus, pedibus exceptis, munitum est aculeis 3 aut 4 pollicum longis, ab insitione in cutem ad dimidiam ferè longitudinem flavescentibus, alterâ medietate nigrâ, aut ex rufo fuscâ, cuspidè albo & peracuto. Aculei, quibus caput & crura cooperiuntur, minore longitudine donantur. Pilos habet circum nares 3 aut 4 pollicum longos, qui barbâ *felinâ* ipsi faciunt. Cauda, ab exortu suo ad medietatem tantum, aculeis munitur, alterâ medietate raris fetis, *Porcorum* instar, obsitâ. Habitat in *América*.

5. LE GRAND PORC-EPIC D'AMÉRIQUE.

Hystrix caudâ longissimâ, tenui, medietate extrema aculeorum experte... HYSTRIX AMERICANUS MAJOR.

Hystrix longius caudatus, brevioribus aculeis. Barr. Hist. Fr. eq. p. 153.

Hystrix. Bont. Ind. Ori. Fig. p. 54. (Fig. bona).

Cuandu major. Pison. Hist. Nat. p. 324. Fig. p. 325. (Fig. bona).

Les Portugais l'appellent ORICO CACHERO, & ESPINHO. Pison.

Il ne diffère du précédent, que parce qu'il est plus grand. On le trouve aussi en *Amérique*. Magnitudine tantum, quâ eum antecellit, à præcedente differt. Habitat etiam in *América*.

6. LE PORC-EPIC DES INDES ORIENTALES.

Hystrix caudâ longissimâ, aculeis undique obsitâ, in extremo panniculatâ... HYSTRIX ORIENTALIS.

Hystrix pedibus pentadactylis, caudâ exterrâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 17: sp. 3.

Porcus aculeatus sylvestris, live Hystrix Orientalis singularis. Seb. Vol. I. p. 84. Fig. T. 52. F. 1. (Fig. optima).

Acanthion caudâ prælongâ acutis pilis horridâ, in exitu quasi panniculatâ. Klein. Quadr. p. 67.

Corpus habet crassum & breve ; caput crassum ; labium superius, ut in *Lepore*, fissum ; oculos magnos splendentes ; aurículas parvas, rotundas, intus omnino nudas ; barbam pilis longis & acutissimis conflatam. In singulis pedibus 5 digitis, unguibus crassis & acuminatis munitis, donatur. Pedes posteriores anterioribus sunt longiores, & *Ursinis* similes. Totum corpus, ad extremos usque pedes, tenuissimis & acutissimis munitum est aculeis, quorum, qui supinam corporis partem vestiunt, varios reflectunt colores, pro vario, quo lucis radii incidunt, modo. Caudam habet longissimam, undique obsitam aculeis, quorum, qui extremitatem caudæ cooperiunt, maximè singulares sunt ; ex nodis enim veluti articulatis conflati videntur. Horum aculeorum singuli non unius sunt

Il a le corps gros & court ; la tête grosse ; la lèvre supérieure fendue, comme celle d'un *Lévre* ; les yeux grands & brillants ; les oreilles petites, rondes, & nues intérieurement ; une moustache composée de poils longs & très pointus. Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles gros & aigus. Ses pieds de derrière sont plus longs que ceux de devant, & ressemblent à ceux de l'*Ours*. Tout son corps est hérissé, jusqu'au bout des pieds, de piquans très déliés & très aigus : ceux du dessous du corps paroissent de couleur différente, selon qu'ils reçoivent les rayons de lumière. Sa queue est très longue, & couverte d'un bout à l'autre de piquans, dont ceux de l'extrémité sont singuliers ; car ils semblent composés de nœuds attachés bout à bout les uns des autres. Ces piquans ne sont pas tous de la même longueur, ni de la même grosseur ; mais joints ensemble, ils forment comme une espèce

d'épi. On le trouve dans les Indes Orientales.

longitudinis, nec crassitie; sed omnes adunati, quasi panniculam referunt. Habitat in Indiâ Orientali.

SECTION II.

SECTIO II.

Ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans sur le corps.

Ea quæ dentibus caninis carent, & corpus aculeis destitutum habent.

Cette Section est composée de 6 genres différens, qui se distinguent les uns des autres par la forme de la queue. Les uns l'ont tout à fait platte & écailleuse, comme le *Castor*; d'autres, où l'ont très courte; ou n'en ont point du tout; & ceux là, ou ont les oreilles longues, comme le *Lièvre*; ou ont les oreilles courtes, ou n'en ont point du tout, comme les *Lapins*; d'autres l'ont longue & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît platte, comme l'*Ecureuil*; d'autres l'ont de même longue & couverte de poils, mais rangés de façon qu'elle paroît ronde, comme le *Loir*; d'autres enfin l'ont nue, ou couverte de poils clair semés, comme le *Rat*.

Obs. Les dents incisives de tous les QUADRUPÈDES de cette Section, ainsi que de ceux du Genre précédent, sont contigues & tranchantes.

Hæc Sectio constituitur 6 generibus, formâ caudæ à se invicem discrepantibus: alia enim caudâ donantur omnino planâ & squamosâ, sicut *Castor*; alia vel caudâ brevissimâ, vel caudâ nullâ; inter quæ alia auriculis longis, ut *Lepus*; alia auriculis brevibus, vel nullis; ut *Cuniculus*, prædita sunt; alia caudâ longâ vestitâ pilis ita dispositis, ut caudam planam efficiant, ut *Sciurus*; alia caudâ etiam longâ & vestitâ pilis, sed ita dispositis, ut caudam rotundam efficiant; ut *Glis*; alia denique caudâ nudâ aut raris pilis obsitâ, ut *Mus*.

Obs. Omnium hujus Sectionis QUADRUPEDUM, sicut eorum Genis præcedentis, dentes incisores contigui sunt & ciliati.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 133

X X I.

X X I.

Genus *Castoris*.

Le Genre du *Castor*.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ duo;
Canini nulli;
Digiti unguiculati;
Corpus aculeis destitutum;
Cauda plana & squamosa.

Son caractère est
D'avoir deux dents incisives à
chaque mâchoire;
Point de dents canines;
Les doigts onguiculés;
Point de piquans sur le corps;
La queue plate & écailleuse.

Obs. In aliquibus hujus Generis
QUADRUPEDIBUS cauda horizon-
taliter plana est; in aliis verò ver-
ticaliter.

Obs. Parmi les QUADRUPÈDES de ce
Genre les uns ont la queue plate ho-
rizontalement; les autres l'ont plate
verticalement.

** I. LE CASTOR, OU LE BIÈVRE.

Castor castaneus coloris, caudâ horizontaliter planâ... CASTOR, sive FIBER.

Castor caudâ ovatâ planâ. Fiber. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 10. sp. 1.
Faun. Sæc. Linn. N^o. 23.

Castor sive Fiber. Raj. Syn. Quadr. p. 209.
Rac. auct. p. 406.

Castor. Fiber. Klein. Quadr. p. 91.

Fiber; Castor; Canis Ponticus. Gessn. Icon. Aquat. p. 351. Fig. p. 353.
(Fig. bona).

Castor. Gessn. Quadr. Fig. p. 356. (Fig. bona).

Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 83. (Fig. mala). & p. 84. (Fig. bona).

Gessn. Pisc. p. 119. Fig. p. 220. (Fig. mala).

Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 276. Fig. p. 279. (Fig. bona) 11.

Jonst. Quadr. p. 102. Fig. T. 68. (Fig. bona).

Mus. Worm. p. 320.

Charlet. Extr. p. 18.

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 115.

Fiber. Bell. de aquat. p. 28. Fig. p. 30. (Fig. bona).

Castor. Hist. de l'Acad. Tom. III. part. 1. p. 137. Fig. Pl. 19. (Fig. bona) 1.

Hist. de l'Acad. an. 1704. p. 43.

Cat. App. p. 19.

Les Grecs l'appellent ΚΑΤΑΡ.

Les Espagnols, BEVARO. Charlet.

Les Italiens, BIVARO, ou BEVERO. Gessn. Aldro.

R iiij

Les Allemands, BIBER. *Gefn. Aldro. Raz.*

Les Illyriens, & les Polonois, BOBR. *Gefn. Aldro. Raz.*

Les Suédois, BÄFFWER. *Linn.*

Les Flamands, BEVER. *Charlet.*

Les Anglois, BEAVER. *Raj. BEVER. Gefn. Aldro.*

Il a environ $2\frac{1}{2}$ pieds, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue : le tour de son corps a aussi $2\frac{1}{2}$ pieds. Sa queue, qui est plate horizontalement, a 11 pouces de long, & 3 pouces de large vers son milieu, & finit en ovale. Sa tête est ronde, & a $5\frac{1}{2}$ pouces, depuis les narines jusqu'à l'occiput. Ses yeux sont petits & noirâtres ; ses oreilles rondes & très courtes, revetues de poil en dehors, & presque nues en dedans ; son col court & épais ; les jambes très courtes. Il a à chaque pied 5 doigts séparés les uns des autres dans les pieds de devant, & joints ensemble par une forte membrane dans ceux de derrière. Les pieds de devant sont plus petits que ceux de derrière, & représentent une main, dont les ongles sont longs & pointus : ceux des pieds de derrière sont larges & obtus. Tout son corps, excepté sa queue, qui est couverte d'écaillés, entre lesquelles sortent quelques petits poils, mais très clair semés, est couvert de poils doux & épais, d'un maron plus foncé dans quelques uns, & plus

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad initium caudæ, $2\frac{1}{2}$ pedum ; ambitus corporis totidem. Cauda, quæ horizontaliter plana est, 11 pollices longa, 3 pollicum lata circa medium, in ovalem figuram definit. Caput rotundum, à naribus ad occipitium $5\frac{1}{2}$ pollices longum. Oculi parvi, subnigri ; auriculæ rotundæ, breves, extrorsum pilosæ, intus fere nudæ ; collum breve & crassum ; crura brevia. In singulis pedibus 5 sunt digiti, omnes in anterioribus à se invicem separati, in posterioribus verò validissimâ membranâ inter se connexi. Pedes anteriores posterioribus minores, manum quodammodo referunt. Ungues pedum anteriorum longi sunt & acuti, posteriorum verò lati & obtusi. Totum corpus, exceptâ caudâ, quæ squamis undique tegitur, pilis quibusdam rarissimis intermixtis, vestitur pilis densissimis & mollissimis, in aliquibus saturioris, in aliis dilutioris cas-

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XII.* 135
 tanei coloris (a). Habitat in Occitaniâ, & in Regionibus Europe & America Septentrionalibus. clair dans d'autres (a). On le trouve en Languedoc, & dans la partie Septentrionale de l'Europe & de l'Amérique.

**** 2. LE CASTOR BLANC.**

Castor albus, caudâ horizontaliter planâ... CASTOR ALBUS.

A præcedente differt colore, qui albus est, cum magnâ maculâ cinereâ, ex rufo paululum mixtâ, in parte superiore colli, & maculâ simili, sed minori, versus clunes. Pili quoque circâ caudâ originem ex flavo rufescunt. Habitat in Norvegia & Canada. Ex Museo Realmuriano.

Il diffère du précédent par sa couleur. Il est blanc, avec une grande tache grise, mêlée d'un peu de roux, sur la partie supérieure du col, & une pareille, mais plus petite, vers le derrière. Il a aussi plusieurs poils d'un jaune roux autour de l'origine de la queue. On le trouve en Norvège & en Canada, d'où il a été apporté à M. de Reaumur.

**** 3. LE RAT MUSQUÉ.**

Castor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus membranis inter se connexis... MUS MOSCHIFERUS.

Castor caudâ longâ, lanceolatâ, planâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 20. sp. 2.*

Faun. Suec. Linn. N°. 24.

Glis moschiferus. *Klein. Quadr. p. 57.*

Mus Aquaticus Exoticus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p. 217.*

Mus Aquatilis Clusii. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p. 448. (Fig. sat bona).*

Mus Aquaticus Clusii. *Mus. Worm. p. 334.*

Mus Aquaticus. *Jonst. Quadr. Fig. T. 73. (Fig. sat bona).*

Clus. Exot. Fig. p. 375. (Fig. sat bona).

Sorex Moscoviticus, sive odoriferus. *Charlet. Exer. p. 25.*

Animal ex Moscoviâ. *Gaz. Rup. Best. Fig. T. 15. (Fig. bona).*

Les Anglois l'appellent Muscovy, ou MUSK-RAT. *Raj.*

Les Suédois, DESMAN. *Linn.*

(a) Quidam sunt omnino nigri in Septentrionalibus regionibus; & eò saturatione est color quò frigidior est regio quâ inhabitant.

(a) Il y en a de tout à fait noirs dans les pays les plus Septentrionaux: & en general, plus le pays qu'ils habitent est froid, plus leur couleur est foncée.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 9 pouces : le tour de son corps est de 7 pouces. Sa tête est petite à proportion du corps : la partie supérieure de son museau est allongée, comme celle de la *Taupo* ; l'ouverture de sa bouche petite ; ses yeux très petits, & à peine visibles. Sa queue, qui est plate verticalement, a $6\frac{1}{2}$ pouces de long, & 8 lignes de large, & se termine en pointe obtuse : elle est couverte de très petites écailles, entre lesquelles poussent quelques poils. Ses jambes sont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous joints ensemble par de fortes membranes, armés d'ongles longs & forts ; les pieds de derrière sont plus grands que ceux de devant. Tout son corps est couvert de poils très doux & très épais, d'un brun brillant sur le dos, & d'un gris blanchâtre & brillant sous le ventre. Il a une forte odeur de musc. On le trouve en Russie, en Moscovie, & en Laponie.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ originem, 9 pollicum : ambitus 7 pollicum. Caput habet, pro corporis mole, parvum ; partem rostri superiorem, instar *Talpa*, prominulam ; oris rictum parvum ; oculos valdè exiguos, & vix conspicuos ; caudam verticaliter planam, $6\frac{1}{2}$ pollices longam, 8 líneas latam, in apicem obtusum desinentem ; squamis minimis, pilis quibusdam intermixtis, totam ; crura breviter. Pedes posterioribus anterioribus sunt majores. Totum corpus vestitur pilis mollissimis & densissimis, fuscis & splendentibus in dorso, & ex albo cinerascens & splendentibus in ventre. Moschum maximè redolet. Habitat in Russia, Moscovia & Laponia.

** 4. LE RAT-MUSQUÉ DE CANADA.

Castor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus à se invicem separatis... MUS MOSCHIFERUS CANADENSIS.

Rat musqué, Hist. de l'Acad. an. 1725, p. 323. Fig. Pl. 11. [Eig. assez bonne].

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium,

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XII.* 337

Initium, 1 pedis; ambitus 10 circiter pollicum: Caput habet oblongum, à naribus ad occipitum 2 1/2 pollices longum; oculos magnos; aurículas brevissimas; caudam verticaliter planam, 9 pollices longam, & 10 circiter lineas latam, in apicem obtusum desinentem, squamis minimis tectam, pilis quibusdam intermixtis; crura brevissima. Pedes singuli in 5 digitos sunt divisi, omnes à se invicem separatos, validis ungibus munitos, pollice distincto: pedes posteriores anterioribus majores. Totum corpus vestitur pilis mollissimis & densissimis, in parte corporis superiore & in thorace rufis, sed saturatius in dorso, in gutture & ventre ex albo flavicantibus. Moschum maximè redolet. Habitat in *Canada*.

1 pied: le tour de son corps est d'environ 10 pouces. Sa tête est oblongue, & a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 2 1/2 pouces: ses yeux sont grands; ses oreilles très courtes. Sa queue, qui est plate verticalement, a 9 pouces de long, & environ 10 lignes de large, & se termine en pointe obtuse: elle est couverte de très petites écailles, parmi lesquelles poussent quelques poils: ses jambes sont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous séparés les uns des autres, armés d'ongles forts, le pouce bien distinct: ses pieds de derrière sont plus grands que ceux de devant. Tout son corps est couvert de poils très doux & très épais: toute la partie supérieure du corps, ainsi que la poitrine, est d'un roux, plus foncé sur le dos qu'ailleurs: la gorge & le ventre sont d'un blanc jaunâtre. Il a une forte odeur de musc. On le trouve en *Canada*.

XXII.

Genus Leporinum.

Hujus caractere est

Dentes incisores in utraque maxillâ duo:

Canini nulli:

Digiti unguiculati:

Corpus aculeis destitutum:

Cauda brevissima, vel nulla:

Auriculæ longæ.

XXII.

Le Genre du Lièvre.

Son caractere est

D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire:

Point de dents canines:

Les doigts onguiculés:

Point de picquants sur le corps:

La queue très courte, ou point de queue:

Les oreilles longues.

S

** 1. LE LIÈVRE.

Lepus caudatus, ex cinereo rufus... LEPUS.

Lepus caudā abrupta, pupillis atris. *Lepus*. *Linn. syst. nat. ed. 6. §. 19. sp. 2.*

Faun. Suec. Linn. N°. 19.

Lepus vulgaris cinereus. *Klein. Quadr. p. 51.*

Lepus. *Raj. Syn. Quadr. p. 204.*

Gefn. Quadr. Fig. p. 681. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 104. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. Dig. Piv. p. 347.

Jonst. Quadr. p. 109. Fig. T. 65. (Fig. bona).

Mus. Worm. p. 321.

Charlet. Exer. p. 23.

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 219.

Rac. aut. p. 311.

Lièvre. *Kolbe. Tom. III. p. 62.*

Les François appellent le mâle LIÈVRE; la femelle, HASE; le jeune, LIÈVRAUT.

Les Hébreux l'appellent ARNEBET. *Gefn. Aldro.*

Les Chaldéens, ARNEBA. *Gefn. Aldro.*

Les Grecs, ΛΑΓΟΣ.

Les Arabes, ERNAB. *Gefn. Aldro.*

Les Sarrafins, ARNEPH. *Gefn. Aldro.*

Les Perses, KARGOS. *Gefn. Aldro.*

Les Espagnols, LIÈBRE. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, LEPRE, ou LIÈVORA. *Gefn. Aldro.*

Les Illyriens, ZAGICZ. *Gefn. Aldro.*

Les Allemands, HASE, ou HAAR. *Gefn. Aldro. HASE. Rac.*

Les Polonois, ZALAC. *Rac.*

Les Suédois, HARE. *Linn.*

Les Anglois, HARE. *Raj. Gefn.*

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 1 pied 9 pouces; le tour de son corps est d'environ 14 pouces. Sa tête est oblongue, & a depuis les narines jusqu'à l'occiput 3 $\frac{1}{2}$ pouces; ses oreilles 4 pouces; sa queue 2 $\frac{1}{2}$ pouces, & est noire en dessus, & blanche en dessous. Sa lèvre supérieure est fendue:

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, circiter 1 pedis & 9 pollicum; ambitus circiter 14 pollicum. Caput habet oblongum, à naribus ad occipitium 3 $\frac{1}{2}$ pollices longum; auriculas 4 pollices; caudam suprâ nigram, infrâ albicantem, 2 $\frac{1}{2}$ pollicibus

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 139

longam; labium superius fissum; oculos magnos; crura posteriora anterioribus longiora; in pedibus anterioribus digitos 5, in posterioribus 4, omnes validis unguibus munitos; plantam pedum villosam. Totum corpus vestitur pilis mollibus & densis, ex cinereo rufis, excepto in ventre, ubi albicans. Habitat in totâ Europâ.

ses yeux sont grands; ses jambes de derrière plus longues que celles de devant. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière, tous armés d'ongles forts; le dessous des pieds velu. Tout son corps est couvert de poils doux & épais, variés de roux & de gris, excepté sous le ventre, où ils sont blancs. On le trouve dans toute l'Europe.

** 2. LE LIÈVRE BLANC.

Lepus caudatus, planè candidus... **LEPUS ALBUS.**

Lepus albusissimus, toto nitens in corpore candor. Klein. Quadr. p. 51.

Lepus albus. Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 349.

Lepus candidus. Jonst. Quadr. p. 111.

Æstate præcedenti simillimus est; hieme verò in toto corpore candidus. Habitat in Alpibus & Septentrionalibus regionibus.

Il ressemble au précédent pendant l'été; & l'hiver il est tout blanc. On le trouve dans les Alpes, & dans les Pays du Nord.

3. LE LIÈVRE NOIR.

Lepus caudatus, planè niger... **LEPUS NIGER.**

Lepus niger. Klein. Quadr. p. 52.

Lepus planè niger. Mus. Worm. p. 322.

A *Lepore vulgari* non differt, nisi quod totus sit niger, exceptis pedum extremitatibus, quæ ad cœruleum tendunt.

Il ne diffère du Lièvre ordinaire qu'en ce qu'il est tout noir, excepté l'extrémité des pieds, qui est bleuâtre.

** 2 LE LAPIN DE NOTRE PAYS.

Lepus caudatus, obscurè cinereus... CUNICULUS NOSTRAS.

- *Lepus caudatus* abrupta, pupillis rubris. Cuniculus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.*
19. sp. 3.
Faun. Suec. Linn. N° 20.
- Lepusculus* : Cuniculus, terram fodiens. *Klein. Quadr. p. 52.*
- Cuniculus. *Raj. Syn. Quadr. p. 205.*
Gesn. Quadr. Fig. p. 394. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 105. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 382. Fig. p. 385. (Fig. bona).
Jonst. Quadr. p. 111. Fig. T. 65. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 23.
Rzac. Hist. Nat. Rod. p. 240.
- Lapin. *Kolbe. Tom. III. p. 62.*
- Les Hébreux l'appellent SAPHAN. *Gesn. Aldro.*
- Les Chaldéens, THAPSA. *Gesn.*
- Les Grecs, *ἀρρίνι.*
- Les Arabes, VEBAR. *Gesn.*
- Les Perses, BESANGERAH. *Gesn.*
- Les Espagnols, CONEJO. *Gesn. Aldro.*
- Les Italiens, CONIGLIO. *Gesn. Aldro.*
- Les Illyriens, KRALIK, ou KROLYK. *Gesn. Aldro.*
- Les Allemands, KUNIGLE; KÜNELE; KÜNLEIN. *Gesn. Aldro.*
- Les Polonois, KROLIK. *Rzac.*
- Les Suédois, KANIN. *Linn.*
- Les Flamands, KONIJN. *Charlet.*
- Les Anglois, RABIT, ou CONY. *Raj. Gesn. Aldro.*
- Les François appellent le jeune LAPREAU.

Il ressemble au Lièvre par la forme du corps; mais il est plus petit. Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, 1 $\frac{1}{2}$ pied: le tour de son corps est d'environ 1-pied. Sa tête a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 3 $\frac{1}{2}$ pouces; ses oreilles autant; sa queue, qui est noire en dessus & blanche en dessous, 2 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a, comme le Lièvre, la lèvre supérieure fendue; les

Forma corporis externa
Leporem vulgarem refert; sed illo minor est. Ab extremitate rostri ad caudæ initium, 1 pede longus est: ambitus corporis 1 circiter est pedis. Caput, à naribus ad occipitum, 3 $\frac{1}{2}$ pollices longum; auriculæ totidem; cauda, quæ suprà nigra est infrà candida, 2 pollices longa. Labium superius habet, ut in *Lepore*,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 148

assum; oculos magnos; etura posteriora anterioribus longiora; in pedibus anterioribus digitos 5, in posterioribus 4; plantas pedum villosas. Per universum corpus vestitur pilis mollibus & densis, ex cinereo fuscis, excepto ventre, in quo albicant. Habitat in totâ Europâ. yeux grands; les jambes de derrière plus longues que celles de devant; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière; le dessous du pied velu. Tout son corps est couvert de poils doux & épais, variés de brun & de gris, excepté sous le ventre, où ils sont blancs. On le trouve en toute l'Europe.

** 5. LE RICHE.

Lepus caudatus, dilutè cinereus.

Colore à précédente differt: pilis dilutè cinereis per universum corpus vestitur. Ex museo Realmuriano. Il diffère du précédent par sa couleur: tout son corps est couvert de poils d'un très joli petit-gris. Il est dans le Cabinet de M. de Reaumur.

** 6. LE LAPIN D'ANGORA.

Lepus caudatus; pilis tenuissimis & longissimis toto corpore vestitus... CUNICULUS ANGORENSIS.

Pilis tenuissimis & longissimis ab aliis hujus generis speciebus distinguitur. Habitat in Angora. Ex museo Realmuriano. Il diffère des autres espèces de son genre par la longueur & la finesse de ses poils. On le trouve à Angora, d'où il a été apporté à M. de Reaumur.

7. LE LIÈVRE DU BRÉSIL.

Lepus caudatus... *LEPUS BRASILIENSIS*.

Lepus caudatus nullâ: Linn. syst. nat. ed. 6. g. 19. sp. 1.
Cuniculus Brasiliensis Tapeti dictus. Râp. Syn. Quadr. p. 103.
Tapeti Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. p. 223. Fig. p. 224. (Fig. bonâ, si caudam non haberes).
Tapeti. Pison. Hist. Nat. Fig. p. 102. [Fig. eadem ut supra].
Cavia Cobaya, Cuniculi Brasiliensis species. Jonst. Quadr. Fig. T. 63. (Fig. eadem).

Il ressemble à notre *Lièvre* par la forme du corps : il est de la même couleur ; cependant un peu plus brun. Il a un peu de roux sur le front ; & la gorge, la poitrine, & le ventre sont blancs. Quelques uns ont un cercle blanc autour du col. Il n'a point de queue. On le trouve au *Brésil*.

Quoad formam corporis externam *Lepori vulgari* similis est : iisdem ac ille pilis & colore, sed paulò fuscior. In fronte rufescit paululum ; sub gutture, pectore, & ventre albicat. Quidam circulum album habent circa collum. Caret caudâ. Habitat in *Brasilid*.

XXIII.

Le Genre du Lapin.

Son caractère est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants sur le corps :
La queue très courte, ou point de queue :
Les oreilles courtes, ou point d'oreilles.

XXIII.

Genus Cuniculi.

Hujus character est
Dentes incisores in utràque maxillâ duo :
Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis distinctum :
Cauda brevissima, vel nulla :
Auriculæ breves, vel nullæ.

I. LE LAPIN DE JAVA.

Cuniculus caudatus, auritus, rufescens, fusco admixto. : CUNICULUS JAVENSIS.

Cavia Javensis. Klein. Quadr. p. 50.
Lièvre de Java. Cat. App. Fig. p. 18. [Fig. bonne].

Il est de la grosseur d'un *Lièvre*. Il a la tête petite à proportion du corps ; les yeux grands & fortants ; les oreilles semblables à celles d'un *Rat* ; toute la partie postérieure du corps grosse & épaisse ; les jambes longues. Tout son corps est couvert d'un

Leporis magnitudinem attingit. Caput habet pro mole corporis parvum ; oculos magnos & prominentes ; aurículas auriculis *Murinis* similes ; posteriorem corporis partem crassam ; crura longa. Per universum corpus

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XII.* 143

vestitur pilis rufescentibus, poil rousâtre, mêlé d'un peu de paululum fusco admixto. In pedibus anterioribus 4 digitis, exteriore brevissimo, in posterioribus verò tribus tantum donatur. Habitat in Java & Sumatra.

** 2. L' AGOUTY.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis, rigidis vestitus.

Cuniculus omnium vulgarissimus, Aguti vulgò. *Barr. Hist. Fr. eq. p. 153.*
Mus sylvestris Americanus Cuniculi magnitudine, Porcelli pilis & voce.
Raf. Syn. Quadr. p. 226.

Cavia Aguti, vel Acuti Brasiliensibus. *Klein. Quadr. p. 50.*

Aguti, vel Acuti Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 224. [Fig. bona].*

Aguti, vel Acuti, Cuniculi Brasiliensis species. *Jonst. Quadr. Fig. T. 6; [Fig. bona].*

Acuti, sive Agouti. *Jo. de Lact. p. 551.*

Aguti. *Pison. Hist. nat. Fig. p. 101. (Fig. bona).*

Les Brasiliens l'appellent vulgairement COTIA. *Marcgr. Pison.*

Les Habitans de la Guiane, AGOUTY. *Barr.*

Magnitudine & formâ Cuniculum nostratam æmulatur; forme de notre Lapin; mais il a les oreilles rondes & courtes; le museau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la supérieure; la lèvre supérieure fissum; oculos nigros; caudam brevissimam, & serè glabram; crura anteriora posterioribus paulò breviora. In pedibus anterioribus 4 habet digitos, in posterioribus 3 tantum, acutis unguibus munitos. Per universum corpus vestitur pilis rigidis, splendidibus, ex rufo & fusco mixtis, cum pauxillo

Il est de la grandeur & de la forme de notre Lapin; mais il a les oreilles rondes & courtes; le museau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la supérieure; la lèvre supérieure fendue; les yeux noirs; la queue extrêmement courte, & presque sans poils; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derrière. Il a aux pieds de devant 4 doigts, & 3 à ceux de derrière, armés d'ongles aigus. Tout son corps est couvert de poils rudes au toucher, brillants, mêlés de roux & de brun avec un peu de noir

sur le dos, & un peu plus jaunâtres sous le ventre. On le trouve dans la Guiane & au Brésil. *nigro in dorso; in ventre autem magis flavescens. Habitat in Guiana & Brasilia.*

3. LE LAPIN D'AMERIQUE.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis rufis rigidis vestitus... CUNICULUS AMERICANUS.

Cuniculus Americanus. Seb. Vol. I. p. 67. Fig. T. 41. F. 2. (Fig. bona). Cavia Surinamensis. Klein. Quadr. p. 50.

Il est un peu plus petit que notre Lapin. Il a les oreilles courtes & rondes; la tête grosse; le col long; & la queue très courte. Ses pieds sont fendus en 4 doigts, armés d'ongles pointus & recourbés. Tout son corps est couvert de poils roux, rudes, & picquants comme des soies, surtout ceux du dos. On le trouve en Amérique. *Nostrate Cuniculo paulo minor est. Auriculas habet breves & rotundas; caput crassum; collum longum; caudam brevissimam. Pedes in 4 fissi sunt digitos, acutis & incurvis unguibus munitos. Totum corpus tegitur pilis rufis, rigidis, setarum instar, pungentibus, præcipue per dorsum. Habitat in America.*

** 4. LE PAK.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis obscure fulvis, rigidis, lineis exalbo flavescens ad latera distinctis... PAKA.

Cuniculus major palustris, fasciis albis notatus. Barr. Hist. Fr. eq. p. 151. Mus Brasiliensis magnus Porcelli pilis & voce, Paka dictus, Marcgravii. Raj. Syn. Quadr. p. 226.

Cavia Paka Marcgravii. Klein. Quadr. p. 50.

Paka Brasiliensis. Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 224. (Fig. bona).

Paka Cuniculi Brasiliensis species. Jonst. Quadr. p. 112. Fig. T. 63. [Fig. bona].

Paka. Pison. Hist. nat. Fig. p. 101. (Fig. bona).

Jo. de Laet. p. 551.

Les Habitans de la Guiane l'appellent OURANA, & PAK. Barr.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium;

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 145.

initium, 1 circiter pedis est; caput, à naribus ad occipitum, 4 pollices longum, crassum; maxilla inferior superiore brevior. Barbam habet prolixam *Leporinam*; aurículas breves & acutas; caudam brevissimam; crura anteriora posterioribus paulò breviora; in singulis pedibus digitos 5, quorum interior pedum anteriorum minimus est, & ab aliis 4 remotus: posteriorum pedum digiti 3 intermedii majores, exterior parvus, & à 3 intermediis parumper remotus, interior verò minimus, à 3 intermediis adhuc remotior. Totum corpus vestitur pilis brevibus, rigidis, supernè obscurè fulvis, tribus lineis longitudinalibus ex albo flavescens, ad latera distinctis, infernè verò ex albo flavescens. Habitat in *Guianâ* & *Brasilâ*.

1 pied de long : sa tête est grosse, & a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 4 pouces : sa mâchoire inférieure est plus courte que la supérieure. Il a une grande barbe de *Lièvre* ; des oreilles pointues, & tres courtes, ainsi que sa queue ; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derriere ; 5 doigts à chaque pied, dont l'intérieur des pieds de devant est tres petit, & articulé plus haut que les 4 autres : les 3 doigts du milieu des pieds de derriere sont les plus grands, l'extérieur est petit, & articulé un peu plus haut que les 3 du milieu, l'intérieur est encore plus petit, & articulé plus haut que l'extérieur. Son corps est couvert de poils courts, rudes au toucher, d'un fauve foncé en dessus, avec de chaque côté 3 bandes étroites longitudinales d'un blanc jaunâtre, & en dessous de ce même blanc jaunâtre. On le trouve dans la *Guiane* & au *Brésil*.

5. LE LAPIN DE NORVEGE.

Cuniculus caudatus, auritus, ex flavo, rufo & nigro variegatus... CUNICULUS NORVEGICUS.

Mus caudâ abruptâ, corpore fulvo nigroque vario. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 2.

Faun. Suec. Linn. N^o. 26.

Mus Lettingus, Norvagicus, Olai magni, Wormii Musei. Klein. Quadr. p. 58.

Mus Norvagicus, valgè Leming, Wormii Musei. Raf. Syn. Quadr. p. 217.

T.

Mus. Worm. p. 322. Fig. p. 325. [Fig. opsinâ].

Mus Norvegicus. Charlet. Exer. p. 15.

Leem. Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 436.

Jonst. Quadr. p. 116.

Les Suédois l'appellent FIKILMUS, SABELMUS. Linn.

Les Lapons, LUMMICK. Linn.

Il ressemble à un Rat par la forme du corps ; mais il en diffère en ce qu'il a la queue extrêmement courte, & couverte de poils. Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 5 pouces de long. Son museau est pointu ; ses yeux sont petits & noirs ; ses oreilles courtes, obtuses, & un peu inclinées vers le dos. Il a autour du museau des poils longs & roides, qui lui font une espèce de moustache. Ses jambes de devant sont beaucoup plus courtes que celles de derrière : il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles aigus & recourbés, dont le milieu est plus long que les autres, qui sont d'autant plus courts qu'ils en sont plus éloignés. La couleur de son poil est variée de noir, de jaune & de roux : la partie antérieure de sa tête est noire ; le sommet est jaune ; le col & les épaules noires ; le reste du corps est roux, marqué de quelques taches noires de différentes figures ; le ventre est d'un blanc jaunâtre : l'ordre, la figure, & la grandeur des taches varient dans les différents individus. Il a en tout 16 dents ; sca-

Formâ corporis *Rattum* representat ; ab eo tamen differt cauda brevissimâ & pilosâ. Longitudo corporis, ab extremitate oris ad caudæ initium, est 5 circiter pollicum. Os habet acuminatum ; oculos parvos, nigros ; aurículas breves, & obtusas, paululum in dorsum reclinantes. Oscingunt pili multi longi & rigidi, mystacis instar. Crura anteriora posterioribus multo sunt breviora : pedes singuli 5 præditi sunt digitis, acutis & incurvis unguibus munitis, quorum medius longissimus, reliquis utrinque ab hac longitudine eo magis discedentibus, quò magis sunt à medio remoti. Pilorum color ex nigro, flavo, & rufo variegatur : capitis pars anterior nigricat ; vertex flavescit ; hinc collum & scapulæ nigrae ; corpus reliquum rufescit, intermixtis quibusdam maculis nigris variis figurarum ; venter est albicans ad flavedinem tendens : in variis autem individuis macularum ordo figura, & magnitudo variant. 16

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XII. 147
 dentibus donatur, 4 scilicet voir 4 incisives, 2 à chaque mâ-
 incisoribus, 2 in utrâque ma- choire, & 12 molaires, 6 à
 xillâ, & 12 molaribus, 6 chaque mâchoire, 3 de chaque
 etiam in utrâque maxillâ, 3 côté. On le trouve en Norvege,
 utrinque. Habitat in Norve- & en Laponie.
 giâ & Laponia.

6. LE LAPIN D'ALLEMAGNE.

Cuniculus caudatus, auriculis nullis, cinereus... CUNICULUS
 GERMANICUS.

Mus caudâ brevi, capite inauri. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 3.*

Mus Noricus, vel Citellus. *Raj. Syn. Quadr. p. 220.*

Klein. Quadr. p. 56. Not. 48.

Gefn. Quadr. p. 835.

Gefn. Icon. Quadr. p. 113.

Mus Noricus Agricola. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 235.*

Rzac. aut. p. 327.

Mus Citellus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 436.*

Les Allemands l'appellent ZYSEL. *Gefn. Aldro. ZIESEL. Rzac.*

Les Bohémiens, SISEL. *Rzac.*

Les Polonois, SUSEL. *Rzac.*

Corpus habet, ut *Muste-* Il a le corps long & effilé ;
la vulgaris, longum & tenue. comme la *Belette*. Il n'a point
 Caret auriculis ; sed non caret d'oreilles ; mais il a, à leur place,
 foraminibus, quibus sonum recipit. Caudâ brevissimâ donatur. Color pilorum tend. Sa queue est tres courte.
 cinereus est. Habitat in *Bohe-* La couleur de son poil est grise.
miâ, Austrid, Hungariâ, & On le trouve en *Bohême*, en
Poloniâ. *Austriche*, en *Hongrie*, & en
Pologne.

** 7. LE LAPIN DES INDES.

**Cuniculus ecaudatus, auritus, albus aut rufus, aut ex utroque
 variegatus...** CUNICULUS INDICUS.

Cuniculus Indus. *Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 106.* [*Fig. sat bona, si tantum
 numerum digitorum non haberet.*]

Cuniculus Indicus. *Jonst. Quadr. Fig. T. 63.* [*Fig. sat bona.*]

Euf. Nuremb. Fig. p. 160. (Fig. Gefneri).

Porcellus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p. 391.* [*Fig. Gefneri*],
Jonst. Quadr. p. 112. Fig. T. 64. (Fig. bona).

Rac. aut. p. 333.

Porcellus Indicus, sive Guineensis. *Charlet. Exer. p. 24.*

Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 1.*

Mus, seu Cuniculus Americanus & Guineensis, Porcelli pilis & voce, *Cavia Cobaya* Brasiliensibus dictus, *Marcgravi. Raj. Syn. Quadr. p. 223.*

Cavia Cobaya Brasiliensibus : quibusdam Mus Pharaonis ; Tata pilosus ,

Porcellus, Mus Indicus. *Klein. Quadr. p. 49.*

Cavia Cobaya Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 224. (Fig. sat bona)*

Cavia Cobaya. *Pison. Hist. Nat. Fig. p. 101. (Fig. sat bona).*

Les François l'appellent COCHON D'INDE.

*Les Allemands, INDIANISCH KÜNELE, ou INDISCH SEÜLE. Gysa. MZER-
 FERCKEL ; MEER-SCHWEIN. Rac.*

Les Polonois, SWINKA ZAMORSKA. Rac.

Les Suédois, MARSWIN. Linn.

Les Anglois, GUINY PIG. Raj.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, $9\frac{1}{2}$ pouces ; depuis les narines jusqu'à l'occiput, 2 pouces 4 lignes : le tour de son corps est de 8 pouces. Il a la lèvre supérieure fendue, comme le Lièvre ; l'ouverture de la bouche petite ; les oreilles courtes, rondes, ouvertes, transparentes, & presque dénuées de poils ; les jambes courtes : il ne paroît point de queue. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 3 à ceux de derrière. Ses poils sont doux au toucher : leur couleur est différente dans différents individus : les uns sont tout à fait blancs ; d'autres tout à fait roux ; d'autres variés de blanc & de roux ; quelques uns ont des taches noires. On le trouve en Europe dans les maisons, en Guinée, & au Brésil.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad anum usque, $9\frac{1}{2}$ pollicum ; ambitus 8 pollicum ; caput, à naribus ad occipitium, 2 pollices cum 4 lineis longum. Labium superius, ut in Lepore ; fissum est ; oris rictus parvus ; auriculæ breves, subrotundæ, patulæ, pellucidæ, & glabræ sætè ; crura breviora ; caudæ vestigium nullum. Pedes anteriores in 4, posteriores vero in 3 digitos divisi. Pili ad tactum molles : color in individuis variis varius : alia omnino alba sunt ; alia omnino rufa ; alia ex albo & rufo variegata ; quædam ex nigro maculata. Habitat in Europæ domesticus, in Guinæa, & Brasiliâ.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 142

8. LE LAPIN DU BRÉSIL.

Cuniculus ecaudatus, auritus, ex cinereo rufus... CUNICULUS BRASILIENSIS.

Cuniculus Brasiliensis, *Aperca* dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 206.*

Cuniculus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p. 393. (Fig. bona).*

Cavia *Aperca. Klein. Quadr. p. 50.*

Aperca, Cuniculi species. *Jonst. Quadr. Fig. T. 63. [Fig. bona].*

Aperca Brasiliensis. Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 213. (Fig. bona).

Aperca. Pison. Hist. Nat. Fig. p. 103. (Fig. bona).

Les Flamands l'appellent VELDRATTE; ou BOSCRATTE. Marcgr.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad anum usque, 1 est circiter pedis diameter 7 digitorum. Barbam habet *Leporinam*; labium superius fissum; auriculas breves & subrotundas. caret caudâ. Crura anteriora 3 circiter digitos longa sunt; posteriora paulò longiora. 4 habet in pedibus anticis digitos unguibus parvis munitos, in posterioribus 3, quorum medius reliquis longior. Color totius corporis, excepto ventre, in quo albicat, *Leporinus*. Habitat in *Brasiliâ*.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, environ 7 pieds : le diamètre de son corps est de 7 doigts. Il a, comme le Lièvre, une moustache, & la lèvre supérieure fendue. Ses oreilles sont courtes & rondes. Il n'a point de queue. Ses jambes de devant ont environ 3 doigts de long, & celles de derrière un peu plus. Il a 4 doigts aux pieds de devant, armés de petits ongles, & 3, à ceux de derrière; dont le milieu est le plus long. La couleur de ses poils, exceptez ceux du ventre, qui sont blancs, est la même que celle de nos Lièvres ordinaires. On le trouve au Brésil.

XXIV.

Genus *Sciuri*.

Hujus caractere est
Dentes incisores in utraque
maxillâ duo;

XXIV.

Le Genre de l'Ecureuil.

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives à
chaque mâchoire.

T iij.

Point de dents canines :	Canini nulli :
Les doigts onguiculés :	Digiti unguiculati :
Point de picquants sur le corps :	Corpus aculeis destitutum :
La queue longue , & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît plate.	Cauda longa , vestita pilis ita dispositis ut caudam planam efficiant.

** 1. L'ECUREUIL.

Sciurus rufus, quandoque griseo admixto... *SCIURUS VULGARIS*.

Sciurus palmis folis saliens. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 18. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 21.

Sciurus vulgaris. Raj. Syn. Quadr. p. 214.

Sciurus vulgaris rubicundus. Klein. Quadr. p. 53.

Sciurus. Gessn. Quadr. p. 955. Fig. p. 956. (Fig. bona).

Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 110. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 396. Fig. p. 398. [Fig. sat bona].

Jonst. Quadr. p. 113. Fig. T. 66. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 24.

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 224.

Rac. aut. p. 320.

Pirolus, Spiritosus, Scurulus quorundam. Klein.

Les Grecs l'appellent ΣΟΥΡΙ.

Les Espagnols, HARDA, ou ESQUILO. Gessn. Aldro.

Les Italiens SCHIRIVOLO. Gessn. SCHIRATO, ou SCHIRATOLO. Aldro.

Les Allemands, EYCHORN, ou EYCHORN, ou EICHHERMLIN. Gessn. Aldro.

Rac.

Les Illyriens, WEWERKA. Gessn. Aldro.

Les Polonois, WIEWYORKA. Gessn. Aldro. Rac.

Les Suédois, IKORN. Linn.

Les Anglois, SQUIRRELL. Gessn. Aldro.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, $7\frac{1}{2}$ pouces : sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 2 pouces ; sa queue de 8 pouces. Ses oreilles sont courtes & couvertes de poils très longs. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, tous armés

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudam usque, $7\frac{1}{2}$ pollicum ; capitis, à naribus ad occipitum, 2 pollicum ; caudæ 8 pollicum. Auriculæ breves sunt & pilis longissimis ornatæ. 4 sunt in pedibus anterioribus digitis, in posterioribus verò 5, om-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 151

Les ongles longs, incurvés, & acutis unguibus muniti: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevissimus & obtusus. Univerfum corpus, exceptis gutture & ventre albicantibus, vestitur pilis omnino rufis, vel cum paucis griseo admixto. Caudam habet pilis longissimis ornatam, quâ suprà dorsum reflexâ, se tegit & inumbrat. Habitat in Europâ.

d'ongles longs, recourbés, & aigus: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle très court & obtus. Tout son corps est couvert de poils roux, ou d'un roux mêlé de gris, exceptez la gorge & le ventre, qui sont blancs. Sa queue est ornée de poils très longs; & lorsqu'il la relève par dessus son dos, elle lui couvre tout le corps. On le trouve en Europe.

* 2. L'ECUREUIL BLANC DE SIBÉRIE.

SCIURUS ALBUS, SIBERICUS.

Sciurus vulgarem magnitudine circiter aquat: ab eo autem differt colore, qui per univerfum corpus albus est. Habitat in Siberia. Ex museo Realmuriano.

Il est à peu près de la grandeur de l'Écureuil ordinaire: il en diffère en ce qu'il est tout blanc. On le trouve en Sibérie, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur.

3. L'ECUREUIL NOIR.

SCIURUS NIGER.

Sciurus niger. Klein. *Quadr.* p. 53.

Quaubtechallori. Fern. *Hist. N. Hysp.* p. 8.

Quaubtechallori Thilic. *Sciurus Mexicanus*. Hernandez. *Hist. Mex.* Fig. p. 582. (Fig. sat bona).

Quaubtechallori Thilic, sive Thilocorequissini dictus. Joss. *Quadr.* p. 113.

Écureuil noir. Cat. Tom. II. Fig. p. 73. [Fig. très bonne].

Præcedentes magnitudine superat: ab eis etiam colore differt: multo sunt omnino nigri; alii vel naso, vel pedibus, vel caudæ apice, vel

Il est plus grand que les précédents: il en diffère encore par sa couleur: plusieurs sont tout noirs; quelques uns ont le nez blanc; d'autres les pieds; d'au-

tres le bout de la queue; d'autres denique torque albis donant
ont un collier blanc. On le tur. Habitat in Mexico.
trouve au Mexique.

4. L'ECUREUIL VARIÉ.

Sciurus ex candido cinereus... SCIURUS VARIUS.

Sciurus varius, *Varus* vulgò dictus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 403. Fig. p. 405. (Fig. sat bona).*

Sciurus Scythicus. *Gefn. Icon. Quadr. p. 111.*

Sciurus, live Mus Ponticus. *Charlet. Exer. p. 14.*

Mus Ponticus, seu Venerus, vulgò Varius. *Gefn. Quadr. Fig. p. 839. (Fig. bona).*

Rzac. Aud. p. 318.

Mus Ponticus, Varius dictus. *Jonst. Quadr. p. 113.*

Mus Laticus Mathioli. *Aldro. Jonst.*

Les Italiens l'appellent VARE. *Gefn.*

Les Allemands, FECH, ou VEC. *Gefn. Aldro. GRAU-WERCK. Rzac.*

Les Polonois, POWIELIZA. *Aldro. Jonst. Rzac.*

Il ressemble à l'Ecureuil ordinaire par sa grandeur & sa figure; mais il en diffère par sa couleur, qui est variée de blanc & de gris, & par les poils de sa queue, qui ne sont pas si longs. On le trouve en Europe.

Magnitudine & figurâ Sciurum vulgarem æmulatur; ab eo autem differt colore, qui in candido cinereus est, & caudâ non adeo amplâ. Habitat in Europâ.

** 5. L'ECUREUIL D'AMERIQUE.

Sciurus obscurè cinereus... SCIURUS AMERICANUS.

Sciurus caudâ teretiusculâ, auribus subrotundis, nudis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 18. sp. 3.*

Sciurus Americanus. *Klein. Quadr. p. 54.*

Seb. Vol. I. p. 78. Fig. T. 48. F. 5. (Fig. optima).

Il est un peu plus petit que l'Ecureuil ordinaire: il en diffère encore par sa couleur, qui est un gris obscur dans la partie supérieure du corps, & un gris blanc dans la partie inférieure; & par

Sciuro vulgari magnitudine cedit: ab eo etiam differt colore, qui obscurè cinereus est in parte corporis superiore, in inferiore verò ex cinereo albus; & pilis caudæ brevioribus,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 153
 brevioribus, & ad rufum ac- les poils de la queue, qui sont
 cedentibus. Habitat in Ame- plus courts, & un peu rous-
 ricâ. tres. On le trouve en Amerique.

** 6. L'ECUREUIL DE VIRGINIE.

Sciurus cinereus, auriculis ex albo flavicantibus.. SCIURUS
 VIRGINIANUS.

Sciurus Virginianus cinereus major. Raj. Syn. Quadr. p. 215.

Klein. Quadr. p. 53.

Grand Ecureuil gris. Cat. Tom. II. Fig. p. 74. [Fig. bonne].

Les Anglois l'appellent GREAT GREY VIRGINIA SQUIRREL, Raj.

Longitudo corporis, ab
 extremitate rostri ad caudæ
 initium, 11 circiter pollicum.
 Corpus habet & membra cor-
 pore & membris Sciuri vulga-
 ris crassiora; caput & auricu-
 las breviores; 4 in pedibus
 anterioribus digitos, in poste-
 rioribus verò 5; auriculas
 intus nudas, extus verò pilis
 ex albo flavicantibus vesti-
 tas. Partes corporis superior
 & crurum exterior sunt cine-
 rez; corporis verò inferior &
 crurum interior ex cinereo
 candidæ: diversi illi colores
 separantur tenuis longitudi-
 nalibus rufis, in lateribus
 utrinque sitis. Cauda, quæ
 vestitur pilis longissimis cine-
 reis, versùs extremum ex
 nigro & albo variis, in dor-
 sum reflexa, totum corpus
 cooperit. Habitat in Virginid
 & Carolinâ.

La longueur de son corps;
 depuis le bout du museau jus-
 qu'à la queue, est d'environ 11
 pouces. Il a le corps & les mem-
 bres plus épais que nos Ecureuils
 ordinaires; la tête & les oreilles
 plus courtes; 4 doigts aux pieds
 de devant, & 5 à ceux de der-
 rière. Ses oreilles sont nuës in-
 térieurement, & extérieurement
 couvertes de poils d'un blanc
 jaunâtre. La partie supérieure
 de son corps, & l'extérieur de
 ses jambes sont d'un joli gris; la
 partie inférieure du corps, &
 l'intérieur des jambes d'un gris
 blanc: une bande rousse s'étend
 de chaque côté selon leur lon-
 gueur, & sépare ces deux cou-
 leurs. Sa queue est revêtue de
 très longs poils gris, variés de
 noir & de blanc vers leur extré-
 mité; & lorsqu'elle est relevée
 vers le dos, elle couvre tout le
 corps. On le trouve à la Virginie
 & à la Caroline.

7. L'ECUREUIL DU BRÉSIL.

Sciurus coloris ex flavo & fusco mixti, taniis in lateribus albis...
SCIURUS BRASILIENSIS.

Sciurus Brasiliensis. *Mægr. Hist. Br. p. 230.*

Il est de la grandeur & de la figure de l'Ecureuil ordinaire. Sa queue est aussi longue que son corps, & lorsqu'elle est relevée vers le dos, elle peut le couvrir entièrement. Il a la prunelle de l'œil bleuâtre; les oreilles courtes & rondes; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, tous armés d'ongles longs & aigus, dont ceux du milieu sont plus longs que les autres: à la place du pouce; qui manque aux pieds de devant, est un petit ongle noir. La couleur de tout son corps, exceptez la gorge & le ventre, qui sont blancs, est mêlée de jaune pâle, & de brun: il a outre cela de chaque côté une bande étroite longitudinale blanche. Sa queue est revêtue de longs poils variés de noir & de blanc. On le trouve au Brésil.

Longitudine & figurâ *Sciurum vulgarem* æmulatur. Caudam habet ejusdem cum corpore longitudinis, quâ in dorsum reflexâ, corpus cooperiri potest; oculorum pupillam cœrulescentem; aurículas breves & obrotundas; 4 in anterioribus pedibus digitos, in posterioribus 5, omnes longis & acutis unguibus munitos, quorum mediis reliquis longiores: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est parvulus & niger. Color totius corporis, exceptis gutture & ventre albis, est expallidè flavo, & fusco mixtus: in utroque latere taniam habet longitudinalem albam. Cauda pilis longis vestitur ex nigro & albo mixtis. Habitat in *Brasiliâ*.

8. L'ECUREUIL DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Sciurus obscurè cinereus, taniis in dorso albicantibus... SCIURUS NOVÆ HISPANIÆ.

Sciurus rarissimus, ex Novâ Hispaniâ, taniis albis. *Klein. Quadr. p. 534. Sch. Vol. I. p. 76. Fig. T. 47. Mus. F. 2. Fam. F. 3. (Fig. bonis).*

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 155

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, $5\frac{1}{2}$ circiter pollicum : cauda longitudine corpus antecellit. Auricularum ambitus pilis destituitur. Color totius corporis, exceptis ore & inferiore corporis parte cinereis, est obscurè *Murinus*. Dorsum albicantes 7 in mare, tantum in feminâ percurrunt tæniæ longitudinales, indè & per caudam quoque, quæ longis diffusisque pilis tegitur, extensa : harum albedinem nigricantes pili intermixti variegant. Habitat in *Novâ Hispaniâ*.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ $5\frac{1}{2}$ pouces : sa queue est plus longue que tout son corps. Le contour de ses oreilles est dénué de poils. Sa couleur, exceptez son museau & la partie inférieure de son corps, qui sont d'une couleur cendrée, est un gris de *Souris* foncé. Le mâle a sur le dos 7, & la femelle seulement 5 bandes longitudinales blanchâtres, entremêlées de poils presque noirs : ces bandes s'étendent aussi sur la queue, qui est garnie de grands poils clair semés. On le trouve dans la *Nouvelle Espagne*.

9. L'ECUREUIL DE LA CAROLINE.

Sciurus rufus, tæniis in dorso nigris, tæniis ex albo flavicantibus intermixtis... *SCIURUS CAROLINENSIS*.

Sciurus striatus. Klein. Quadr. p. 53.

Sciurus Lysteri. Raf. Syn. Quadr. p. 216.

Ecureuil de Terre. *Cat. Tom. II. Fig. p. 75. (Fig. bonne).*

Dimidio minor est *Sciuro vulgari*. Oculos habet magnos & nigros ; auriculas obrotundas : cauda pilis, quàm in aliis speciebus multò brevioribus, & rufis vestitur : corpus ejusdem coloris est. In medio dorso tænia longitudinalis extenditur nigra, & insuper in utroque latere duæ tæniæ etiam nigre, tertiâ tæniâ ex albo flavicante in

Il est plus petit de moitié que l'*Ecureuil ordinaire*. Il a les yeux grands & noirs ; les oreilles arrondies ; les poils de la queue beaucoup plus courts que dans les autres especes, & roux, ainsi que ceux du corps : il a en outre une bande longitudinale noire placée sur le milieu du dos ; & de chaque côté deux autres de même couleur, entre lesquelles est une troisième bande d'un

blanc jaunâtre: On le trouve. *illis inclusâ. Habitat in Caro-*
dans les bois de la *Caroline, &c. line & Virginia sylvis.*
de la *Virginie.*

**** 10. L'ECUREUIL PALMISTE, vulgairement, RAT
PALMISTE..**

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tænis in dorso flavican-
tibus... SCIURUS PALMARUM; MUS PALMARUM vulgò.

Mustela Africana. Raj. Syn. Quadr. p. 216..

Clus. Exot. Fig. p. 112. [Fig. sat bona].

Jonst. Quadr. p. 105..

Euf. Nieremb. Fig. p. 171. (Fig. sat bona).

Au Mus Indicus arboreus striatus ? Raj. Syn. Quadr. p. 230?

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 5 pouces : sa tête a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 1 pouce 5 lignes de long ; & sa queue environ 6 pouces, & se termine en pointe. Ses oreilles sont courtes & arrondies. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière: Tous les poils de son corps sont variés de roux & de noir ; ceux de sa queue de noir & de jaunâtre en dessus, & en dessous ils sont d'un jaune roux, ayant de chaque côté 2 bandes étroites longitudinales noires, & terminées par une bande longitudinale blanchâtre: il a aussi sur le dos 3 bandes jaunâtres, qui s'étendent dans toute sa longueur, sçavoir une de chaque côté, & l'autre au milieu. On le trouve en *Asie*, en *Afrique*, & en *Amerique.*

*Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium; 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pollicis & 5 linearum; caudæ, quæ in acumen desinit, 6 circiter pollicum. Auriculas habet breves & subrotundas; 4 in pedibus anticis digitos, 5 vero in posticis. Pili corporis ex rufo & nigro variegantur: pili caudæ supra ex nigro & flavicante, infra verò sunt ex flavo rufi, cum duobus tænis longitudinalibus in utroque latere nigris, alterâ tæniâ etiam longitudinali albicante utrinque terminati: 3 sunt insuper in dorso secundum ipsius longitudinem tænix flavicantes, in utroque scilicet latere una, altera in medio dorso. Habitat in *Asia, Africa, & America.**

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 157

11. L'ÉCUREUIL DE BARBARIE.

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis, & fuscis aut nigris... SCIURUS GETULUS.

Sciurus Getulus Cæsi apud Gesnerum. *Raj. Syn. Quadr. p. 216.*

Klein. Quadr. p. 54.

Sciurus Getulus. Gess. Icon. Quadr. Fig. p. 112. (Fig. bona).

Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p. 405. Fig. p. 406. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 113. Fig. T. 67. Fig. bona).

Sciurus, sive Mus Getulus. Charlet. Exerc. p. 24.

Sciuri vulgaris magnitudinem non attingit; nec aurículas exstantes habet, ut ille; sed depressas magis, breviores & orbicularos. Pilorum color, excepto in ventre, in quo ex cinereo albus, ex rufo & nigro mixtus est. Eum, ab armis ad caudam, per latera albæ fuscæque tæniæ in aliquibus, & albæ & nigræ in aliis alternatim decussatim pingunt, respondentibus etiam in caudâ tæniis, nisi quando expansâ caudâ, propter pilorum raritatem eadem dispareant. Habitat in Barbariâ.

Il est un peu plus petit que l'Écureuil ordinaire: il n'a pas les oreilles si relevées, mais, plus basses, plus courtes, & arrondies. La couleur de ses poils, exceptez ceux du ventre, qui sont gris-blancs, est mêlée de roux & de noir. Il a sur les côtés, depuis les épaules jusqu'à la queue, des bandes alternativement blanches & brunes dans quelques uns, & alternativement blanches & noires dans d'autres: ces bandes s'étendent aussi sur la queue; mais lorsqu'elle est étendue, elles disparaissent, parce que les poils sont trop clair-semés. On le trouve en Barbarie.

** 12. L'ÉCUREUIL VOLANT.

Sciurus obscurè cinereus aut rufescens, cute ab anticis cruribus ad postica membranz in modum extensâ, volans... SCIURUS VOLANS.

Sciurus hypocondrii prolixis volitans. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 13. sp. 2.

Furm. Succ. Linn. No. 22.

Sciurus Americanus volans. Raj. Syn. Quadr. p. 215.

Sciurus petaurista volans. Klein. Quadr. p. 54.

Sciurus volans. Seb. Vol. I. p. 67. Fig. T. 41. F. 3. (Fig. optima).

Mus Ponticus aut Scythicus, Sciurus-ve alius, quem volantem cognominant. Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 111. (Fig. sat bona).

Mus Ponticus, Scythicus, volans. Rzac. aut. p. 315.

Quimichpatlan, seu Mus volans. Jonst. Quadr. p. 114.

Affapanick à Barbaris dictus. Jo. de Laet. p. 82.

Ecureuil volant. Cat. Tom. II. Fig. p. 76. & 77. (Fig. très bonnes).

Ecureuil volant, connu sous le nom de Rat de Pont ou de Tartarie de Gefner. Transf. Phil. an. 1733. p. 35. Fig. Pl. 1. (Fig. très bonne).

Les Polonois l'appellent WIEWIORKA LATAIACA. Rzac.

Les Moscovites, LETAGA. Rzac.

Les Russes, POLATUCHA. Rzac.

Les Suédois, FLYGANDE IKORN. Linn.

Les Anglois, FLYING SQUIRREL. Raj.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 5 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ses oreilles de 5 lignes; & celle de sa queue de 5 pouces 3 lignes. Il a les oreilles rondes; les yeux grands & noirs; une moustache composée de poils noirs longs d'un pouce & demi; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, tous garnis d'ongles pointus & recourbés. La peau des côtés, qui est attachée aux jambes de devant & à celles de derrière selon leur longueur, peut être étendue comme une membrane: c'est par son moyen qu'il peut parcourir en l'air un grand espace; car il vole la longueur de 40 toises: il ne peut en volant ni s'élever, ni garder la ligne horizontale; mais il def-

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, est circiter 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 15 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 5 pollicum cum 3 lineis. Auriculas habet rotundas; ingentes & nigros oculos; mystacem pilis nigris 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longis conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus verò 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos. Laterum cutis, quæ cruribus anterioribus & posterioribus secundum ipsorum longitudinem connectitur, instar membranæ extendi potest: ope illius loca maximè à se distantia facillè saltu attingit; 40 enim sexpedarum longitudinem volatu, vel potius saltu percurrit. Volando aut sursum tendere, aut horizon-

LES QUADRUPÉDES, *Classe I. Ordre XII.* 159

taliter aërem percurrere nequit, sed deorsum obliquè tendit. Pili densissimi sunt & mollesimi, suprà corpus aut obscurè cinerei aut rufescentes, infrà verò albicantes: pili caudæ ejusdem ferè coloris ac corporis pars superior. Habitat in *Poloniâ*, *Laponiâ*, *Finlandiâ*, *Novâ Hispaniâ*, *Virginîâ*, & *Canadâ*.

cend obliquement. Ses poils, qui sont tres épais & tres doux au toucher, sont d'un gris obscur ou roussâtres en dessus du corps, & blanchâtres en dessous: ceux de sa queue sont à peu près de la même couleur que le dessus du corps. On le trouve en *Pologne*, en *Laponie*, en *Finlande*, dans la *Nouvelle Espagne*, en *Virginie*, & en *Canada*.

** 13. L'ÉCUREUIL VOLANT DE SIBÉRIE.

Sciurus dilutè cinereus, cute ab anticis cruribus ad posticâ membranæ in modum extensâ, volans... *SCIURUS SIBERICUS VOLANS*.

A précédente differt magnitudine quâ eum antecellit, cauda breviori, & colore per universum corpus dilutè cinereo. Habitat in *Siberiâ*. Ex *Musæo Realmuriano*.

Il diffère du précédent en ce qu'il est un peu plus grand, qu'il a la queue plus courte, & par sa couleur, qui est partout le corps d'un joli petit gris. On le trouve en *Sibérie*, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur.

14. L'ÉCUREUIL VOLANT DE VIRGINIE.

Sciurus, cute à capite ad anum membranæ in modum lateraliter extensâ, volans... *SCIURUS VIRGINIANUS VOLANS*.

Sciurus cute à capite ad caudam relaxatâ volans. *Linn. syst. nat. ed. 4. g.*

20. *sp. 4.*

Sciurus Virginianus petaurista. Klein. Quadr. p. 35.

Sciurus Virginianus volans. Seb. Vol. I. p. 72. Fig. T. 44. F. 3. (Fig. optima).

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, est circiter $5\frac{1}{2}$ polli-

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'envi-

ron 5 ; pouces ; celle de sa tête , depuis les narines jusqu'à l'occiput , d'environ 15 lignes ; celle de ses oreilles de 8 lignes ; & celle de sa queue de 4 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a à chaque pied 5 doigts , armés de petits ongles pointus & crochus ; le pouce est séparé des autres doigts. Il peut voler à l'aide de la peau des côtés , qui peut s'étendre comme une membrane : elle commence à avoir cette faculté sous la gorge , de là au sommet de la tête , ensuite aux jambes de devant , & à celles de derrière , & de là à l'anus auprès de l'origine de la queue. La partie supérieure de son corps est rousse , & l'inférieure est d'un cendré qui tire sur le jaune. On le trouve en *Virginie*.

cum ; capitis , à naribus ad occipitum , 15 circiter linearum ; auricularum 8 linearum ; caudæ 4 $\frac{1}{2}$ pollicum. Pedes singuli in 5 digitos , acutis & incurvis unguiculis munitos , fissi sunt , pollice ab aliis digitis remoto. Ope cutis laterum , quæ à gutture ad cervicem protenditur , indè ad anteriora crura , & deindè etiam ad posteriora , & tandem ad anum usque propè caudæ exortum , quæque membranæ instar extendi potest , aerem percurrit. In parte corporis superiore rufescit ; in inferiore verò ex cinereo flavescit. Habitat in *Virginia*.

X X V.

Le Genre du Loir.

Son caractère est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants sur le corps :
La queue longue , & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît ronde.

X X V.

Genus Gliris.

Hujus character est
Dentes incisores in utraq. maxillâ duo ;
Canini nulli :
Digni unguiculati :
Corpus aculeis destitutum :
Cauda longa , vestita pilis ita dispositis ut caudam rotundam efficiant.

1. L E L O I R.

Glis suprà obscurè cinereus , infrà ex albo cinerascens... GLIS.
Glis Gesneri & aliorum. *Raj. Syn. Quadr. p. 229.*
Glis. Gesn. Quadr. Fig. p. 619. (Fig. mala).

Gesn.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XII. 163

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 109. (Fig. mala).

Charlet. Exer. p. 25.

Sciurus Epilepticus. Klein. Quadr. p. 54.

Loir. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 40. Fig. Pl. 7. (Fig. affect bonne).

Les Hébreux l'appellent AKBAR. Gefn.

Les Chaldéens, AKBARA. Gefn.

Les Arabes, PIR, ou PHIR. Gefn.

Les Espagnols, LIRON. Gefn.

Les Italiens, GALERO, GLIERO; ou GMIRO. Gefn.

Les Suisses, RELL, ou RELLMUSS, ou GROSSE HASSELMUSS. Gefn. Raf.

Les Allemands, GREUL. Gefn.

Les Polonois, SZYZEK. Gefn.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, $4\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ $3\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet magnos; auriculas longas; pedes pedibus Ratti similes. Pili in parte corporis superiore sunt obscurè cinerei, in inferiore verò ex albo cinerascens. Habitat in sylvis.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, $4\frac{1}{2}$ pouces: la queue est longue de $3\frac{1}{2}$ pouces. Ses yeux sont grands; ses oreilles longues; ses pieds semblables à ceux du Rat. La couleur de son poil est un gris obscur dans la partie supérieure de son corps, & un blanc gris dans la partie inférieure. On le trouve dans les forêts.

** 2. LE LÉROT.

Glis suprà obscurè cinereus, infrà ex albo cinerascens, maculâ ad oculos nigrâ.

Mus Avellanarum major. Raf. Syn. Quadr. p. 219.

Klein. Quadr. p. 56. Not. 48.

Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439.

Jonst. Quadr. p. 116.

Mus Avellanarum. Gefn. Quadr. Fig. p. 833. (Fig. bona).

Rzac. Aut. p. 315.

Mus Avellanarius. Jonst. Quadr. Fig. T. 66. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 25.

Sorex Plinii. Gefn. Quadr. p. 834.

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 115. (Fig. bona).

Les Espagnols l'appellent SORCE, ou RATON PEQUENNO. Gefn.

Les Allemands, HASERMUSS. Gefn. HASSELMAUS. Rzac.

Les Polonois, MYSZORZECHOWA; KOSZALKÁ. Rzac.

X

Les Flamands, SLAEP RATTE. Gefn.

Les Anglois, GREATER DORMOUSE, ou SLEEPER. Raj.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de $5 \frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ses oreilles de 6 lignes; celle de sa queue de 4 pouces. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles arrondies, transparentes, & couvertes de poils extrêmement courts; une moustache composée de poils partie noirs & partie blancs; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière. La couleur de son poil est un gris obscur dans la partie supérieure du corps, & un blanc gris dans la partie inférieure: autour des yeux est une tache noire, & une autre au dessous des oreilles. Sa queue, depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, est couverte en dessus de poils variés de roux & de noir, & en dessous d'un roux blanchâtre: dans le reste de sa longueur elle est noire en dessus, & blanche en dessous. On le trouve dans les bois, & dans les endroits où il y a des fruits.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, $5 \frac{1}{2}$ pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 15 linearum; auricularum 6 linearum; caudæ 4 pollicum. Oculos habet ingentes & nigros; aurículas subrotundas, pellucidas, & pilis brevissimis obsitas; mystacem partim nigris partim albis pilis constatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5. Pili in parte corporis superiore sunt obscurè cinerei, in inferiore ex albo cinerascetes: macula est circà oculos nigra, altera macula ejusdem coloris infra aurículas. Cauda, ab exortu ad mediam longitudinem usque, obsita est in parte superiore pilis ex rufo & nigro variis, in inferiore pilis ex rufo albicantibus, altera mediocritate supernè nigrâ, infernè albâ. Habitat in sylvis, & in locis in quibus fructus crescunt.

** 3. LE CROQUE-NOIX.

Glis suprà rufus, infra albicans.

Mus caudâ longâ pilosâ, corpore rufo, galâ albicante. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. p. 9.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 185

Faun. Suec. Linn. N^o. 32.

Mus Avellanarum minor. Raj. Syn. Quadr. p. 220.

Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439. Fig. p. 440. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 216.

Les Italiens l'appellent MOSCARDINO. Aldro.

Les Suédois, SKOGSMUS. Linn.

Les Anglois, DORMOUSE, ou SLEEPER. Raj.

Soritem magnitudine æmulatur. Caudam habet corpore paulò longiorem; aurículas breves & rotundas; ingentes & nigros oculos; mystacem pilis nigris & raris conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos, excepto pollice pedum posteriorum, qui caret ungue, & ab aliis digitis est remotus. Pili in parte corporis superiore sunt rufi, in inferiore verò albicantes, paululum flavicante admixto. Habitat in Europe sylvis.

Il est de la grandeur d'une Souris. Il a la queue un peu plus longue que le corps; les oreilles courtes & rondes; les yeux grands & noirs; une moustache composée de poils noirs, & clair-semés; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, armés d'ongles crochus & pointus: le pouce des pieds de derrière est séparé des autres doigts, & n'a point d'ongle. La couleur de son poil est rousse dans la partie supérieure du corps, & blanche, mêlée d'un peu de jaunâtre, dans la partie inférieure. On le trouve en Europe dans les bois.

4. LA MARMOTTE DE BAHAMA;

Glis fuscus... MARMOTA BAHAMENSIS.

Cavia Bahamensis. Klein. Quadr. p. 50.

Lapin de Bahama. Cat. Tom. II. Fig. p. 79. (Fig. bonne).

Nostrate Cuniculo paulò minor est. Aurículas habet & pedes auriculis & pedibus Murinis similes. Color pilorum fuscus. Habitat in Bahama.

Elle est un peu plus petite que notre Lapin. Elle a les oreilles & les pieds semblables à ceux du Rat. La couleur de ses poils est brune. On la trouve à Bahama.

5. LA MARMOTTE D'AMÉRIQUE.

Glis fuscus, rostro è cinereo cœrulescente... MARMOTA AMERICANA.

Glis Marmota, Americanus, Klein. Quadr. p. 56.

Monax, ou Marmotte d'Amérique. Edwards. Tom. II. Fig. p. 104. (Figures bonne).

Marmotte Américaine, Cat. app. p. 28.

Elle est environ de la grosseur de notre Lapin. Elle a les yeux noirs & à fleur de tête; les oreilles courtes & rondes; une moustache composée de poils roides comme des foyes, & en outre de pareils poils de chaque côté de la tête, un peu au-delà des coins de la bouche; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, tous très longs, & armés d'ongles longs & pointus. Tout son corps est couvert de poils d'un brun plus foncé sur le dos, un peu plus clair sur les côtés, & encore plus clair sur le ventre. Le museau est d'un cendré clair & bleuâtre: les ongles, les doigts & les pieds jusqu'au talon sont noirs. La queue, qui a plus de la moitié de la longueur du corps, est couverte de poils bruns & noirâtres. On la trouve en Amérique, & surtout à Maryland.

Nostratis Cuniculi magnitudinem circiter æquat. Oculi habet exstantes & nigros; auriculas breves & rotundas; mystacem pilis setarum instar rigidis confectam, & præterea similes pilos in utroque capitis latere ultra oris angulos; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5, omnes longissimos, longis & acutis unguibus munitos. Per universum corpus vestitur pilis fuscis saturatius in dorso, dilutè in lateribus, in ventre dilutius. Rostrum ex dilutè cinereo cœrulescit: ungues, digiti, & pedes ad talum usque nigricant. Cauda, quæ plusquam mediam corporis longitudinem attingit, pilis vestitur fuscis & nigrescentibus. Habitat in America, & præsertim in Maryland.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XII. 185

** 6. LA MARMOTTE DE POLOGNE.

Glis flavicans, capite rufescente... MARMOTA POLONICA.

Mus Alpinus. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 233.

Rzac. Aud. p. 327.

Mus Montanus quorundam. Rzac.

Les Italiens l'appellent MARMONTANA. Rzac.

Les Allemands, MURMELTHIER. Rzac.

Les Polonois, BOBAK ; SWISZEZ. Rzac.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, $1 \frac{1}{2}$ pedis est; capitis, à naribus ad occipitum, 4 pollicum; caudæ totidem. Auriculas habet brevissimas & rotundas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevissimus & obtusus: pedum posteriorum digitus intermedius duobus lateralibus sunt longiores. Univerſum corpus pilis flavicantibus vestitur, capite tamen & caudâ paululum rufescentibus. Habitat in Poloniâ.

Elle a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, $1 \frac{1}{2}$ pied: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 4 pouces: sa queue est de la même longueur. Ses oreilles sont très courtes & rondes. Elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière; à la place du ponce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle très court & obtus: les 3 doigts du milieu des pieds de derrière sont plus longs que les 2 autres. Tout son corps est couvert de poils jaunâtres: sa tête est un peu rousse, ainsi que sa queue. On la trouve en Pologne.

** 7. LA MARMOTTE DES ALPES.

Glis pilis è fusco & flavicante mixtis vestitus... MARMOTA ALPINA.

Glis, Marmota Italica. Mus Alpinus Plinii. Klein. Quadr. p. 56.

Mus caudâ elongatâ nudâ, corpore rufo. Marmota. Linn. syst. nat. ed. 6. p. 21. sp. 11.

Mus Alpinus Plinii, Marmota Italica. Raj. Syn. Quadr. p. 221.

Mus Alpinus, sive Marmota. Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p. 445. [Fig. sat bona].

Xiii

Charlet. Exer. p. 19.

Mus Alpinus. Gess. Quadr. p. 840. Fig. p. 841. (Fig. bona).

Gess. Icon. Quadr. Fig. p. 108. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 117. Fig. T. 67. (Fig. bona).

Marmotte. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 33. Fig. Pl. 7. [Fig. bonne].

Les Italiens l'appellent MURMONT; MARMOTA; MARMONTANA; VAROZA.

Gess.

Les Grisons, MONTANELLA. Gess.

Les Allemands & les Suisses, MURMELTHIER; MURMENTLE; MISTBELLERLE.

Gess.

Les Suédois, MORMELDIUR. Linn.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 1 $\frac{1}{2}$ pied; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 3 pouces 9 lignes; celle de ses oreilles de 7 lignes; & celle de sa queue, depuis son origine jusqu'au bout des poils, qui sont fort longs, de 6 pouces. Elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière, dont les 3 du milieu sont plus longs que les 2 latéraux. Tout son corps est couvert de poils rudes, variés de brun & de jaunâtre dans la partie supérieure du corps, & tout à fait jaunâtres dans la partie inférieure: ceux de la queue sont variés de noir & de jaunâtre. On la trouve dans les Alpes.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 1 $\frac{1}{2}$ pedis est; capitis, à naribus ad occipitium, 3 pollicum cum 9 lineis; auricularum 7 linearum; caudæ; ab exortu ad extremitatem usque pilorum, qui longissimi sunt, 6 pollicum. Pedes anteriores in 4 digitos fissi sunt, posteriores verò in 5, quorum 3 intermediū duobus lateralibus sunt longiores. Universum corpus vestitur pilis rigidis, ex fusco & flavicante variegatis in parte corporis superiore, in inferiore verò flavicantibus: pili caudæ ex nigro & flavicante variegantur. Habitat in Alpibus.

8. LA MARMOTTE DE STRASBOURG.

Glis ex cinereo rufus in dorso, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis... MARMOTA ARGENTORATENSIS.

Mus caudā elongatā, corpore cinereo, rutilo nigroque longitudinaliter vario. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21 sp. 10.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XII. 169

Elis Cricetus, Gefneri. *Klein. Quadr. p. 56.*

Cricetus Gefneri. Raj. Syn. Quadr. p. 121.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 232.

Rzac. aud. p. 326.

Cricetus. Gefn. Quadr. Fig. p. 836.

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 113.

Arctomys Palestinæ secundum Gelenium. Raj. Gefn.

Porcellus frumentarius Schwenckfeldii. Rzac.

Mus magnus campi quorundam. Rzac.

Auprès de Strasbourg on l'appelle KORNFAULE. Gefn.

Les Polonois l'appellent SKRZECZEK; CHOMIK. Rzac.

Les Allemands, HAMSTER, ou HAMESTER. Gefn. Rzac.

Quoad magnitudinem Rat-
tum inter & nostratam Cuni-
culum medio pollet. Pedes
habet admodum breves; cau-
dam 8 circiter pollices lon-
gam. Capitis pars superior,
dorsum, & cauda ex cinereo
rufescunt: tempora rutila
sunt, sicut & latera: venter
est niger, & guttur candidum;
& insuper utrumque latus
maculis albis tribus numero
distinguitur. Habitat in agris
circa Argentoratum, in Tu-
ringiâ, Misniâ & Poloniâ.

Sa grandeur tient le milieu
entre le Rat & notre Lapin. Elle
a les pieds très courts, & la
queue longue d'environ 8 pou-
ces. Le dessus de la tête, le dos,
& la queue sont d'un gris roux:
les temples & les côtés sont roux:
la gorge est blanche, & le ven-
tre noir; de plus les côtés sont
marqués chacun de 3 taches
blanches. On la trouve auprès
de Strasbourg, dans la Turinge,
la Misnie, & la Pologne.

XXVI.

Genus Muris.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis destitutum:
Cauda nuda, aut raris pilis
obsta.

XXVI.

Le Genre du Rat.

Son caractère est
D'avoir deux dents incisives à
chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doigts onguiculés:
Point de picquants sur le corps:
La queue nue, ou couverte de
poils clair semés.

Obs. 1^{re}. Les especes de ce Genre se distinguent entr'elles par la longueur de leur queue, & par leurs couleurs : les unes ont la queue plus longue que le corps ; d'autres ont la queue à peu près de la longueur du corps ; & d'autres l'ont beaucoup plus courte. J'appelle la première *queue très longue* ; la seconde *queue longue* ; & la troisième *queue courte*. J'entends par la longueur du corps, la distance qu'il y a depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue.

Obs. 2^o. Toutes les especes de *Rats* ont les pieds de derrière plus longs que ceux de devant.

Obs. 1^o. Hujus Generis species coloribus & caudæ longitudine inter se distinguuntur : alix caudam habent corpore longiorem ; alix caudam corporis circiter longitudine ; alix caudam corpore multò breviorē. Primam *caudam longissimam* ; secundam *caudam longam* ; tertiam denique *caudam brevem* vocavi. Per corporis longitudinem, intelligo distantiam occipitium inter & caudæ exortum.

Obs. 2^o. Omnes hujus Generis species pedes habent posteriores anteriores longiores.

** 1. LE RAT.

Mus caudâ longissimâ, obscurè cinereus... RATTUS.

Mus caudâ longâ, subnudâ, corpore fusco cinerascēte. Linn. syst. nat.,
lib. 6. g. 21. sp. 6.

Faun. Suec. Linn. No. 28.

Mus, Rattus domesticus. Klein. Quadr. p. 57.

Mus domesticus major, sive Rattus. Raf. Syn. Quadr. p. 217.

Sloane. Vol. II. p. 330.

Gesn. Quadr. Fig. p. 829. [Fig. sat bona].

Gesn. Icon. Quadr. p. 114. Fig. p. 115. (Fig. sat bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 415.

Jonst. Quadr. p. 115. Fig. T. 66. sub isto nomine, Glires. (Fig. bonis).

Sorex. Charlet. exer. p. 25.

Guabirû Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. p. 229.

Les Grecs l'appellent μῦς.

Les Espagnols, RATON. Gesn. Aldro.

Les Portugais, RATO DA CASA. Marcgr.

Les Italiens, RATO DI CASA; PANTEGANA; SOURCO. Gesn.

Les Allemands, RATZ. Gesn. Aldro.

Les Polonois, SEZUREK. Aldro.

Les Anglois, RAT; RATTLE. Raf. Gesn. Aldro.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces ; celle de sa tête,

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 7 circiter pollicum ; capitis, à naribus ad occipitium,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 169

tium, 2 circiter pollicum. depuis les narines jusqu'à l'occiput, d'environ 2 pouces. Sa queue est plus longue que le corps : ses oreilles sont grandes, arrondies & transparentes. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un petit ongle tres court. Tout son corps est couvert de poils d'un brun obscur, & sa queue de tres petites écailles, entre lesquelles sont quelques poils tres clair-semés. Il y en a qui sont tout à fait blancs. On le trouve dans les maisons.

** 2. LA SOURIS :

Mus caudâ longissimâ, obscurè cinereus, ventre subalbescente... SOREX.

Mus caudâ nudiusculâ, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 8.

Faun. Suec. Linn. N^o. 31.

Mus minor; Musculus vulgaris domesticus, caudâ tereti longâ. Klein. Quadr. p. 57.

Mus domesticus vulgaris, seu minor. Raj. Syn. Quadr. p. 218.

Sloane. Vol. II. p. 330.

Mus domesticus communis vel minor. Gessn. Icon. Quadr. Fig. p. 114. (Fig. sat bona).

Mus domesticus minor. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 415. Fig. p. 417. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 115. Fig. T. 66. sub isto nomine, Murex. (Fig. sat bonis).

Mus. Gessn. Quadr. Fig. p. 808. (Fig. sat bona).

Sorex domesticus. Charles. exar. p. 25.

Caracvoca Brasiliensibus. Maregr. Hist. Br. p. 229.

Les Hebreux l'appellent ACBAR. Gessn. Aldro.

Les Chaldéens, ACBERA. Gessn. Aldro.

Les Grecs, Μύσος, ou Μύσων.

Les Arabes, PHIR, ou PHAR. Gessn. Aldro.

Les Sarrafins, FARRA. *Gefn. Aldro.*

Les Espagnols, RAT. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, TOPO; SORICE; SORGIO DI CASA. *Gefn. Aldro.*

Les Allemands, MUSZ. *Gefn. Aldro.*

Les Polonois & les Illyriens, MYSS. *Gefn. Aldro.*

Les Suédois, MUS. Linn.

Les Anglois, MOWS. *Gefn. Aldro.* MOUSS. *Raj. Gefn. Aldrai.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, est de 2 pouces 9 lignes; celle de sa tête de 11 lignes; celle de ses oreilles de 5 lignes; & celle de sa queue de 3 pouces 4 lignes. Elle a les oreilles larges, arrondies & transparentes; les yeux grands & à fleur de tête; & le même nombre de doigts que le précédent. La couleur de ses poils est un gris obscur dans la partie supérieure de son corps, & un peu blanchâtre dans la partie inférieure. Quelques unes sont tout à fait blanches. On la trouve dans les maisons.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 2 pollicum cum 9 lineis; capitis 11 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 3 pollicum cum 4 lineis. Auriculas habet latas, subrotundas & pellucidas; oculos magnos exstantes; pedum digitos, ut in præcedente. Pili in parte corporis superiore obscurè sunt cinerei; in inferiore verò paululùm subalbescentes. Dantur & toti albi. Habitat in domibus.

** 3. LE RAT DE BOIS.

Mus caudâ longissimâ, suprà dilutè fulvus, infrà albicans. :
MUS SYLVESTRIS.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 7 3/4 pouces : sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 2 pouces; & sa queue de 7 1/2 pouces : elle est, comme celle du Rat, couverte de tres petites écailles, entre lesquelles sont quelques poils tres clair-se-

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 7 3/4 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum; & caudæ 7 pollicum. Cauda verò, sicuti & cauda Ratti, squamis minimis, pilis quibusdam rarissimis intermixtis, tegitur. Au-

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XII. 171

riculas habet auriculis Ratti
similes. Pedes anteriores in 4,
posteriores in 5 digitos fissi
sunt : & loco pollicis , quo
caret pes anterior, unguis bre-
vis & obtusus extat. Corporis
pars superior, sicut & cru-
rum exterior, sunt dilutè ful-
va ; inferior verò corporis
pars , & crurum interior al-
ba. Habitat in sylvis. Ex Mu-
seo Realmuriano.

més. Ses oreilles sont sembla-
bles à celles du Rat. Il a 4 doigts
aux pieds de devant, & 5 à ceux
de derrière : à la place du pouce,
qui manque aux pieds de devant,
est un ongle tres court & obtus.
Toute la partie supérieure du
corps, & l'extérieure des jam-
bes sont d'un fauve clair ; & la
partie inférieure du corps, &
l'intérieure des jambes sont blan-
ches. On le trouve dans les bois.
Il est dans le cabinet de M. de
Reaumur.

4. LE GRAND RAT DES CHAMPS.

**Mus caudâ longissimâ, fuscus, ad latera rufus... MUS CAM-
PESTRIS MAJOR.**

Mus agrestis major, Macrourus Gefneri. *Raj. Syn. Quadr. p. 219.*

Klein. Quadr. p. 57. Not. 50.

Mus agrestis major. *Gefn. Quadr. p. 830. Fig. p. 1104. (Fig. sat bona) ;*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. [Fig. sat bona].

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 436.

Mus agrestis. *Rac. aut. p. 328.*

Les Italiens l'appellent CAMPAGNOLI. *Aldro.*

Les Allemands, FELDMUSZ ; ERDMUSZ ; NOLMUSZ, ou NIELMUSZ. *Gefn. Rac.*

Les Anglois, FELDMUSZ. *Gefn.*

Les Polonois, MYSS POLNA. *Rac.*

Ratti magnitudinem cir-
citer attingit. Caudam, ut
ille, longam habet & cras-
sam ; auriculas rotundas ; ca-
put magnum & rotundum.
Pilorum color per univer-
sum corpus fuscus est , ex-
ceptis lateribus , in quibus
rufus. Habitat in agris.

Il est à peu-près de la gran-
deur d'un Rat. Il a, comme lui,
la queue longue & grosse : ses
oreilles sont rondes ; la tête gros-
se & arrondie. Tout son corps
est couvert de poils bruns, ex-
cepté aux côtés, où ils sont
roux. On le trouve dans les
champs.

5. LA SOURIS D'AMÉRIQUE.

Mus caudâ longissimâ, dilutè spadiceus... SOREX AMERICANUS.

Mus Americanus pilis dilutè spadiceis vestitus. Seb. Vol. I. p. 177. Fig. T. 111. F. 6. (Fig. optimâ).

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 3 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, d'un pouce; & celle de sa queue de 3 pouces 8 lignes. Elle a le museau un peu pointu; & les oreilles grandes & larges. Tout son corps est couvert de poils d'un bay-rouge clair. On la trouve en Amérique.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exitum, 3 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 1 pollicis; & caudæ 3 pollicum cum 8 lineis. Rostrum paulò acutum est; auriculæ magnæ & latæ. Pili dilutè spadicei universum corpus vestiunt. Habitat in Americâ.

6. LE RAT D'AMÉRIQUE.

Mus caudâ longissimâ, supra ex rufo flavescens, infra albicans, auriculis retrorsum sitis... RATTUS AMERICANUS.

Mus Americanus. Klein. Quadr. p. 58. Seb. Vol. II. p. 30. Fig. T. 129. F. 2. (Fig. bonâ).

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 3 $\frac{1}{2}$ pouces: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, a environ 15 lignes de long; & sa queue 4 pouces: elle est blanchâtre, & hérissée de quelques poils. Ses oreilles sont assez grandes, blanchâtres, & placées plus en arrière que dans les autres espèces de ce genre. Ses pieds de derrière sont plus grands & plus

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 3 $\frac{1}{2}$ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 15 circiter linearum; caudæ 4 pollicum. Caudam habet albescentem, pilis quibusdam raris hispidam; auriculas sat magnas, albescentes, plus retrorsum sitas quàm in aliis hujus generis speciebus; pedes posteriores

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 173
 anterioribus majores & crassiores. Dorsum & capitis pars superior ex rufo flavescunt: pedes 4 & venter albicant. Habitat in *Americâ*.
 gros que ceux de devant. Sont dos & la partie supérieure de sa tête sont d'un roux jaunâtre; le ventre & les 4 pieds sont blancs, On le trouve en *Amérique*.

7. LE RAT BLANC DE VIRGINIE.

Mus caudâ longâ, albus, mystace nigricante... MUS. ALBUS VIRGINIANUS.

Mus agrestis Virginianus albus. Klein. Quadr. p. 57.
Seb. Vol. I. p. 76. Fig. T. 47. F. 4. (Fig. optimâ).

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 3 $\frac{1}{2}$ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 15 linearum; caudæ 2 pollicum cum 9 lineis. Caput habet acuminatum, & mystacem pilis longis nigricantibus constatum; caudam in exortu crassam, in acumen desinentem, pilisque longis & raris obsitam. Per univsum corpus vestitur pilis brevibus albis. Habitat in *Virginid*.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 3 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 15 lignes; & celle de sa queue de 2 pouces 9 lignes. Il a la tête oblongue, & une moustache composée de poils longs & noirâtres. Sa queue, qui est grosse à son origine, se termine en pointe, & est garnie de poils longs & clairsemés. Tout son corps est couvert de poils blancs & courts. On le trouve en *Virginie*.

8. LE RAT DE NORVÈGE.

Mus caudâ longâ, ex dilute cinereo fuscus... MUS NORVÆGICUS.

Mus ex Norvagiâ cinereo fuscus. Seb. Vol. II. p. 64. Fig. T. 63. F. 3.
[Fig. bona].
Glis Norvagicus. Klein. Quadr. p. 56.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ ex- Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,
 Y ij

environ $4\frac{1}{2}$ pouces ; depuis les narines jusqu'à l'occiput, $1\frac{1}{2}$ pouce : sa queue a $3\frac{1}{2}$ pouces de long. Il a une moustache composée de longs poils. Ses oreilles sont courtes & larges ; son dos large & courbé ; son ventre pendant ; ses cuisses grosses ; ses doigts longs, & armés d'ongles pointus. Tout son corps est couvert de poils d'un cendré clair, tirant sur le brun. On le trouve en Norvège.

ortum, $4\frac{1}{2}$ circiter pollicum ; capitis, à naribus ad occipitum, $1\frac{1}{2}$ pollicis ; caudæ $3\frac{1}{2}$ pollicum. Mystacem habet longis pilis conflatum ; aurículas breves & latas ; dorsum latum, incurvum ; ventrem pendulum ; femora crassa ; digitos longos, acutis unguibus munitos. Per universum corpus vestitur pilis ex dilute cinereo fuscis. Habitat in Norvegiâ.

** 9. LE MULOT.

Mus caudâ longâ, suprâ è fusco flavescens, infrâ ex albo cinerascens.

Mus caudâ longâ, corpore nigro flavescente, abdomine albo. *Lin. Syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 7.*

Faun. Suec. Linn. N°. 30.

Mus domesticus medius. *Raj. Syn. Quadr. p. 218:*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de $4\frac{1}{2}$ pouces ; celle de sa tête de 5 lignes ; & celle de sa queue de $3\frac{1}{2}$ pouces. Il a les yeux grands, & à fleur de tête ; les oreilles larges, rondes & transparentes ; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle court & obtus. La couleur de ses poils est un brun jaunâtre dans la partie supérieure de son corps, &

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ ortum, $4\frac{1}{2}$ pollicum ; capitis 15 linearum ; caudæ $3\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet magnos & prominentes ; aurículas latas, rotundas, & pellucidas ; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5 ; loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevis & obtusus. Pili in parte corporis superiore ex fusco flavescunt, in inferiore ex albo cinerascunt ; in lateribus capitis ru-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 175
 fescunt. Habitat in sylvis, un blanc tirant sur le gris dans
 agris, & hortis. inférieure : il y a un peu de
 roussâtre à chaque côté de la
 tête. On le trouve dans les bois,
 les champs & les jardins.

10. LE RAT ORIENTAL.

Mus caudâ longâ, rufus, lineis in dorso albicantibus, margari-
 tarum æmulis... MUS ORIENTALIS.

Mus Orientalis. Klein. Quadr. p. 57.

Sub. Vol. II. p. 22. Fig. T. 11. F. 2. (Fig. optimâ).

Corporis longitudo, ab ex-
 tremitate rostri ad caudæ ini-
 tium, 2 est pollicum; capitis,
 à naribus ad occipitium, 8
 aut 9 linearum; caudæ, 1 ½
 pollicis. Auriculas habet bre-
 vissimas, sicut & crura; pe-
 des latos; caudam crassam.
 Pilorum color rufus est, li-
 neis albicantibus margarita-
 rum æmulis per dorsum dis-
 tinctus. Habitat in Indiâ
 Orientali.

Il a, depuis le bout du mu-
 seau jusqu'à l'origine de la queue,
 environ 2 pouces. Sa tête, de-
 puis les narines jusqu'à l'occiput,
 a 8 ou 9 lignes de long; & sa
 queue 1 ½ pouce. Il a les oreilles
 & les jambes très courtes; les
 pieds assez larges, & la queue
 grosse. La couleur de son poil
 est rousse. Il a sur le dos des
 rayes blanchâtres, qui paroissent
 perlées. On le trouve dans les
 Indes Orientales.

** 11. LE RAT D'EAU.

Mus caudâ longâ, pilis suprâ ex nigro & flavescente mixtis,
 infrâ cinereis vestitus... MUS AQUATICUS.

Mus major aquaticus, sive Rattus aquaticus. Raj. Syn. Quadr. p. 217.

Mus, Rattus aquaticus. Klein. Quadr. p. 57.

Mus aquaticus, QUADRUPES Bellonii. Gêsn. Icon. aquat. Fig. p. 354. { Fig.
 mala }.

Musaquarilis. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 447.

Mus aquaticus. Gêsn. Quadr. p. 830.

Jonst. Quadr. p. 117.

Bell. de aquat. p. 35. Fig. p. 36. (Fig. mala).

Rat. aud. p. 328.

Sorex aquaticus. Charles. exer. p. 25.

Castor caudâ lineari tereti. Rattus aquaticus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 20. sp. 3.

Faun. Suec. Linn. No. 25.

Les Grecs l'appellent Μύς ἰνδῶν.

Les Italiens, SORGO MORGANGE. Gsf. Aldro.

Les Polonois, MYŚ WODNA. Rzac.

Les Allemands, WASSER-MUS. Gsf. Aldro. Rzac. WASSER-RATZ. Gsf.

Les Suédois, WATN-RÖTTA. Linn.

Les Anglois, WATTER-RATTE. Gsf. Aldro.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 6 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 2 pouces; celle de sa queue de 4 pouces 3 lignes; le tour de son corps est de 4 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a les yeux assez grands; ses oreilles courtes, rondes & presque cachées dans ses poils; 4 doigts aux pieds de devant & 5 à ceux de derrière: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle court & obtus. Ses poils sont mêlés de noir & de jaunâtre dans la partie supérieure de son corps, & dans la partie inférieure ils sont cendrez, & mêlez d'un peu de jaunâtre. On le trouve dans des endroits aquatiques.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 6 pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 2 pollicum; caudæ 4 pollicum cum 3 lineis; ambitus corporis 4 $\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet sat magnos; auriculas breves, rotundas, & ferè in pilis occultas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5; loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevis & obtusus. Pilorum color in parte corporis superiore ex nigro & flavescente mixtus est, in inferiore cinereus, cum paucis flavescens admixto. Habitat in aquis locis,

12. LE PETIT RAT DES CHAMPS.

Mus caudâ brevi, pilis à nigricante & sordide luteo mixtis in dorso, & saturate cinereis in ventre vestitus... MUS CAMPESTRIS MINOR.

Mus caudâ brevi, corpore nigro fusco, abdomine cinerascens. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 4.

Faun.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 177.

Faun. Suec. Lijn. No. 27.

Mus agrestis capite grandi brachiuros. Raj. Syn. Quadr. p. 218.

Mus agrestis capite grandi. Klein. Quadr. p. 57. Not. 50.

Mus agrestis minor. Gefn. Quadr. p. 830.

Gefn. Icon. Quadr. p. 116.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 476.

Les Italiens l'appellent CAMPAGNOLI. Aldro.

Soricem magnitudine superat. Corpus habet longius; caput grande; rostrum breve, obtusum; oculos parvos; auriculas breves, latas, subrotundas, in pilis, qui longiores sunt quam in *Sorice*, penè occultatas; caudam pollicis longitudinem non multum superantem, & pilis quam in *Ratto* crebrioribus, non tamen densis, vestitam; crura perbrevia. Pilorum color è nigricante & sordide luteo mixtus est in dorso, & saturatè cinereus in ventre. Habitat in agris, in messe frequens.

Il est plus grand que la *Souris*. Il a le corps allongé; la tête grosse; le museau court & obtus; les yeux petits; les oreilles courtes, larges, arrondies, & presque cachées dans ses poils, qui sont un peu plus longs que ceux de la *Souris*. Sa queue n'a gueres plus d'un pouce de long: elle est plus couverte de pils que celle du *Rat*, quoiqu'ils soient encore clair femez. Ses jambes sont courtes. La couleur de ses poils est mêlée de noirâtre & de vilain jaune sur le dos, & d'un gris foncé sur le ventre. On le trouve dans les champs, & sur tout pendant la moisson.

SECTIO III.

Ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis destitutum habent.

SECTION III.

Ceux qui ont des dents canines & qui n'ont point de picquants sur le corps.

UNICO Genere, scilicet *Musaranei*, constituitur hæc Sectio.

CETTE Section ne contient qu'un seul Genre, qui est celui de la *Musaraigne*.

XXVII.

XXVII.

Le Genre de la Musaraigne.

(Fig. 2.)

Son caractère est.

D'avoir deux incisives
(Fig. 2, a, b.) à chaque mâchoire.

Des dents canines : (Fig. 2, c.)

Les doigts onguiculés :

Point de picquants sur le corps.

Genus Musaranei.

(Fig. 2.)

Hujus character est

Dentes incisives in utraque
maxillâ duo : (Fig. 2, a, b.)

Canini præsentès : (Fig. 2, c.)

Digiti unguiculati :

Corpus aculeis destitutum.

** 1. LA MUSARAIGNE.

Musaraneus suprà ex fusco rufus, infrà albicans... MUSARA-
NEUS.

Musaraneus, rostro productiore. Mus venenosus. Klein. Quadr. p. 38.

Musaraneus. Raj. Syn. Quadr. p. 239.

Gefn. Quadr. Fig. p. 844. (Fig. sat bona.)

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 441. Fig. p. 442. [Fig. mala.]

Jonst. Quadr. p. 116. Fig. T. 66. (Fig. sat bona.)

Charlet. Exer. p. 25.

Musaraneus ; Mus cæcus ; Mygale. Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. (Fig.
sat bona.)

Sorex. Musaraneus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 22. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 33.

Les Bourguignons l'appellent SERY. Gefn. Aldro.

Les Grecs, ΜΥΓΑΛΗ.

Les Espagnols, RATON PEQUENNO. Gefn. MURGANHO. Aldro.

Les Italiens, TOPORAGNO. Aldro.

Les Grisons, MUSARAING. Gefn. Aldro.

Les Savoyards, MUSET, ou MUSETTE. Aldro.

Les Suisses, MUXET. Gefn. Aldro.

Les Allemands, SPITZMUS. Gefn. Aldro.

Les Silésiens, BISEM-MUSS. Gefn.

Les Illyriens, NIERMEKA-MYSE. Gefn.

Les Polonois, KERET. Gefn.

Les Suédois, NÄBBMUS. Linn.

Les Anglois, SHREW. Raj. Gefn. Aldro. SHREW-MOUSE, ou HARDY-SHREW.
Raj.La longueur de son corps, Longitudo corporis, ab
depuis le bout du museau jus- extremitate rostri ad caudæ

LES QUADRUPÈDES, *Classe 1. Ordre XII.* 179.

extortum, 2 $\frac{1}{2}$ pollicum; capitis, à natis ad occipitum, 9 linearum; cauda 15 linearum. Nasum habet ultra maxillam inferiorem multo prominentem, & acutissimum; oculos minimos & nigros; auriculas breves, sicut & crura; in singulis pedibus digitos 5, quorum 3 intermediis pedum posteriorum duobus lateralibus sunt longiores; caudam pilis brevibus vestitam. Pilorum color in parte corporis superiore ex fusco rufus est, in inferiore, sicut & in 4 pedibus, albicans. Dentes habet incisores in utraque maxilla binos, acutos; superiores (Fig. 2. a.) bifidos & uncinatos; inferiores (Fig. 2. b.) rectè antrosum prominentes, apice recurvos: sunt insuper dentes canini in maxilla superiore 3 utrinque, quorum primus duobus aliis major; & in maxilla inferiore duo utrinque, quorum primus sequente minor est: dentes molares in maxilla superiore 4 utrinque, quorum ulterior parvus; & in maxilla inferiore 3 utrinque: summa dentium 28. Habitat in agris.

qu'à l'origine de la queue, est de 2 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 9 lignes; celle de sa queue de 15 lignes. Son nez avance beaucoup au delà de la mâchoire inférieure, & est très pointu. Elle a les yeux très petits & noirs; les oreilles & les jambes courtes; à chaque pied 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de derrière sont plus longs que les 2 latéraux. Sa queue est couverte de poils courts. Toute la partie supérieure de son corps est d'un brun roux, & l'inférieure est blanchâtre, ainsi que les 4 pieds. Elle a à chaque mâchoire 2 dents incisives pointues: les supérieures (Fig. 2. a.) sont échancrées & crochues; les inférieures (Fig. 2. b.) avancent droit en avant, & sont un peu courbées vers le bout: elle a en outre 3 dents canines de chaque côté à la mâchoire supérieure, dont la première est plus grande que les 2 autres; & à de chaque côté à la mâchoire inférieure, dont la première est plus petite que la suivante: de plus 4 dents molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, dont la dernière est petite; & 3 de chaque côté à la mâchoire inférieure: en tout 28 dents. On la trouve dans les champs.

2. LA MUSARAIGNE DU BRÉSIL.

Musaraneus fuscus, tribus tæniis in dorso nigris... *MUSARANEUS BRASILIENSIS*. ●

Musaraneus. Marcgr. Hist. Br. p. 229.

La longueur de son corps, depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 5 doigts; & celle de la queue d'environ 2 doigts. Son museau est très pointu. Sa couleur est brune; & elle a 3 bandes noires qui s'étendent sur le dos, selon la longueur, depuis la tête jusqu'à la queue. On la trouve au Brésil.

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, circiter 5 digitorum; caudæ ferè 2. Os habet acutum. Color ipsius est fuscus; & in dorso, secundum longitudinem, à capite ad caudam, 3 tænias habet nigras. Habitat in Brasiliâ.

SECTION IV.

SECTIO IV.

Ceux qui ont des dents canines, & le corps couvert de picquants.

Ea quæ dentibus caninis donantur; & corpus aculeatum habent.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, sçavoir celui du *Hérifson*.

UNICUM Genus, scilicet *Erihacei*, continet hæc Sectio.

XXVIII.

XXVIII.

Le Genre du *Hérifson*. (Fig. 1.)

Genus *Erinacei*. (Fig. 1.)

Son caractère est
D'avoir deux incisives
(Fig. 1. a, bu) à chaque mâchoire.
Des dents canines :
Les doigts onguiculés :
Le corps couvert de picquants.

Hujus caractèr est
Dentes incisores in utraq; maxillâ duo : (Fig. 1. a, bu)
Canini præsentès :
Digitì unguiculati :
Corpus aculeatum.

Erinaceus auriculis erectis... ERINACEUS.

Erinaceus auriculatus. Echinus terrestris. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 11. sp. 1.*

Faun. Suec. Linn. No. 16.

Echinus, sive Erinaceus terrestris. *Raj. Syn. Quadr. p. 231.*

Echinus vel Herinaceus. *Gefn. Icon. Quadr. p. 106. Fig. p. 107. (Fig. bona).*

Echinus terrestris. *Gefn. Quadr. p. 399. Fig. p. 400 [Fig. bona].*

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 459.

Jonst. Quadr. p. 119. Fig. T. 68. sub isto nomine, Herinaceus. (Fig. bona).

Mus. Worm. p. 334.

Erinaceus nostras. *Seb. Vol. I. p. 78. Fig. T. 49. F. 1. & 2. (Fig. optimis).*

Erinaceus. *Charlet. Exer. p. 19.*

Herinaceus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 233.*

Rzac. aud. p. 326.

Hericius, Herix Sipontino. *Rzac.*

Acanthion vulgaris nostras. Herinaceus: Echinus. *Klein. Quadr. p. 66.*

Acanthio terrestris Galeni. *Rzac.*

Les Hébreux l'appellent קיפוד. *Gefn. Aldro.*

Les Chaldéens, KOPEDA. *Gefn.*

Les Grecs, *Ερίσση*

Les Espagnols, ERIZO. *Gefn. Aldro.*

Les Portugais, OURISO; ou ORICO CACHERO. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, RICCIO, ou RIZO. *Gefn. Aldro.*

Les Allemands, IGL. *Gefn. Aldro. Rzac.*

Les Illyriens, GESS, ou MALOX, ou T2WHERZATKO, ou OTZUISCHAK. *Gefn.*

Les Polonois, IZ; ZIEMUX. *Rzac.*

Les Suédois, IGLKOTT. *Linn.*

Les Hollandois, YSEREN VEREKEN. *Gefn.*

Les Anglois, URCHIN, ou HEDGEHOG. *Raj. Gefn. Aldro.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 9 pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 2 $\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ 1 pollicis: Oculos habet parvos & exantès; aurículas latas, rotundas, & erectas; nares cristæ

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 9 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 2 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa queue d'un pouce. Ses yeux sont petits & à fleur de tête; ses oreil-

les larges , rondes & élevées ; ses narines dentelées comme la crête d'un Coq. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles : le pouce est plus court que les autres. Tout le dessus du corps, savoir le dos, les côtés, & le sommet de la tête sont couverts de picquants durs & pointus, variés de brun & de blanchâtre, dont les plus longs ont environ $1\frac{1}{2}$ pouce : & la tête, si l'on en excepte le sommet, la gorge, le ventre, les pieds & la queue sont couverts de poils bruns ou blanchâtres. Il a à chaque mâchoire 2 longues dents incisives ; les supérieures (Fig. 3. a.) sont éloignées l'une de l'autre, & les inférieures (Fig. 3. b.) presque contigues : & en outre de chaque côté de la mâchoire supérieure sont 4 petites dents canines séparées par paires, & 5 molaires, dont la première & la dernière sont plus petites que les 3 du milieu ; & de chaque côté de la mâchoire inférieure 3 petites dents canines contigues, & couchées obliquement en avant, & 4 molaires, dont la dernière est plus petite que les 3 autres : en tout 36 dents. On le trouve dans les bois.

tae Galli instar dentatas ; in singulis pedibus digitos 5 unguibus munitos, pollice alius digitis brevior. Corporis pars superior, dorsum scilicet, latera, & vertex capitis, aculeis teguntur rigentibus & acutis, ex fusco & albedo variis, majoribus $1\frac{1}{2}$ pollicem circiter longis : caput verò, verticem excepto, gutturem, ventrem, pedes, & caudam pili aut fusi aut albi cooperiunt. Dentes sunt incisores in utraque maxillâ duo longi, superiores (Fig. 3. a.) à se invicem distantes, inferiores (Fig. 3. b.) se contigui : canini in maxillâ superiore 4 utrinque parvi, per paria remoti ; in inferiore 3 utrinque parvi, contigui, oblique antrorsum inclinati : molares in maxillâ superiore 5 utrinque, quorum anterior & ulterior parvi sunt, intermediis majoribus ; in inferiore 4 utrinque, quorum 3 anteriores majores, & ulterior parvus : summa dentium 36. Habitat in sylvis.

2. LE HÉRISSEON DE SYBERIE.

Erinaceus auriculis planis... ERINACEUS SIBERICUS.

Erinaceus Sibericus. Seb. Vol. I. p. 79. Fig. T. 49. Mas F. 5. & femina F. 4. (Fig. optimis).

Acanthion echinatus. Echinus Sibiricus. Klein. Quadr. p. 66.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 183

Si figura, quam istius speciei *Seba* dedit, magnitudinem naturalem æquet, ab extremitate rostri ad caudæ initium, non ultra 6 pollices longus est. Auriculas habet breves & planas; rostrum breve, sicut & caudam, quæ 6 linearum longitudinem non superat; in singulis pedibus 5 digitos, pollice aliis brevior. Corporis pars superior vestitur aculeis crassius, brevibus, acuminatis, saturatè rufis, apicibus auro quasi obductis: venter verò tegitur pilis tenuissimis, laneis, dilutè cinereis, & auro quasi obductis. Habitat in *Siberiâ*.

Si la figure, qu'en a donné *Seba*, est de grandeur naturelle, il ne paroît pas avoir plus de 6 pouces, du bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Il a les oreilles courtes & applaties; le museau court, ainsi que la queue, qui a tout au plus 6 lignes de long; à chaque pied 5 doigts, dont le pouce est plus court que les autres. Toute la partie supérieure de son corps est couverte de picquants gros, courts, pointus, d'un roux foncé, & dont le bout paroît d'un jaune doré: son ventre est garni de poils fins, laineux, d'un cendré clair, & qui semblent dorés. On le trouve en *Siberie*.

3. LE HÉRISSON DE MALACCA.

Erinaceus auriculis pendulis... ERINACEUS MALACCENSIS.

Acanthion aculeis longissimis. Hystrix genuina; Porcus aculeatus, Malaccensis. Klein. Quadr. p. 66.

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda truncata. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 17. sp. 4.

Porcus aculeatus, seu Hystrix Malaccensis. Seb. Vol. I. p. 81. Fig. T. 51. F. 1. & 2.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad anum usque; 8 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitum, 2 $\frac{1}{2}$ pollicum. Oculi habet magnos & lucidos; auriculas nudas, ferè; & pendulas; in singulis pedibus 5 digitos unguibus brevibus minutos. Corporis pars supe-

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, environ 8 pouces: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 2 $\frac{1}{2}$ pouces: ses yeux sont grands & brillants; ses oreilles presque dénuées de poils, & pendantes: il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles courts. Tout le dessus de son corps est

hérissé de picquants droits & pointus, comme des *alènes*, de différente longueur, sçavoir depuis un pouce jusqu'à 6, variés en partie de blanc & de noir, & en partie de blanc & de rousâtre : les espaces qui sont entre ces picquants, sont remplis de poils déliés, longs & foyeux : sa tête est couverte de poils courts : ceux de son ventre, de ses jambes, & de ses pieds sont déliés, courts, picquants, épais, & roux. On le trouve à Java, à Sumatra, & surtout à Malacca.

rrior rectis & *subularum* instar acuminatis horret aculeis, à pollicari ad sesquipedalem usque mensuram variz longitudinis, partim ex albo & nigro, partim ex albo & subrufo variegatis : horum interstitia pilis replentur tenuibus, longis, & *setarum* amulis : caput brevibus pilis obsitum est : venter, crura, & pedes pilis rufis, brevibus, tenuibus, acuminatis, & densis. Habitat in Javâ, Sumatrâ, & præsertim Malaccâ.

4. LE HÉRISSEON D'AMÉRIQUE.

Erinaceus auriculis nullis... ERINACEUS AMERICANUS.

Erinaceus subauriculatus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 11. sp. 2.

Erinaceus Americanus albus. Seb. Vol. I. p. 78. Fig. T. 49. F. 3. [Fig. optima].

Echinus Indicus albus. Raj. Syn. Quadr. p. 232.

Acanthion echinatus; Erinaceus Americanus albus, Surinamensis. Klein. Quadr. p. 66.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 8 pouces de long. Sa tête est grosse & courte : son col est court, ainsi que sa queue, qui est couverte de très peu de poils. Il ne luy paroît point d'oreilles ; mais il a à leur place des trous, par lesquels il entend. Ses pieds ont chacun 5 doigts armés d'ongles longs, aigus & crochus. Toute la partie supérieure de son corps est couverte de

Corpus, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 8 circiter pollices longum est. Caput breve & crassum ; collum breve, sicut & cauda, quæ raris obsita est pilis. Auricularum nullum apparet vestigium ; sed loco ipsarum foramina sunt aperta, quibus sonum recipit. Pedes singuli in 5 fissi sunt digitos longis, acutis, & incurvis unguibus munitos. Corporis pars superior

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XII. 185

perior aculeis tegitur brevibus, crassis, rigidis, ex cinereo dilutè flavescens : capitis pars anterior, venter & pedes vestiuntur pilis setaceis albicantibus : qui ventrem cooperiunt, longiores & molliores sunt, quam qui *Erinacei nostratis* ventrem obtegunt : suprà oculos breves sunt pili obscurè fusci, ad latera verò retrorsum longi nigricantes. Habitat in *America*.

picquants courts, gros, durs, & d'un cendré tirant sur le jaune pâle : le devant de sa tête, son ventre & ses pieds sont couverts de poils soyeux & blanchâtres : ceux qui couvrent son ventre, sont plus longs, & moins rudes, que ceux qui couvrent le ventre de nos *Hérissons ordinaires* : il a au dessus des yeux des poils courts d'un brun foncé, & aux côtés vers le derriere des poils longs & noirâtres. On le trouve en *Amérique*.





ORDRE XIII.

ORDO XIII.

LES QUADRUPÈDES

QUADRUPEDA

Qui ont quatre dents incisives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

Dentibus incisivibus in utraque maxillâ quatuor, & digitis unguiculatis donata.

PARMILLES QUADRUPÈDES de cet Ordre, les uns ont tous les doigts séparés les uns des autres: les autres ont ceux des pieds de devant joints ensemble par une membrane étendue en ailes. Ils se divisent en deux Sections: dans la première sont ceux qui ont tous les doigts séparés les uns des autres, comme les *Singes*: dans la seconde sont ceux dont les doigts des pieds de devant sont joints ensemble par une membrane étendue en ailes, comme la *Rouffette*.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM alia sunt quorum digiti omnes à se invicem omninò sunt separati: alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter se connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum omnes digiti à se invicem separati sunt, sicut *Simia*: secunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter se connectuntur, sicut *Pteropus*.

SECTION I.

SECTIO I.

Ceux dont tous les doigts sont séparés les uns des autres.

Ea quorum digiti omnes à se invicem separati sunt.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, qui est celui des *Singes*.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, scilicet *Simiarum*.

X X I X.

Genus Simiæ.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ quatuor:
Digiti unguiculati,
Omnes à se invicem separati:
Pollex distinctus.

Obs. 1^o. Omnes Simiarum species ciliis in utraque palpebra donantur: 2 habent in pectore mammas; & anteriora & posteriora crura brachiis & cruribus hominum similia. Pedes anteriores manus hominum referunt, & manuum officium præstant: posteriores sunt velut manus majusculæ, & digitis, ut manus, constant, medio longiore; officiumque duplex, tum manuum scilicet, tum pedum præstant.

Obs. 2^o. Quædam nullam habent caudam; aliæ caudatæ sunt: ex utrisque aliæ sunt rostro brevi, aliæ rostro productiore: inter caudatas, aliæ caudam brevissimam, aliæ caudam longam habent. In 5 Stirpes dividuntur: prima est earum quæ nullam habent caudam, quæ sunt rostro brevi, quæque *Simia propriè dictæ* vocantur: secunda earum quæ nullam habent caudam, quæ sunt rostro productiore, quæque *Simia Cyncephala* dicuntur: tertia earum quæ caudam habent brevissimam, & *Papiones* dictæ sunt: quarta earum quæ caudam habent longam, quæ sunt rostro brevi, quæque *Cercopitheci simpliciter* dicuntur: quinta denique earum quæ cau-

X X I X.

Le Genre du Singe.

Son caractère est
D'avoir quatre dents incisives à
chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous séparés les uns des autres:
Le pouce bien distinct.

Obs. 1^o. Toutes les espèces de Singes ont des cils aux deux paupières, deux mamelles à la poitrine, & les jambes de devant & celles de derrière semblables aux bras & aux jambes de l'homme. Leurs pieds de devant ressemblent à la main de l'homme & en font l'office: ceux de derrière sont comme de grandes mains; leurs doigts sont semblables à ceux des mains, dont le milieu est le plus long: ils servent selon le besoin & de pieds & de mains.

Obs. 2^o. Quelques uns n'ont point de queue; les autres en ont: parmi les uns & les autres, les uns ont le museau court, & les autres l'ont allongé: parmi ceux qui ont une queue, quelques uns l'ont très courte; les autres l'ont longue. Ils se divisent en 5 Races: la première est de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau court, qu'on appelle *Singes proprement dits*: la seconde est de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau allongé, qu'on appelle *Singes Cynocéphales*: la troisième est de ceux qui ont une queue très courte, qu'on appelle *Babouins*: la quatrième est de ceux qui ont une queue longue, & le museau court, qu'on appelle *simplement Cercopithèques*: la cinquième est de ceux qui ont une queue longue, & le mu-

seu allongé, qu'on appelle *Cercopithecus Cynocéphales*.

dam habent longam, & sunt rostro productiore, quæque *Cercopithecus Cynocephali* nominantur.

Table Méthodique des Singes
divisez en cinq Races.

Tabulæ Synoptica Simiarum in
quinque Stirpes distinctarum.

LES Singes ou
N'ont point de queue; &
 { Le museau court... LE
 SINGE... Rac. I.
 { Le museau allongé... LE
 SINGE CYNOCÉPHALE...
 Rac. II.
 Ont une queue
 { Très courte... LE BA-
 BOUIN... Rac. III.
 { Longue; &
 { Le museau court... LE
 CERCOPITHEQUE...
 Rac. IV.
 { Le museau allongé...
 LE CERCOPITHEQUE
 CYNOCÉPHALE...
 Rac. V..

SIMIAE sunt vel
 { Ecaudatæ;
 { Rostro brevi... SIMIA...
 Stirps I.
 { Rostro productiore...
 SIMIA CYNOCÉPHA-
 LA... Stirps II.
 { Caudatæ;
 { Caudâ brevissimâ...
 PAPIO... Stirps III.
 { Caudâ longâ;
 { Rostro brevi... CER-
 GOPITHECUS...
 Stirps IV.
 { Rostro productiore...
 CERCOPITHECUS
 CYNOCEPHALUS...
 Stirps V..

RACE I.

STIRPS I.

Ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau court. *Eæ quæ sunt ecaudatæ, rostro brevi.*

LE SINGE.

SIMIA.

* * 1. LE SINGE.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis... SIMIA.

*Simia simpliciter dicta, caudâ carens. Raj. Syn. Quadr. p. 149:
Sloane. Vol. II. p. 328.*

Simia Gefn. Quadr. Fig. p. 957. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. p. 91. Fig. p. 92. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 96. Fig. T. 59 sub isto nomine, Simia 1 & 2. (Fig. sæpe bona).

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII. 189

Les Hébreux appellent le Singe KOPH. G^{sn}.

Les Chaldéens, KOPHIN. G^{sn}.

Les Grecs, HEBEUS.

Les Arabes, CATAPH. G^{sn}.

Les Espagnols, XIMTO. G^{sn}.

Les Italiens, SIMIA. G^{sn}.

Les Allemands, AFF. G^{sn}.

Les Illyriens, OPIZZE. G^{sn}.

Les Flamands, SIMÉ, ou SCHEMIKEL. G^{sn}.

Les Anglois, APE. G^{sn}. Raj.

Plurimas vidi Simiarum species, magnitudine tantummodo à se invicem discrepantes. Ipsarum facies, auriculæ, & unguis vultum, auriculæ & unguis hominum imitantur. Universum corpus, exceptis clunibus nudis, vestitur pilis ex viridescente & flavicante variegatis : pars corporis superior magis viridescit, inferior verò magis flavescit. Habitat in *Africa*.

J'ai vu plusieurs especes de Singes, qui ne différoient entre elles que par la grandeur. Leur face, leurs oreilles & leurs ongles sont assez semblables au visage, aux oreilles & aux ongles de l'homme. Le poil qui couvre tout leur corps, exceptés les fesses qui sont nues, est mêlé de verdâtre & de jaunâtre : le verdâtre domine dans la partie supérieure du corps, & le jaunâtre dans la partie inférieure. On les trouve en *Afrique*.

1. L'HOMME DES BOIS.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis, cæsarie faciem cingente... HOMO SYLVESTRIS.

Simia ecaudata, subrùs glabra. Satyrus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 1.

Simia Ourang outang, i. e. Homo sylvestris ; vir sylvarum. Klein. Quadr. p. 86.

Satyrus Indicus, Ourang outang Indis, & Homo sylvestris dictus. Charlat. Exer. p. 16.

Ourang outang, sive Homo sylvestris. Bont. Ind. ori. Fig. p. 24.

Ourang outang Indorum. Jonsl. Quadr. p. 97.

Baris. Euf. Nieremb. p. 179.

Les Anglois l'appellent CHIMPANZÉE. Klein.

Auctores omnes, qui hujus Simiæ mentionem fecerunt

Tous les Auteurs, qui ont parlé de cette espece de Singe,

A a iij

n'en ont rien dit autre chose, si ce n'est qu'elle est parfaitement semblable à l'homme, & que le mâle & la femelle ont le corps couvert d'un poil court, & assez doux. Il paroît, par la figure qu'en a donné *Bontius*, que sa tête est couverte de longs cheveux, qui croissent aussi sous le menton, & que sa face est nue. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

runt, nihil aliud de eâ retulerunt, nisi quod sit hominî simillima, & quod utrique sexui corpus pilosum sit, sed pilo brevi ac fatis leni. Figura, quam hujus dedit *Bontius*, caput obduetum longis crinibus sub mento etiam crescentibus, nudamque faciem demonstrat. Habitat in *Indiâ Orientali*.

3. LE SINGE DE CEYLAN.

Simia unguibus Indicis pedum posteriorum longis, incurvis, & acutis... SIMIA CEYLONICA.

Simia Ceylonica, superiori labio leporino. Klein. Quadr. p. 86.

Cercopithecus Ceylonicus, seu Tardigradus dictus, major. Seb. Vol. I. p. 75. Fig. T. 47. F. 1. (Fig. bona).

Elegantissimum animal, Musæi D. Charleton. Raj. Syn. Quadr. p. 161.

Si la figure, que nous a donné *Seba* de cet animal, est de grandeur naturelle, il a environ 9 pouces de long, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus: ses bras & ses jambes sont longues & menuës: sa lèvre supérieure est fendue comme celle d'un *Lievre*: tous ses ongles sont plats & arrondis, exceptés ceux de l'index des pieds de derrière, qui sont longs, recourbés, & aigus. Son poil est doux, soyeux, & d'un brun noirâtre; mais tout à fait noir sur le dos: celui qui couvre le ventre, les bras & les pieds, est plus court, & d'un cendré jaunâtre. On le

Si hujus animalis figura, quam *Seba* dedit, magnitudinem naturalem adæquet, à capitis vertice ad anum usque, 9 circiter pollices longum est. Brachia habet & crura longa & gracilia; labium superius, ut in *Lepore*, fissum; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis pedum posteriorum unguibus, qui longi sunt, incurvi & acuti. Pilus ei mollis est, & quasi sericeus, ex nigro fuscus; per dorsum vero planè niger: brevior tamen, & ex cinereo dilutè flavus, qui ventrem, brachia, pedesque ves-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII. 131
 tit. Habitat in Insulâ Ceylonensi. trouve dans l'Isle de Ceylan.

STIRPS II.

RACE II.

Ea quæ sunt ecaudata, rostro Ceux qui n'ont point de queue, &
productiore. qui ont le museau allongé.

SIMIA

LE SINGE

CYNOCEPHALA.

CYNOCÉPHALE.

** 1. LE SINGE CYNOCÉPHALE.

Simia Cynocephala unguibus omnibus planis & rotundatis...
 SIMIA CYNOCÉPHALA.

Simia ecaudata, clunibus tuberosis. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 2. sp. 3.*
 Simius Cynocephalus alter. *Prosp. Alp. Egypt. Vol. II. p. 241. Fig. T. 16.*
 [*Fig. bona*].
 Cynocephalus primus; *Jonst. Quadr. Fig. T. 59. (Fig. sat bona)*.

In omnibus, excepto rostro rostri *canini* instar producti, cum *Simia* convenit. Il ne diffère du Singe que par son museau allongé comme celui d'un chien : d'ailleurs il Plures vidi *Simiarum* cynocephalarum species magnitudine tantum à se invicem plusieurs, qui ne différeroient entre eux que par la grandeur. On discrepantes. Habitat in *Africâ*. les trouve en Afrique.

** 2. LE SINGE CYNOCÉPHALE DE CEYLAN.

Simia Cynocephala unguibus Indicis longis, incurvis, & acutis... SIMIA CYNOCÉPHALA CEYLONICA.

Simia ecaudata, unguibus Indicis subulatis. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 2. sp. 2.*
 Simia rostro canino, capite elato. *Klein. Quadr. p. 86.*
Animalculum Cynocephalum, Ceylonicum, Tardigradum dictum, Simii species. Seb. Vol. 1. p. 55. Fig. T. 35. Mas F. 1. Fam. F. 2. [Fig. bonis].

Minima est hæc species : Il est très petit. Selon la figure secundum enim figuram, qu'en a donné *Seba*, il n'a gué-
 quam hujus *Seba* dedit, 7 res plus de 7 pouces, du sommet

de la tête à l'anus. Ses oreilles sont rondes, larges, transparentes, sans poils, & d'un cendré clair; ses jambes longues, menues & couvertes de peu de poils; tous ses ongles plats & arrondis, exceptés ceux de l'index de chaque pied, qui sont longs, recourbés & pointus. Les poils qui couvrent le corps, sont longs, comme laineux, doux comme de la soie, & d'un rousâtre plus foncé sur le dos, & plus clair sur le ventre dans le mâle; & au contraire plus clair sur le dos, & plus foncé sur le ventre dans la femelle. On le trouve dans l'*Ile de Ceylan*.

pollicum longitudinem, à capitis vertice ad anum usque, non multum superat. Auriculas habet rotundas, laticas, pellucidas, glabras, & dilute cinereas; longa & gracilia crura, raris pilis oblita; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis singulorum pedum unguibus, qui longi sunt, incurvi, & acuti. Per universum corpus vestitur pilis longis, quasi laneis, & serici instar molliissimis, subrufis, saturatioribus in dorso, in ventre dilutioribus in mare; è contrà verò dilutioribus in dorso, & in ventre saturatioribus in foeminâ. Habitat in *Insula Ceylonensi*.

RACE III.

STIRPS III.

Ceux qui ont une queue très courte,

Ea quæ caudam habent brevissimam.

LE BABOUIN.

PAPIO.

I. LE BABOUIN.

PAPIO.

Simia semicaudata, ore vibrillato, unguibus acutis. Linn. Syst. nat. ed. 6: g. 2. sp. 5.

Cebus Papio; Baboon; Hyæna Gesneri. Klein. Quadr. p. 89.

Papio. Raj. Syn. Quadr. p. 158.

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 76.

Jonst. Quadr. p. 100. Fig. T. 61. sub isto nomine, Papio primus.

Papio, seu Arctopithecus. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 259. Fig. p. 260.

Babio. Charlet. Exer. p. 16.

Babouin. Kolbe. Tom. III. p. 55. Fig. p. 54. F. 2.

Les Italiens l'appellent BABUINO. Kolbe.

Les Allemands, PAVYON. Gesn. Aldro. Charlet.

Les

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII. 193

Les Suédois, BABIAN. Linn.

Les Hollandois, BAVIAAN. Kolbe.

Les Anglois, BABOON. Kolbe.

Les Hottentots, CHOAKAMNA. Kolby.

Canis Molossi magnitudinem circiter aequat. Illius instar, rostrum habet longum, in exitu obtusum. Cauda ipsius est admodum brevis, eamque semper erectam gerit. Nates sunt omnino glabrae, & colore sanguineo tinctae, tanquam cute detractae; crura brevia; ungues peracuti, & parumper lunati. Habitat in India solitudinibus.

Il est à peu-près de la grandeur d'un *Dogue*. Il a, comme luy, le museau allongé & obtus vers le bout. Sa queue est très-courte; il la porte toujours élevée. Ses fesses sont tout à fait dénuées de poils, & de couleur de sang, comme si on les avoit écorchées. Ses jambes sont courtes; & ses ongles très aigus, & un peu recourbés. On le trouve dans les déserts de l'Inde.

STIRPS IV.

RACE IV.

Ea quae caudam habent longam, & rostrum breve.

Ceux qui ont la queue longue, & le museau court.

CERCOPITHECUS.

LE CERCOPITHÈQUE.

** I. LE SAPAJOU BRUN.

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 13 est pollicum; caudae 14 $\frac{1}{2}$ pollicum; ambitus corporis, circa pectus, 7 $\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet fuscus; auriculas auriculis humanis similes. Caudam gerit spiraler intortam, ovis ope firmiter adheret rei quam apprehendit. Peruniversum corpus, excepto capitis vertice

La longueur de son corps; depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 13 pouces; celle de sa queue de 14 $\frac{1}{2}$ pouces; le tour de son corps, à la poitrine, de 7 $\frac{1}{2}$ pouces. Ses yeux sont bruns; ses oreilles ressemblent à celles de l'homme. Il porte sa queue roulée en spirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout son corps est couvert

B b

de poils bruns, plus foncés sur le dos que sous le ventre : le sommet de sa tête est noir : ses jambes & sa queue tendent à cette dernière couleur. Il est dans le cabinet de M. de Reaumur..

nigro, vestitur pilis fuscis in dorso saturationibus, in ventre verò dilutioribus : cauda & crura ad nigredinem tendunt. Ex museo Realmuriano.

** 2. LE SAFAJOU NOIR.

Cercopithecus niger, pedibus fuscis.

Cercopithecus, *Guariba* apud Brasilienses dictus. *Jonst. Quadr. p. 99. Fig. T. 61. sub isto nomine*, *Cercopithecus* Meer Katz. (*Fig. bona*).
Simia caudata, barbata, cauda prehensili. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 14.*
Cebus Guariba Marcgravii. *Klein. Quadr. p. 88.*
Guariba Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 153.*
Guariba Brasiliensibus, *Cercopithecus* species. *Marcgr. Hyl. Br. Fig. p. 126. [Fig. bona].*

Il est à peu-près de la grandeur d'un *Renard*. Il a la face élevée; les yeux noirs, & pleins de feu; les oreilles courtes, & rondes; la queue longue; nue vers son extrémité, & roulée en spirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout son corps, exceptés la moitié extérieure de sa queue & ses pieds, qui sont bruns, est couvert de poils longs, noirs, & brillants, mais si bien couchés les uns sur les autres que l'animal paroît lisse : ces poils sont plus longs sous la gorge & le menton, & lui font une espèce de barbe ronde. On le trouve au *Brazil*.

Vulpem nostratam magnitudine circiter æquat. Faciem habet elatam; oculos nigros, splendentes; auriculas breves & subrotundas; caudam longam, versus extremitatem nudam, quâ spiritaliter intortâ, firmiter adheret rei quam apprehendit. Per universum corpus, exceptis dimidiâ caudâ exteriori & pedibus, qui fuscii sunt, vestitur pilis longis, nigris, splendidibus, atque ita sibi incumbenibus ut animal læve appareat, sub gutture verò & mento longioribus, inque barbâ rotundam desinentibus. Habitat in *Brazil*.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XIII. 195

** 3. LE SAPAJOU CORNU.

Cercopithecus ex nigro & fusco variegatus, fasciculis duobus pilorum capitis corniculorum amulis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 14 pollicum; caudæ 15 pollicum. Oculos habet fuscus, splendentes; auriculas auriculis humanis similes; ungues longos & obrufos. Duo sunt in capitis vertice pilorum fascicula, corniculorum amula. Caudam habet pilis brevibus & splendentibus tectam, eamque semper gerit spiritaliter intortam, cujus ope firmiter adhæret rei quam apprehendit. Facies, latera, venter, & crura anteriora pilis fuscis; capitis verò vertex, medium dorsi, cauda, crura posteriora, & pedes 4 pilis nigris vestiuntur. Ex Museo *Realmuriano*.

La longueur de son corps; depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 14 pouces; celle de sa queue de 15 pouces. Ses yeux sont bruns, & pleins de feu. Ses oreilles ressemblent à celles de l'homme. Il a sur la tête deux bouquets de poils, qui lui font comme deux especes de petites cornes. Ses ongles sont longs & obtus: sa queue est couverte de poils courts & brillants: il la porte toujours roulée en spirale, & s'attache fortement par son moyen à tout ce qu'il peut joindre. Les poils qui couvrent sa face, ses côtés, son ventre, & ses jambes de devant, sont bruns; ceux qui couvrent le dessus de la tête, le milieu du dos, la queue, les jambes de derrière, & les 4 pieds, sont noirs. Il est dans le cabinet de *M. de Reaumur*.

** 4. LE SAPAJOU A QUEUE DE RENARD.

Cercopithecus pilis nigris, apice albido, vestitus, cauda pilis longissimis nigris obsita.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 6 est pollicum; caudæ 40 pollicum. Ungues habet

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 6 pouces; & celle de sa queue de 40 pou-

Bb ij

ces. Il a les ongles longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui sont plus courts & arrondis. Les poils qui couvrent sa face, sont très courts & blanchâtres : ceux de sa queue sont très longs & noirs : tout son corps est couvert de poils longs, noirs & terminés par un bout blanchâtre : sa gorge & son ventre sont d'un blanc sale. On le trouve dans la Guiane, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur.

longos & obtusos, unguibus tamen pollicum brevioribus & rotundatis. Pili brevissimi candicantes faciem obtegunt; longissimi verò sunt & omnino nigri, qui caudam cooperiunt : corpus pilis longis & nigris, in apice tantum albidis; guttur autem & venter pilis sordide albis vestiuntur. Habitat in Guianâ. Ex museo Realmuriano.

5. LE PETIT SINGE NÈGRE.

Cercopithecus totus niger.

Cercopithecus Brasiliensis secundus. Clus. Exot. p. 372.

Cay Brasiliensis Tououpinamboutiis dictus. Raj. Syn. Quadr. p. 153.

Ca apud Tououpinambutios. Jonst. Quadr. p. 100.

Il est très petit, & tout noir. Puffillus est, nigrique coloris. On le trouve au Brésil. Habitat in Brasiliâ.

6. LE SINGE DE GUINÉE.

Cercopithecus pilis ex umbrâ, griseo, fusco & flavo variegatis vestitus.

Cercopithecus Guineensis tertius Maregravii. Raj. Syn. Quadr. p. 157.

Cercopithecus Guineensis alius. Maregr. Hist. Br. p. 228.

Cebus tertius Guineensis. Klein. Quadr. p. 89.

Il a la tête petite, & sa queue longue. La couleur de son poil est mêlée d'ombre, de gris, de brun, & de jaune, & ressemble presque à celle du dos de notre Lièvre. On le trouve en Guinée & au Brésil. Caput huic parvum est, & cauda longa. Pileorum color ex umbra, griseo, fusco, & flavo variegatus, ferè ut in dorso Leporino. Habitat in Guinæâ & Brasiliâ.

7. LE SINGE MUSQUÉ.

Cercopithecus ex albido flavescens, moschum redolens.

Cercopithecus moscatus, Brasiliensibus Caicara dictus Jonst. Quadr. p. 100.

Cercopithecus Brasilianus primus. Clus. Exoc. p. 371.

Cebus moschum redolens, Brasiliensis: Caicara. Klein. Quadr. p. 88.

Caicara Brasiliensibus. Raj. Syn. Quadr. p. 155.

Marcgr. Hist. Br. p. 127.

Caput habet subrotundum; Il a la tête arrondie; le front
frontem haud elatam, & pen- très petit, & applati; le nez
nè nullam; nasum parvum, court, & camus; la queue cour-
& compressum; caudam ar- bée en arc. Tout son corps est
cuatam. Per universum corpus couvert de poils longs, d'un
pus vestitur pilis longis, ex blanc jaunâtre. Il répand une
albido flavescens. Mos- odeur de musc. On le trouve au
chum redolet. Habitat in Brésil.

Brasilid.

** 8. LE SAPAJOU JAUNE.

Cercopithecus pilis ex fusco, flavescens, & candicante varie-
gatis vestitus, pedibus ex flavo rufescentibus.

Cercopithecus minor luteus. Barr. Hist. Fr. eq. p. 151.

Cebus Simiolus Ceylonicus. Klein. Quadr. p. 88.

Simiolus Ceylonicus. Seb. Vol. 1. p. 77. Fig. T. 48. F. 3. (Fig. optima).

Les François de la Guiane l'appellent SAPAJOU JAUNE. Barr.

Longitudo corporis, à ca- La longueur de son corps
pitis vertice ad caudam us- depuis le sommet de la tête jus-
que, 7 $\frac{1}{2}$ pollicum est; cauda qu'à la queue, est de 7 $\frac{1}{2}$ pouces;
unius pedis. Auriculas habet & celle de la queue d'un pied.
rotundas, pilis longis, for- Il a les oreilles rondes, & cou-
didè albis, vestitis; ungues vertes de poils assez longs, &
longos & obtusos, exceptis d'un blanc sale: tous ses ongles
pollicum unguibus, qui bre- sont longs & obtus, exceptés
viores sunt & rotundati. Pi- ceux des pouces, qui sont plus
lus ei tenuissimus est & mol- courts & arrondis. Son poil, qui
lissimus, in parte corporis in est très fin, & très doux au tou-

B b iij.

cher, est blanchâtre dans la partie inférieure du corps, & mêlé de brun, de jaunâtre, & de blanchâtre dans la partie supérieure : ces couleurs sont plus foncées sur le dos qu'ailleurs. Ses 4 pieds sont d'un jaune roussâtre. Sa queue est de la même couleur que le dessus du corps dans toute sa longueur, excepté son bout, qui est noir. On le trouve à Ceylan & dans la Guinée.

On a envoyé de Cayenne à M. de Reaumur un Singe de cette espece, sous le nom de Singe de nuit.

feriore candicans, in superiore verò ex fusco, flavescente, & candicante variegatus : qui colores in dorso sunt saturatiores. Pedes 4 ex flavo rufescunt. Cauda, exceptâ extremitate nigrâ, ejusdem coloris est per totam longitudinem ac corpus superius. Habitat in Insulâ Ceylonensi & Guianâ.

A Cayennâ ad Illustr. Dom. de Reaumur hujus speciei Simia missa est sub nomine Simia nocturna.

** 2. LE SINGE VARIÉ.

Cercopithecus pilis ex nigro & rufo variegatis vestitus, pedibus nigris, caudâ cinerea.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 11 pouces ; & celle de la queue est d'environ 15 pouces. Il a de chaque côté de la mâchoire inférieure une espece de bourse assez grande pour contenir une grosse noix. Ses oreilles sont rondes ; ses ongles longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui sont plus courts & arrondis. Sa face est noire : les poils du dessus de la tête & du col sont mêlés de noir & de jaune : ceux des joues & des côtés du col, sont assez longs, blancs à leur origine, en-

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 11 est pollicum ; caudæ 15 circiter pollicum. In utroque latere maxillæ inferioris folliculum est crassi nucis juglandis continendæ aptatum. Auriculas habet rotundas ; ungues longos & obtusos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Facies ei est nigra : pili partem superiorem capitis & colli tegentes ex nigro & flavo variegati sunt ; qui verò genas & colli latera vestiunt, sat longi sunt, in exortu albi, & dein-

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XIII.* 19

de ex nigro & flavo variegati : qui dorsum cooperiunt ex nigro & rufo variegantur. Propè caudæ exortum, utrinque parva macula est alba. Crurum anteriorum pars exterior, & pedes 4 nigrescunt : crura posteriora ex fusco nigricant, paululum flavo & rufo mixtis : corporis pars inferior, & crurum interior albicant : cauda cinerascit. Ex museo *Realmuriano*.

suite mêlés de noir & de jaune : ceux du dos sont mêlés de noir & de roux. De chaque côté, auprès de l'origine de la queue, est une petite tache blanche. L'extérieur des jambes de devant, & les 4 pieds sont noirs : les jambes de derrière sont d'un brun noirâtre, mêlé de très peu de jaune & de roux : le dessous du corps & l'intérieur des jambes est blanc ; & la queue grise. Il est dans le cabinet de M. de Reaumur.

10. LE TAMARIND.

Cercopithecus pilis cinerascens, nigro mixtis, vestitus ; caudâ rufâ.

Cercopithecus minimus niger leontocephalus, auribus elephantinis. Barr. Hist. Fr. eq. p. 151.

Cagui major Brasiliensibus. Raj. Syn. Quadr. p. 154.

Jonst. Quadr. p. 99. Fig. T. 60.

Marçgr. Hist. Br. Fig. p. 217.

Les Congois l'appellent PONGI. Raj. Jonst. Marçgr.

Les Guianois, TAMARIND. Barr.

Faciem habet subrotundam ; os nigrum ; oculos nigros ; auriculas ferè rotundas, nigras, & pilis nudas ; caudam 15 circiter pollices longam, pilis rufis obstatam. Totum corpus vestitur pilis cinerascens, cum paucis nigro admixto : frons verò pilis nigris, cum cinereo mixtis. Habitat in Guianâ & Brasiliâ.

Il a la face arrondie ; le museau, & les yeux noirs ; les oreilles presque rondes, noires & sans poils ; la queue longue d'environ 15 pouces, & couverte de poils roux : ceux qui couvrent le corps, sont assez longs, gris, & mêlés d'un peu de noir : ceux du front au contraire sont noirs, mêlés de gris. On le trouve dans la Guiane & au Brésil.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII. 201

** 12. LE PETIT SINGE DE PARA,

Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris splendidibus, caudâ castanei coloris.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 7 est pollicum; caudâ 12 $\frac{1}{2}$ pollicum. Ungues habet longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum posteriorum pedum latis, planis, & rotundatis. Pilis longis, ferici instar mollissimis, ex cinereo albis, argenteis, in toto corpore vestitur: cauda verò tegitur pilis coloris castanei splendidis, ad nigredinem accedentis. Facies & auriculæ tinctæ sunt rubore ita splendente, ut naturalis non videatur. Habitat in *Brasilâ*. Ex museo *Realmuriano*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 7 pouces; celle de sa queue de 12 $\frac{1}{2}$ pouces. Ses ongles sont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derrière, qui sont larges, plats & arrondis. Tout son corps est couvert de poils longs, doux comme de la soie, d'un gris blanc argenté: ceux qui couvrent sa queue, sont d'un marron lustré, approchant du noir. Toute sa face & ses oreilles sont teintes d'un rouge si vif & si éclatant, qu'on a peine à croire qu'il soit naturel. On le trouve dans le *Brésil*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur*.

13. LE SINGE A QUEUE DE RAT:

Cercopithecus in dorso spadiceus, in ventre glaber; caudâ murinâ.

Cercopithecus Americanus minor, Monjé dictus. Seb. Vol. I. p. 52. Fig. T. 33. F. 1. (Fig. bona).
Cebus Caput mortuum vulgè. Klein. Quadr. p. 88.

Minima est hæc species. Nasum habet sumum; oculos profundè intrâ orbitas sitos; caput antrorsum rotundum, atro spadiceis pilis, ad

Cette espèce est très petite. Elle a le nez très court; les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites; la tête ronde en devant, & couverte, jusqu'à

C c

la racine du nez , de poils d'un noir qui tire sur le rouge , un peu plus allongée en arrière , & couverte de poils noirâtres. Sa face est blanchâtre ; le bout de son nez , & le tour de sa bouche sont noirs : beaucoup de rides contribuent à l'enlaidir. Ses oreilles sont dénuées de poils , assez grandes , & semblables à celles de l'homme : ses ongles sont courts & aplatis : sa queue est longue , assez grosse , & ressemble à celle d'un Rat. Les poils qui couvrent le dos , sont d'un rouge moins foncé que celui de la tête. Depuis le menton jusqu'au ventre , & à la partie intérieure des cuisses , la peau est entièrement chauve : la partie extérieure des cuisses , les pieds , & les reins sont couverts de très peu de poils , d'un jaune clair. On le trouve en Amérique.

nasi usque radicem , hispidum , retrorsum verò magis elongatum , pilis nigricantibus oblitum. Facies albicat , exceptis nasi extremitate & oris ambitu , ubi nigrescit : rugæ plurimæ illam deformem faciunt. Auriculæ sunt glabræ , majusculæ , auriculis humanis similes ; ungues breves & plani ; cauda longa , crassiuscula , caudæ *Murina* æmula. Pili dorsum regentes dilutiùs sunt spadiceï , quam qui caput vestiunt. A mento , per ventrem , usquè , perque internam femorum faciem , calva prorsus est & nuda cutis : lumbos verò , externam femorum partem , & pedes rari obsident pili dilutè flavescentes. Habitat in America.

** 14. LE SAGOUIN.

Cercopithecus taniis transversis alternatim fuscis & è cinereo albis variegatus , auriculis pilis albis circumdatis.

Cercopithecus Sagouin Clusii. Raj. Syn. Quadr. p. 160.

Jonst. Quadr. p. 100. Fig. T. 74. [Fig. bona].

Euf. Nieemb. p. 179. Fig. p. 177. (Fig. bona).

Cercopithecus Brasiliensis tertius. Sagouin. Clus. Exot. Fig. p. 372. (Fig. bona).

Simia caudata imberbis , unguibus pollicum subrotundis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 8.

Cebus Sagouin dictus. Klein. Quadr. p. 87. Fig. T. 3. (Fig. bona).

Galeopithecus , Sagouin à Brasiliensibus nominatus. Geßn. Icon. Quadr. Fig. p. 96. (Fig. mala).

Sagouin. Euf. Nieemb. p. 179. Fig. p. 177. (Fig. mala).

Id. de Lact. p. 553.

LES QUADRUPEDES, Classe 1. Ordre XIII. 209

Cagui minor. *Raj. Syn. Quadr. p. 154.*

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 227. [Fig. sat bona].

Caitaia. *Jonst. Quadr. Fig. p. 60. [Fig. ut supra].*

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 7 $\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet subrotundas, longis pilis albis circumdatis; ungues omnes longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum posteriorum pedum brevioribus & rotundatis. Pili totum corpus tegentes, tenuissimi sunt & mollissimi: qui partem corporis superiorem cooperiunt, sunt in exortu fusci, deinde rufi, & tandem ex fusco & à cinereo albo variegati, itaque dispositi, ut dorsum tæniis transversis alternatim fuscis & à cinereo albis variegatum appareat: qui verò partem corporis inferiorem obtegunt, sunt tantum ex fusco & cinereo albo variegati: guttur & caput pilis fuscis vestiuntur. Suprà nasum, inter oculos, macula inest alba. Cauda annulis alternatim ex fusco nigricantibus & à cinereo albis cingitur. Habitat in *Brasilid.*

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 7 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa queue de 11 pouces. Ses oreilles sont rondes, & entourées de longs poils blancs: tous ses ongles sont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derrière, qui sont courts & arrondis. Tous ses poils sont très fins, & très doux au toucher: ceux du dessus du corps sont bruns à leur origine, ensuite roux, & enfin variés de brun & de gris blanc, de sorte que le dos paroît rayé transversalement de ces deux dernières couleurs: ceux du dessous du corps, & des jambes sont de même variés de brun & de gris blanc: la tête & la gorge sont brunes. Audessus du nez, entre les deux yeux, est une tache blanche. La queue est annelée de brun noirâtre & de gris blanc. On le trouve au *Brésil.*

15. LE SINGE A QUEUE DE LION.

Cercopithecus ex flavo fuscus, caudâ in floccum desinente.

Cercopithecus non barbatus primus Clusii. Raj. Syn. Quadr. p. 160.

Clus. Exot. p. 371.

C c ij

Simia caudata imberbis fusco flava, pectore gulâque albis, caudâ floccosa. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 2. sp. 9.*
Cebus imberbis primus Clusii. Klein. *Quadr. p. 89.*

Tout son corps est couvert de poils d'une longueur médiocre, d'un jaune brun partout le corps, excepté à la gorge, & à la poitrine, où ils sont blancs. Sa queue est presque nue dans toute sa longueur, excepté son extrémité, qui se termine par un bouquet de longs poils..

Per universum corpus vestitur pilis mediocris longitudinis, ex flavo fuscis in toto corpore, exceptis gutture & pectore, in quibus albicant. Cauda non est valde hirsuta, sed levis quodammodo; extremitas autem ejus in longiorum pilorum floccum desinit.

16. LE SINGE-LION.

Cercopithecus collo pectoreque jubatis..

Cercopithecus non barbatus secundus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p. 160.*

Clus. Exot. p. 371.

Simia caudata imberbis, collo pectoreque jubatis. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 2. sp. 11.*

Cebus imberbis secundus Clusii. Klein. *Quadr. p. 89.*

Cette espèce est aisée à distinguer des autres par les poils longs, & blanchâtres, qui couvrent son col & sa poitrine, & qui luy font une crinière semblable à celle du *Lion*: c'est pourquoy je luy en ai donné le nom. Son museau est tout à fait brun; & sa tête est couverte de poils blanchâtres..

Facile ab aliis distinguitur hæc species longis pilis canescentibus, collum & pectus tegentibus, jubæ Leonine instar: undè nomen. Rostrum habet prorsus fuscum; caputque canescentibus pilis tectum.

** 17. LE SINGE VERD.

Cercopithecus ex cinereo flavescens; genis longis pilis albis oblitis.

La longueur de son corps, Corps longitudo, à compter depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est à peu près la même que celle du Singe-Lion.

LES QUADRUPEDES, *Classe I. Ordre XIII.* 205
 que, 15 pollicum; cauda 14 pollicum. Auriculas habet parvas & rotundas; unguës breves & rotundatos; genas longis pilis albis oblitatas. Pars superior capitis & dorsi pilis ex cinereo & flavescente variegatis; cauda, latera, & crurum pars exterior pilis cinereis; interior verò crurum, sicut & tota corporis pars infima, pilis albis vestiuntur. Ex museo Real-muriano. qu'à la queue, est de 15 pouces; & celle de sa queue de 14 pouces. Il a les oreilles petites & rondes; les ongles courts & arrondis; ses jouës sont couvertes de longs poils blancs: ceux qui couvrent le dessus de la tête & du dos, sont mêlez de gris & de jaunâtre: la queue, les côtés, & l'extérieur des jambes sont gris; & l'intérieur est blanc, ainsi que toute la partie inférieure du corps. Il est dans le Cabinet de M. de Reaumur.

** 18. LE GRAND SINGE DE LA COCHINCHINE.

Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flavicantibus oblitatis, torque ex castaneo purpurascente.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 2 circiter pedum est; cauda unius pedis cum 9 pollicibus. Auriculas habet auriculis humanis similes; unguës longos & obtusos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Torque donatur ex castaneo purpurascente: facies, postica crura, & pedes posteriores ejusdem sunt coloris. Genæ longis pilis ex albo flavicantibus, barbæque æmulis, oblitæ sunt. Capitis pars superior, corpus, & femora anteriora sunt cinerea: frons, scapularum superior pars, femora posteriora; & pedes antici nigri: cauda & La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 2 pieds; celle de sa queue est d'un pied 9 pouces. Ses oreilles ressemblent à celles de l'homme: ses ongles sont longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui sont courts & arrondis. Il a un collier d'une couleur de marron pourpré: sa face, ses jambes, & ses pieds de derrière sont de la même couleur. Ses jouës sont garnies de longs poils d'un blanc jaunâtre, qui lui font comme une espèce de barbe. Le dessus de la tête, le corps, & les cuisses de devant sont grises: le front, le dessus des épaules, les cuisses de derrière, & les

Cc iij,

pieds de devant sont noirs: la queue & les jambes de devant sont blanches: à la partie postérieure du dos, au dessus de l'origine de la queue, est une tache de la même couleur. On le trouve à la Cochinchine, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur.

crura anteriora alba: in super ad posticam dorsi partem, supra caudæ exortum, macula est ejusdem coloris. Habitat in Cochinchinâ. Ex museo Reaumuriano.

19. LE SINGE DE GUINÉE A BARBE JAUNASTRE.

Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex albo flavicantibus obsitis, ore cœrulescente.

Cercopithecus barbatus alius *Guineensis*. *Raj. Syn. Quadr. p. 156.*

Jonst. Quadr. p. 99.

Marsgr. Hist. Br. p. 118.

Simia caudata, genubus autibusque barbatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 1: sp. 11.*

Cebus barbatus alius *Guineensis*. *Klein. Quadr. p. 39.*

La couleur de ses poils, dans la plus grande partie de son corps, est noirâtre, mêlée d'une couleur d'ombre: son ventre est d'un gris bleuâtre: sa queue, depuis la moitié de sa longueur jusqu'à son extrémité, est d'un roux jaunâtre; son museau bleuâtre. Ses joues & ses oreilles sont couvertes d'une grande quantité de longs poils, d'un blanc jaunâtre, qui luy sont une espece de barbe. Ses jambes & ses pieds sont noirs. On le trouve en Guinée & au Brésil.

Pilorum color, in maximâ parte corporis, est nigricans, cui umbra admixta; in ventre autem è cinereo subcœrulescens: cauda, à medieta-te ad extremitatem usquë, ex rufo flavicans: os cœrulescit. In genâ utràque, uti & ad utramque auriculam, magnam copiam habet pilorum longiorum ex albo flavicantium, magnæ barbæ instar. Pedes & crura nigrescunt. Habitat in Guinæâ & Brasiliâ.

20. LE SINGE ROUGE DE CAYENNE.

Cercopithecus barbatus saturatè spadiceus.

Cercopithecus barbatus maximus, ferrugineus, stertorosus. *Barr. Hist. Fr. 24. p. 150.*

LES QUADRUPÉDES, Classe I. Ordre XIII. 267

Les François de la Guiane l'appellent SINGE ROUGE. Barr.

Les Guianois, ALAOÛATA. Barr.

Maximus est, & coloris saturatè spadicei. Hyoïdis structuræ singularis ope clamorem maximum edit. Habitat in Guianâ. Il est fort gros. Sa couleur est d'un rouge-bay foncé. Il fait en criant un bruit effroyable par le moyen de l'os hyoïde, qui est d'une structure singulière. On le trouve dans la Guiane.

21. LE SINGE BLANC A BARBE NOIRE.

Cercopithecus barbatus albus, barbâ nigrâ.

Simia alba, seu incans pilis, barba nigra promissâ. Raj. Syn. Quadr. p. 158.

Cebus Elaurandus Zeylanensium. Klein. Quadr. p. 89.

Les Zeyloniens l'appellent ELEWANDUM. Raj.

Pilis vestitur albis, barbâ que nigra promissâ gaudet. Habitat in Insulâ Zeylonensi. Il est tout blanc, excepté sa barbe, qui est noire & longue. On le trouve dans l'Isle de Zeyla.

22. LE SINGE NOIR A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus niger, barbâ incanâ.

Cercopithecus niger barbâ incanâ promissâ. Raj. Syn. Quadr. p. 158.

Klein. Quadr. p. 89.

Les Zeyloniens l'appellent WANDURU. Raj. Klein.

Pilis vestitur nigris, barbâ que incanâ promissâ datur. Habitat in Insulâ Zeylonensi. Il est tout noir, excepté sa barbe, qui est blanche & longue. On le trouve dans l'Isle de Zeyla.

23. LE SINGE DE GUINÉE A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis inspersis, barbâ albâ.

Cercopithecus barbatus Guineensis. Raj. Syn. Quadr. p. 156.

Jonst. Quadr. p. 99. Fig. T. 60.

Marrgr. Hist. Br. p. 227. Fig. p. 128.

Cebus barbatus. Exquima Guineensis. *Klein. Quadr. p. 89.*
Les Congois l'appellent EXQUIMA. *Raj. Jonst. Marogr.*

Ses poils sont bruns, piqués de petits points blancs : ceux du dos cependant sont d'une couleur plus obscure, ou comme d'une couleur de fer. La partie inférieure de son menton & son ventre sont blancs : il a aussi une barbe d'un beau blanc, composée de poils de 2 ou 3 doigts de long. On le trouve en Guinée & au Brésil.

Pilos habet fuscis ; sed per totum dorsum quasi adustos seu ferrugineos : fuscis autem pilis punctulatis inpersus est color albus. Venter albicat, & mentum inferius : barbam quoque egregiè albam habet, pilis 2 aut 3 digitos longis constatam. Habitat in Guinæ, & Brasiliâ.

24. LE SINGE BARBU

Cercopithecus barbatus, ex nigro & fusco mixtus, pectore & anteriore ventris parte albis, barbâ incanâ mucronatâ.

Cercopithecus barbatus secundus Clusii. Raj. Syn. Quadr. p. 159.

Clus. Exot. p. 371.

Simia caudata barbata, barbâ canâ, caudâ simplici. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 16.*

Cebus barbarus secundus Clusii. Klein. Quadr. p. 89.

Tout son corps, exceptés sa poitrine & la partie antérieure de son ventre, dont les poils sont blancs, est couvert de poils noirs, mêlés de brun, courts, très lisses, & très brillants. Il a au menton une barbe blanche, longue d'environ 6 pouces, & qui se termine en pointe. Sa queue est semblable à celle des *Cercopithèques* ordinaires.

Per universum corpus, exceptis pectore & ventris parte anteriore albis, vestitur pilis nigris, fusco admixto, brevibus, valdè teris, & nitidis. E mento propendit barba incana, 6 circiter pollices longa, & in mucronem definens. Cauda ei similis est formæ cum *Cercopithecorum* vulgarium caudis.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XIII. 283

25. LE SINGE BARBU A QUEUE DE LION.

Cercopithecus barbatus, suprâ ex nigro & fusco mixtus, infrâ albus, barbâ incanâ mucronatâ, caudâ in floccum desinente.

Cercopithecus barbatus primus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p. 159.*

Clus. Exot. Fig. p. 371. (Fig. bona).

Cercopithecus barbatus Clusii. *Jonst. Quadr. p. 99. Fig. T. 74. (Fig. bona);*

Euf. Nieemb. Fig. p. 177. (Fig. bona).

Simia caudata barbata, cauda floccosa. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 15.*

Cebus barbatus primus Clusii. *Klein. Quadr. p. 89.*

Magnitudine *Cercopithecus* Il est de la grandeur des grands
vulgares majores æquat. *Cercopithèques* ordinaires. Il a
Auriculas habet non magnas; les oreilles petites; le nez ca-
nares simas; unguis ungui- mus; les ongles presque sem-
bus *humanis* ferè similes; cau- blables à ceux de l'homme; la
dam valde longam, satisque queue très longue, assez grosse,
crassam, cujus extremitas in & terminée par un bouquet de
longiorum pilorum floccum longs poils, comme celle d'un
definit, *Leonina* caudæ instar. *Lion*. Toute la partie supérieure
Superior corporis pars tota de son corps est couverte de
nigris pilis tecta est, fusco poils noirs, mêlés de bruns; &
admixto; inferior verò long- la partie inférieure de longs poils
rioribus pilis albis obsita. E blancs. Il a au menton une bar-
mento propendet barba in- be blanche, longue de 9 pou-
cana, 9 pollices longa, in ces, & qui se termine en pointe,
mucronem desinens.

26. LE SINGE NOIR D'EGYPTE.

Cercopithecus barbatus, niger, cæsarie proluxâ nigrâ faciem cingente.

Simia caudata, cæsarie proluxâ faciem cingente. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 13.*

Simia callitrix magnitudine magnorum *Cynocephalorum*. *Prosp. Alp. Ægypti. Vol. II. p. 244. Fig. T. 21. (Fig. bona).*

Magnos *Cynocephalos* ma- Il est de la grandeur des grands
gnitudine æmulatur. Per uni- *Cynocéphales*. Il est noir par tout

D d

le corps, & surtout à sa face, qui est toute entourée de longs poils noirs. On le trouve en *Egypte*.

versum corpus est niger, præsertim in facie, quæ undequaque cæsarie prolixâ nigrorum pilorum circumdata. Habitat in *Ægypto*.

27. LE SINGE ROUX D'EGYPTE.

Cercopithecus barbatus, rufus, facie nigrâ, cæsarie albâ cinctâ.

Simius callitrix, *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 244. Fig. T. 20. F. 4.*

Il est de la grandeur d'un grand *Chat*. Il a la tête petite & ronde; la face semblable au visage de l'*homme*; le corps très effilé vers les flancs; la queue longue & rousse. Tout son corps est couvert de poils roux: sa face est noire & entourée de tous côtés d'une chevelure blanche; ce qui luy donne l'air d'un vieillard. On le trouve en *Egypte*.

Fêlem magnam quadamtenus magnitudine æmulator. Caput habet parvum & rotundum; faciem vultui *humano* similem; corpus circâ ilia gracillimum; caudam longam & rutilam. Per universum corpus vestitur pilis rufis: facies ei est nigra, undique cæsarie albâ cinctâ; undè faciem senilem habere videtur. Habitat in *Ægypto*.

** 28. LE PETIT SINGE DU MEXIQUE.

Cercopithecus pilis ex fusco & rufo vestitus, facie ultrâ aurículas usque nigrâ & nudâ, vertice longis pilis albis obdito,

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces; & celle de sa queue d'environ 1 pied. Ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*: ses ongles sont longs, crochus & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derrière, qui sont

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 7 circiter est pollicum; caudæ 1 circiter pedis. Auriculas habet auriculis *humanis* similes; ungues longos, incurvos & acutos, exceptis pollicum pedum posteriorum unguibus latis, planis & ro-

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XIII.* 217

tundatis. Facies ei est nigra & nuda ultrà aurículas usque: vertex capitis longis pilis albis oblitum est. Corporis pars superior vestitur pilis ex fusco & rufo variegatis, ferè ut in dorso *Leporino*; corporis verò inferior pars & pedes 4 pilis candicantibus teguntur. Cauda, ab exortu ad medietatem usque, pilis rufis, à medietate ad apicem, pilis nigris vestitur. Habitat in *Mexico*, undè à R. P. Bernard Franciscano vivus advectus est.

larges, plats & arrondis. Sa face est noire, & dénuée de poils jusqu'au-delà des oreilles : & le sommet de sa tête est couvert de longs poils blancs. Tout le dessus de son corps est couvert de poils variés de brun & de roux, à peu-près comme le dos de nos *Lièvres ordinaires*: ceux qui couvrent le dessous du corps & les 4 pieds sont blanchâtres. Sa queue, depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, est rousse: le reste est noir. On le trouve au *Mexique*, d'où le R. P. Bernard Cordelier l'a apporté vivant.

**** 29. LE BELZÉBUT.**

Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, caudâ inferiùs versùs apicem pilis destitutâ... BELZEBUT.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudæ exortum, 15 pollices æquat; caudæ 2 pedes; crurum anteriorum, ab eorum exortu ad unguem apicem, unum pedem & 6 pollices: crura posteriora paria sunt longitudinis. Ambitus corporis, circa pectus mensuratus, quâ parte crassius est, 1 pedem & 6 lineas attingit. Aurículas habet auriculis humanis similes, & nigras. Facies, caput, pars dorsî anterior, partes exteriores femorum anteriorum, femorum & crurum postero-

La longueur de son corps; depuis le sommet de la tête jusqu'à l'origine de la queue, est de 15 pouces; celle de sa queue de 2 pieds; celle de ses jambes de devant, depuis leur origine jusqu'au bout des ongles, de 1 pied 6 pouces; & celle de ses jambes de derrière aussi de 1 pied 6 pouces. Le tour de son corps, mesuré à la poitrine; où il est le plus gros, est de 1 pied 6 lignes. Ses oreilles ressemblent à celles de l'homme, & sont noires. Sa face, sa tête, la partie antérieure du dos, les parties extérieures des cuisses de de-

vant, & des cuisses & des jambes de derriere, ses jambes de devant, ses quatre pieds, & sa queue sont noirs : la partie postérieure du dos est d'un brun noir : ses côtés sont roux : toute la partie inférieure du corps, sçavoir la gorge, la poitrine, le ventre, les parties intérieures des cuisses de devant, & des cuisses & des jambes de derriere sont d'un blanc sale & jaunâtre. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : c'est le pouce qui manque à ceux de devant. Sa queue se termine en pointe, & est couverte de poils dans toute sa longueur, excepté sa partie inférieure, depuis son bout jusqu'au tiers de sa longueur, qui est couverte d'une peau sillonnée, pareille à celle de la plante des pieds : aussi cette queue luy sert comme d'une cinquième jambe : elle fait l'office de main, & luy sert pour porter la nourriture à sa bouche. Il est dans le cabinet de *M. de Reaumur*.

Je lui ai laissé le nom de *Belzebuth*, qui est celui sous lequel il a paru à Paris aux yeux du Public.

rum, crura anteriora, cauda, & pedes quatuor nigri sunt; pars dorsi posterior est ex fusco nigra: latera rufescunt: corporis inferior pars tota, guttur scilicet, pectus, venter, partes interiores femorum anteriorum, femorum & crurum posteriorum exordidè albo flavicant. 4 habet in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus verò 5; pollice autem in pedibus anterioribus destituitur. Cauda in acumen desinit, pilisque vestitur per totam longitudinem, exceptâ parte inferiore ab apice ad tertiam longitudinis partem, quæ cute sulcatâ, cutis plantæ pedum æmulâ, tegitur; quamobrem cauda sua, sicut quinto pede utitur: manuum enim officium præstat, & hujus ope cibum ori admovet. Ex museo *Reaumuriano*.

Illum Belzebuth nomine donavi, sub quo Parisiis in Publicum editus est.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII, 213

STIRPS V.

RACE V.

Ea quæ caudam habent longam, & rostrum productius. *Ceux qui ont la queue longue, & le museau allongé.*

CERCOPITHECUS.

CYNOCEPHALUS.

LE CERCOPITHÈQUE;

CYNOCÉPHALE.

** I. LE CERCOPITHÈQUE CYNOCÉPHALE.

Cercopithecus Cynocephalus ex viridescensibus & flavicantibus pilis variegatus.

Cercopithecus. Jonst. Quadr. Fig. T. 59. (Fig. bonâ).

In omnibus, exceptis caudâ, quâ donatur, & rostro, *Il ne diffère du Singe que par ce qu'il a une queue, & par son rostri Canini instar, productio, museau allongé comme celui d'un Chien: d'ailleurs il luy ressemble en tout. J'en ai vu plusieurs, qui ne différoient entr'eux que par la grandeur. On les trouve en Afrique.*
cum *Simia* convenit. Plurimas vidi *Cercopithecorum* *Cynocephalorum* species magnitudine tantum à se invicem discrepantes. Habitat in *Africa*.

2. LE MAKAKE.

Cercopithecus Cynocephalus naribus bifidis, elatis, natibus calvis.

Cercopithecus Angolensis major, Congensibus Macaquo, Marcgravii.

Raj. Syn. Quadr. p. 155.

Marcgr. Hist. Br. p. 227.

Cercopithecus Angolensis major, Marcgravii. Barr. Hist. Fr. eq. p. 149.

Simia caudata imberbis, naribus elatis, bifidis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2.

sp. 10.

Cebus Angolensis major, Macaquo Marcgravii. Klein. Quadr. p. 89.

Macaquo Congensium. Jonst. Quadr. p. 100.

Les François de la Guiane l'appellent MAKAKE. Barr.

Corporis longitudo, à capite ad caudam usque, unius La longueur de son corps; depuis la tête jusqu'à la queue;
pedis est & amplius; capitis est de plus d'un pied; celle de

D d ij

sa tête de 6 doigts ; celle de sa queue d'un pied. Ses 4 jambes sont d'une longueur égale, savoir de 10 doigts chacune. Ses pieds de devant sont longs de 3 $\frac{1}{2}$ doigts, & ceux de derrière de 5 doigts. Le tour de son corps, dans l'endroit où il est le plus gros, est d'un pied 9 pouces. Il a les narines fendues en deux, & élevées ; les fesses chauves. Il porte toujours sa queue courbée en arc. La couleur des poils de tout son corps est la même que celle d'un *Loup*. On le trouve dans le Royaume d'*Angola*, & dans la *Guiane*.

6 digitorum ; caudæ unius pedis. Crura 4 æqualis sunt longitudinis, 10 digitorum singula. Pedes anteriores 3 $\frac{1}{2}$ digitos, posteriores verò 5 longi sunt. Ambitus corporis maximus unum pedem & 9 digitos æquat. Nares habet bifidas & elatas ; nates calvas. Caudam semper gestat arcuatam. Color pilorum totius corporis color *Lupi* simillimus. Habitat in Regno *Angolensi*, & *Guiani*.

** 3. LE MAGOT, OU TARTARIN.

Cercopithecus Cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obstita, naso violaceo nudo.

Cynocephalus. *Géfn. Icon. Quadr.* p. 92. *Fig. p. 93.* (*Fig. bona*).

Jonst. Quadr. p. 100. *Fig. T. 59. sub isto nomine*, *Cynocephalus secundus*. (*Fig. bona*).

Clus. Exot. Fig. p. 370. (*Fig. bona*).

Mainnon quorundam. *Géfn.*

Il est environ de la grandeur d'un *Dogue*. Il a à peu-près la forme des *Cercopithèques* ordinaires ; mais il a le corps plus épais & plus fort. Tous ses poils sont d'un gris blanchâtre : ceux qui couvrent la partie antérieure du corps, sont très longs ; les autres sont courts. Son nez est fort gros, dénué de poils, cannelé selon sa longueur, & d'une

Canem Molossum magnitudine circiter æquat. Ejusdem ferè formæ est cujus *Cercopithecus vulgaris* ; at in corporaturâ crassior & validior. Per universum corpus vestitur pilis ex cinereo albidis, in parte corporis anteriore longissimis, in reliquo corpore brevioribus. Nasum habet crassissimum, pilis nudum,

LES QUADRUPÈDES, Classe 1. Ordre XIX. 215
 longitudinaliter striatum, & couleur violette. On le trouve
 violacei coloris. Habitat in en Asie & en Afrique.
 Asia & Africa.

SECTIO II.

*Ea quorum digiti pedum anteriorum membrana, in alas expansa, inter se connec-
 tuntur.*

UNICO Genere, scilicet *Pteropi*, constituitur hæc Sectio.

XXX.

Genus Pteropi. (Fig. 4.)

Hujus character est
 Dentes incisores in utraque
 maxilla quatuor (Fig. 2, 2, 2, 2):
 Digiti unguiculati,
 In anterioribus pedibus mem-
 brana, in alas expansa, inter
 se connexi, in posteriori-
 bus à se invicem separati.

Obs. 1^o. Primo inspectu, Pteropus vesperilionis Generis esse videtur: sicut ille, pedes habet anteriores in alas expansos: ab eo tamen differt dentium incisorum (Fig. 4 a, a.) numero & figura, & rostro multò productiore quam vesperilionis rostrum.

Obs. 2^o. Omnes hujus Generis species anterioribus cruribus donantur longissimis, quorum pedes dividuntur in 5 digitos longos,

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant sont joints ensemble par une membrane étendue en ailes.

CETTE Section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Rouffette*.

XXX.

Le Genre de la Rouffette. (Fig. 4.)

Son caractère est
 D'avoir quatre dents incisives à
 chaque mâchoire (Fig. 4, 2, 2, 2, 2):
 Les doigts onguiculés,
 Joints ensemble par une mem-
 brane étendue en ailes dans
 les pieds de devant, & sepa-
 rés les uns des autres dans
 ceux de derrière.

Obs. 1^o. Au premier coup d'œil, la Rouffette semble être du Genre de la Chauve-Souris: comme elle, elle a les pieds de devant étendus en ailes: mais elle en diffère par le nombre & la figure de ses dents incisives (Fig. 4. a, a.), & par la forme de son museau, qui est beaucoup plus allongé que celui de la Chauve-Souris.

Obs. 2^o. Toutes les espèces de ce Genre ont les jambes de devant très longues, dont le pied est divisé en 5 doigts longs, & tous (excepté le

pouce qui est séparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints ensemble par une membrane, qui n'est autre chose qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col jusqu'à l'anus, tout le long des jambes, & jusqu'au bout des doigts des pieds de devant: c'est par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les pieds de derrière sont divisés en 5 doigts armés d'ongles crochus & très pointus.

omnes (excepto pollice ab aliis separato, incurvoque & valido ungue munito) membranâ inter se connexos; quæ membrana nihil aliud est quam dorſi cutis continuata, in utroque latere, à collo ad anum usque, & secundum crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extensâ, cujus ope volitant. Pedes postici in 5 digitos incurvis & acutissimis unguibus munitos sunt divisi,

** 1. LA ROUSSETTE.

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis,

Vespertilio caudâ nullâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sp. 1.

Vespertilio Cynocephalus Ternatanus. Klein. Quadr. p. 61.

Vespertilio Borslappæ. Gessn. avi. p. 771.

Vespertilio ingens. Clus. Exot. p. 94.

Canis volans Ternatanus Orientalis. Seb. Vol. I. p. 91. Fig. T. 57. Mas

F. 1. Fam. F. 1. [Fig. optimis],

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus, est de 7 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du nez, de 2 pouces 9 lignes. Ses oreilles sont courtes, & un peu pointues. Elle n'a point de queue. Lorsque la membrane, qui lui sert à voler, est étendue, elle a plus de 3 pieds de long d'un bout à l'autre; elle est couverte de très peu de poils: ceux qui couvrent le corps, sont dans quelques individus d'un roux plus foncé sur le dos que sur le ventre, & dans d'autres ils sont noirs: la partie antérieure de la

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum usque, 7 $\frac{1}{2}$ pollicum est; capitis, à vertice ad nasi extremitatem, 2 pollicum cum 9 lineis. Auriculas habet breves & acutiusculas. Caudâ caret. Membrana volatui inserviens extensa, ab unâ extremitate ad aliam trium pedum longitudinem superat, rarissimisque pilis tegitur, Pili corpus tegentes in quibusdam individuis sunt rufi, saturatiore in dorso, in ventre dilutiores; in aliis verò nigri: capitis partem anteriorem & rostrum vestiunt pili rufi. Habitat in Borbonid,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XIII. 217

Borboniâ, & *Ternatanâ* Insulis.

tête & le museau sont couverts de poils roux. On la trouve dans les Isles de *Bourbon*, & *Ternate*.

** 2. LA ROUSSETTE A COL ROUGE.

Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, collo superiore rubro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum usquë, 5 $\frac{1}{2}$ pollicum; capitis, à vertice ad nasi extremitatem, 1 $\frac{1}{2}$ pollicis. Auriculas habet breves & acutiusculas. Caudâ caret. Membrana volatui inserviens, extensa, ab unâ extremitate ad aliam 2 circiter pedes longa est. Per totum corpus vestitur pilis fuscis, exceptâ parte colli superiore, quam pili rubri cooperiunt. Habitat in *Borboniâ* Insulâ. Ex museo *Realmuriano*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus, est de 5 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du nez, de 1 $\frac{1}{2}$ pouces. Ses oreilles sont courtes & un peu pointues. Elle n'a point de queue. Lorsque la membrane, qui luy sert à voler, est étendue, elle a environ 2 pieds de long d'un bout à l'autre. Tout son corps est couvert de poils bruns, excepté la partie supérieure du col, qui est couverte de poils rouges. On la trouve dans l'Isle de *Bourbon*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur*.

3. LA ROUSSETTE A LONGUES OREILLES.

Pteropus auriculis longis, patulis, naso membranâ antroorsum inflexâ aucto.

Vespertilio Cynocephalus maximus, auritus, ex novâ Hispaniâ. *Klein. Quadr. p. 61.*

Canis volans maximus, auritus, ex Novâ Hispaniâ. *Seb. Vol. I. p. 92. Fig. T. 58. F. 1. (Fig. bona).*

A præcedentibus differt auriculis suis longis, patulis & Elle differe des précédentes par ses oreilles, qui sont lon-

E 2

gues , ouvertes , & redressées ;
& par son nez , audeffus duquel
est une espece de membrane re-
courbée en avant , comme une
corne. On la trouve dans la *Nou-
velle Espagne*.

arrectis ; & naso , suprà quem
extat membrana quædam an-
trorsum inflexa , & cornu si-
milis. Habitat in *Novâ His-
paniâ*.



ORDO XIV.

QUADRUPEDA

Dentibus incisforibus in maxilla superiore quatuor, in inferiore sex; & digitis ungiculatis prædita.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM, sicut in Ordine præcedente, alia sunt quorum digiti omnes à se invicem omninò sunt separati; alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter se connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum digiti omnes à se invicem separati sunt, sicut *Prosimia*: secunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter se connectuntur, sicut *Vespertilio*.

ORDRE XIV.

LES QUADRUPÉDES

Qui ont quatre dents incisives à la mâchoire supérieure, & six à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

PARMI les QUADRUPÉDES de cet Ordre, comme dans l'Ordre précédent, les uns ont tous les doigts séparés les uns des autres; les autres ont ceux des pieds de devant joints ensemble par une membrane étendue en ailes. Ils se divisent de même en deux Sections: dans la première sont ceux qui ont tous les doigts séparés les uns des autres, comme le *Maki*: dans la seconde sont ceux dont les doigts des pieds de devant sont joints ensemble par une membrane étendue en ailes, comme la *Chauve-Souris*.

SECTIO I.

Ea quorum digiti omnes à se invicem separati sunt.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, scilicet *Prosimia*.

SECTION I.

Ceux dont tous les doigts sont séparés les uns des autres.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, sçavoir celui du *Maki*.

Ee ij

X X X I.

Le Genre du Maki.

(Fig. 5.).

Son caractère est

D'avoir quatre dents incisives
à la mâchoire supérieure
(Fig. 5. a.), & six à l'inférieure

(Fig. 5. b.):

A chaque pied cinq doigts on-
guiculés,

Tous séparés les uns des autres :

Le pouce bien distinct.

Obs. 10. Toutes les espèces de ce Genre ont les dents incisives de la mâchoire supérieure (Fig. 5. a, a.) séparées par paires & convergentes; celles de la mâchoire inférieure (Fig. 5. b.) sont très étroites, toutes contiguës, couchées obliquement, & avancent en avant. Elles ont 12 dents canines, savoir trois de chaque côté à chaque mâchoire (Fig. 5. c.), lesquelles sont larges, plates, & se terminent en pointe; & quatre dents molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, & 3. de chaque côté à l'inférieure; en tout 36 dents.

Obs. 20. Leurs ongles sont larges, plats, & terminent par une pointe obtuse, excepté celui de l'index des pieds de derrière, qui est plus étroit & plus long. Leurs pieds de devant sont l'office de mains.

X X X I.

Genus Prosimia.

(Fig. 5.).

Hujus character est

Dentes incisores in maxillâ
superiore quatuor (Fig. 5. a.),
in inferiore sex (Fig. 5. b.):

In singulis pedibus digiti
quinque unguiculati,

Omnes à se invicem separati :

Pollex distinctus.

Obs. 10. Omnium hujus Generis specierum dentes incisores in maxillâ superiore (Fig. 5. a, a.) sunt per paria remoti & convergentes; in inferiore (Fig. 5. b.) verò strictiores, contigui, obliquè inclinati, & prominentes: canini sunt duodecim, tres utrinque (Fig. 5. c.) in utraq. maxillâ, lati, plani, & in acumen desinientes; molares 4 utrinque in maxillâ superiore, tres utrinque in inferiore; summa dentium 36.

Obs. 20. Ungues habent latos, planos, in acumen obtrusum desinientes, excepto ungue indicis posteriorum pedum strictiore, & longiore. Pedibus anterioribus promanibus utuntur.

* * 1. LE MAKI.

Prosimia fusca.

Simia Sciurus lanuginosus fuscus, &c. *Gaz. Pet. Fig. T. 17. F. 5.* (Fig. optima).

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XIV.* 221

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 11 pollicum; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 3 pollicum; caudæ unius pedis cum 4 ½ pollicibus. Rostrum habet elongatum & acutum; aurículas breves, inque pilis ferè occultatas. Per universum corpus vestitur pilis mollibus, & quasi laneis, fuscis in toto corpore, exceptis naso, gutture, & ventre sordidè nigris: in posteriore dorsi parte fuscus paululum ad rufum tendit. Habitat in *Madagascariâ*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 11 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 3 pouces; celle de sa queue d'un pied 4 ½ pouces. Son museau est allongé & pointu: ses oreilles sont courtes, & presque cachées dans ses poils. Tout son corps est couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & le ventre, qui sont d'un blanc sale: le brun tend un peu au roux vers la partie postérieure du dos. On le trouve à *Madagascar*.

** 2. LE MAKI AUX PIEDS BLANCS.

Prosimia fusca, naso, gutture, & pedibus albis.

Magnitudine præcedentem adæquat. Sicut ille, breves habet aurículas, & in pilis ferè occultas; & rostrum elongatum & acutum. Pilis mollibus, & quasi laneis, in toto corpore fuscis, exceptis naso, gutture & pedibus albis, & ventre sordidè albo, vestitur. Ex museo *Realmuriano*. Habitat in *Madagascariâ*.

Il est de la grandeur du précédent. Il a, comme lui, les oreilles courtes, & cachées dans ses poils; & le museau allongé & pointu. Tout son corps est couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & les 4 pieds, qui sont blancs, & le ventre qui est d'un blanc sale. Il est dans le Cabinet de M. de *Reaumur*. On le trouve à *Madagascar*.

** 3. LE MAKI AUX PIEDS FAUVES.

Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigrâ, pedibus fulvis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque,

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à

E e ij.

la queue, est de 13 ou 14 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 3 pouces 3 lignes; & celle de sa queue d'un pied 5 pouces. Son museau est allongé & pointu : ses yeux sont d'un jaune roux : ses oreilles sont longues de 10 lignes, & larges d'environ 1 pouce. Tout son corps est couvert de poils doux & laineux, bruns pardessus le corps, & à la partie extérieure des jambes, & d'un blanc sale & jaunâtre pardessous le corps, & à la partie intérieure des jambes. Sa face & son museau sont noirs; ses 4 pieds fauves; les poils qui couvrent le dos, sont mêlés d'un peu de rousâtre. Il est dans le cabinet de M. de Reaumur. On le trouve à *Madagascar*.

13 est aut 14 pollicum; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 3 pollicum cum 3 lineis; caudæ unius pedis cum 5 pollicibus. Rostrum habet elongatum & acutum; oculos ex flavo rufos; aurículas 10 lineas longas, & uno pollice latas. Per universum corpus vestitur pilis mollibus, & quasi laneis, in partibus corporis superiore, & crurum exteriorum fuscis, & in partibus corporis inferiore, & crurum interiorum ex fordide albo flavicantibus. Facies & rostrum nigrescunt; pedes 4 sunt fulvi: pilis fuscis dorsum tegentibus aliquid rufi admixtum est. Ex museo *Realmuriano*. Habitat in *Madagascariâ*.

** 4. LE MAKI A QUEUE ANNELLÉE.

Prosimia cinerea, caudâ cinctâ annulis alternatim albis & nigris.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est d'environ 1 pied; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 3 pouces; celle de sa queue d'environ 1 $\frac{1}{2}$ pied. Son museau est blanchâtre & pointu : ses oreilles sont longues de 10 lignes, & larges d'autant, & couvertes de poils blancs. Tout son corps est couvert de poils

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, unius est circiter pedis; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 3 pollicum; caudæ circiter 1 $\frac{1}{2}$ pedis. Rostrum habet albidum & acutum; aurículas 10 lineas longas, totidem latas, pilis albis obsitas. Universum corpus vestitur pilis longis, mollibus, & quasi laneis, in par-

LES QUADRUPÈDES, *Classe 1. Ordre XIV.* 223

tibus corporis superiore , 4 crurum exteriore , & pedibus anterioribus in exortu rufis , deinde cinereis , itaque dispositis ut animal cinereum appareat ; in partibus verò corporis inferiore , 4 crurum inferiore , & posterioribus pedibus albis. Cauda annulis alternatim albis & nigris cingitur. Habitat in *Madagascariâ*. Ex museo *Realmuriani*.
longs , doux & laineux : ceux du dessus du corps , des pieds de devant , & de l'extérieur des 4 jambes sont roux à leur origine , & terminés de gris , de façon qu'il n'y a que cette dernière couleur qui paroisse : ceux du dessous du corps , des pieds de derrière , & de l'intérieur des 4 jambes sont blancs. Sa queue est annelée alternativement de noir & de blanc. On le trouve à *Madagascar*. Il est dans le Cabinet de M. de Reaumur.

SECTIO II.

Ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ , in alas expansâ , inter se connectuntur.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus , scilicet *Vespertilionis*.

XXXII.

Genus *Vespertilionis*.
(Fig. 6.).

Hujus caractere est
Dentes incisores in maxillâ superiore quatuor (Fig. 6. a.), in inferiore sex (Fig. 6. b.).

Digiti unguiculati,
In anterioribus pedibus membranâ , in alas expansâ , inter se connexi , in pos-

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant sont joints ensemble par une membrane étendue en ailes.

CETTE Section ne contient qu'un seul Genre , qui est celui de la *Chauve-Souris*.

XXXII.

Le Genre de la *Chauve-Souris*.
(Fig. 6.).

Son caractere est
D'avoir quatre dents incisives à la mâchoire supérieure (Fig. 6. a.), & six à l'inférieure (Fig. 6. b.).

Les doigts onguiculés,
Joint ensemble par une membrane étendue en ailes dans les pieds de devant , & sépa-

rez les uns des autres dans
ceux de derrière.

terioribus à se invicem se-
parati.

Obs. 10. Toutes les especes de ce Genre ont les dents incisives de la mâchoire supérieure aiguës, & séparées par paires : celles du milieu (*Fig. 6. d.*) sont fourchues, & plus grandes que les extérieures : celles de la mâchoire inférieure (*Fig. 6. e.*) sont toutes contiguës, & échanquées. Le nombre des canines & des molaires varie.

Obs. 10. Elles ont les jambes de devant très longues, dont le pied est divisé en longs doigts, & tous (excepté le pouce, qui est séparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints ensemble par une membrane, qui n'est autre chose qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col jusqu'à l'anus, ou au bout de la queue, ensuite tout le long des jambes, & jusqu'au bout des doigts des pieds de devant : c'est par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les doigts des pieds de derrière sont séparés les uns des autres, & armés d'ongles crochus & très pointus.

Obs. 30. Elles sont cachées pendant tout l'Hiver, & l'Été pendant le jour, dans des lieux obscurs & souterrains, ou dans des trous d'arbres; & elles n'en sortent que vers l'entrée de la nuit.

Obs. 10. Omnium hujus Generis specierum dentes incisores in maxillâ superiore sunt acuti, & per paria remoti; intermedii (*Fig. 6. d.*) exterioribus majores sunt & biturci: in maxillâ inferiore (*Fig. 6. e.*) contigui, omnes emarginati. Dentium caninorum & molazium variat numerus.

Obs. 20. Crura habent anteriora longissima, quorum pedes dividuntur in digitos longos, omnes (excepto pollice ab aliis separato, incurvatoque & valido ungue munito) membranâ inter se connexos; quæ membrana nihil aliud est quam dorsî curis continuata, in utroque latere, à collo ad anum usque, aut caudæ extremitatem, & secundum crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extensa, cujus ope volitant. Pedum posteriorum digiti sunt à se invicem separati, incurvisque & acutissimis unguibus muniti.

Obs. 30. Locis obscuris & cavernis subterraneis, vel cavis arboribus per æstatem interdum, & per totam Hyemem latitant; crepusculo tantum evolant.

* 1. LA GRANDE CHAUVÉ-SOURIS DE NOTRE PAYS.

Vespertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis; auriculis simplicibus... VESPERTILIO MAJOR.

Vespertilio caudatus, ore nasoque simplici. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14: sp. 2.

Æqu. Succ. Linn. N°. 18.

Vespertilio

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XIV. 225

Vespertilio auriculis binis. Jonst. Avi. p. 34. Fig. T. 20. [Fig. sat bona].

Vespertilio vulgaris. Klein. Quadr. p. 61.

Vespertilio. Raj. Syn. Quadr. p. 343.

Gefn. Avi. Fig. p. 766. [Fig. sat bona].

Gefn. Icon. Avi. Fig. p. 17. [Fig. sat bona].

Aldro. Avi. p. 571. Fig. p. 576. (Fig. sat bonis).

Charlet. Exer. p. 80.

Sloane. Vol. II. p. 330.

Les Hébreux l'appellent ATALEPH. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, ATALAPHA. Gefn. Aldro.

Les Grecs, ΝΥΚΤΙΠ.

Les Arabes, BAPHAS. Gefn. Aldro.

Les Perses, ANSEB ; PERACK. Gefn. Aldro.

Les Portugais, MORCEGO, ou MURZIEGALO. Gefn. Aldro.

Les Italiens, NOTTOLA ; NOTULA ; SPORTEGLIONO ; RATTO PENAGO ; BARBASTELLO ; PIPISTRELLO ; VILPISTRELLO. Gefn. Aldro.

Les Polonois, NIETOPERSZ. Gefn. Aldro.

Les Illyriens, NETOPYRZ. Gefn. Aldro.

Les Allemands, FLÄDERMUSS, ou SPECKMAUSS. Gefn. Aldro.

Les Suédois, LÄDERLAPP, ou FLÄDERMUS. Linn.

Les Smolandois, NATTBLOCKA. Linn.

Les Anglois, BAT, ou FLITTERMOUSE. Raj.

Quoad magnitudinem corporis, & pilorum colorem *Soricem* æmulatur. Aurículas habet auriculis *Murinis* similes, scilicet subrotundas & pellucidas ; rostrum breve & obtusum ; in singulis pedibus digitos 5 ; caudam sat longam, cum membrana volatui inserviente connexam : membrana illa extensa, ab una extremitate ad aliam uno circiter pede longa est. Locis obscuris & cavernis subterraneis per æstatem interdiu, & per totam hyemem latitat ; crepusculo tantum évolat.

Elle ressemble à peu-près à la *Souris* par la grandeur de son corps, & la couleur de ses poils. Elle a le museau court & obtus : ses oreilles sont semblables à celles d'un *Rat*, savoir arrondies & transparentes : elle a 5 doigts à chaque pied. Sa queue, qui est assez longue, est jointe avec la membrane qui luy sert à voler : cette membrane étendue, a environ 1 pied de long d'un bout à l'autre. Elle habite pendant tout l'hyver, & le jour pendant l'Été dans des lieux obscurs & souterrains ; & elle n'en sort que vers l'entrée de la nuit.

2. LA PETITE CHAUVE-SOURIS DE TERNATE.

Vespertilio rufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis simplicibus... *VESPERTILIO MINOR TERNATANUS*.

Vespertilio Ternaranus auriculis simplicibus. Klein. Quadr. p. 61.

Vespertilio Ternatanus. Seb. Vol. I. p. 91. Fig. T. 56. Mas F. 3. Fam. F. 2. [Fig. optimis].

Elle ne diffère de la précédente que par la couleur de ses poils, qui sont roux : elle lui ressemble dans tout le reste. On la trouve dans l'Île de Ternate.

A précédente differt tantum pilorum colore rufo : in omnibus aliis ei simillima est. Habitat in Ternatanâ Insulâ.

** 3. LA PETITE CHAUVE-SOURIS DE NOTRE PAYS.

Vespertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus... *VESPERTILIO MINOR*.

Vespertilio vulgaris auriculis duplicibus. Klein. Quadr. p. 61.

Vespertilio auriculis quaternis. Jonst. Avi. p. 34. Fig. T. 10. (Fig. sat bonis).

Vespertilio. Aldro. Avi. p. 371. Fig. p. 374, & 375. [Fig. sat bonis].

Elle ressemble en tout à la première espèce ; elle n'en diffère que par la grandeur de ses oreilles, qui ont plus d'un pouce de long, & qui sont comme doubles.

In omnibus cum specie primâ convenit, exceptis auriculis unius pollicis longitudinem superantibus, & quasi duplicibus.

4. LA GRANDE CHAUVE-SOURIS DE TERNATE.

Vespertilio subrufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus, naso gemino... *VESPERTILIO MAJOR TERNATANUS*.

Vespertilio caudatus, naso foliato, obversè cordato. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sp. 5.

Vespertilio, Rattus Ternatanus. Klein. Quadr. p. 61.

Glis volans Ternatanus. Seb. Vol. I. p. 90. Fig. T. 56, F. 1. (Fig. optimâ).

Per. universum corpus vestitur pilis subrufis ; qui verò partem capitis anteriorem cooperiunt , dilutissimè sunt rufi. Membrana volatui inserviens , cujus superficies superior raris pilis obsita est , inferior verò glabra & nuda , marmoris in modum variegatur. Auriculas habet prægrandes & quasi duplices ; nasum pariter geminum , extuberantem , & foliacei quid referentem ; in singulis pedibus digitos 5. Habitat in Insulâ Ternatâ.

Tout son corps est couvert de poils roussâtres : ceux qui couvrent la partie antérieure de la tête , sont d'un roux très clair. La membrane qui luy sert à voler , est comme marbrée , & garnie de quelques poils en dessus , & nue en dessous. Ses oreilles sont grandes & comme doubles : son nez est aussi double , aquilin , & comme exfolié. Elle a 5 doigts à chaque pied. On la trouve dans l'Isle de Ternate.

5. LA CHAUVE-SOURIS ROUSSE D'AMÉRIQUE.

Vespertilio dilutè rufus , pedibus anticis tetradactylis , posticis pentadactylis... VESPERTILIO AMERICANUS RUFUS.

Vespertilio caudatus , labio superiore bifido. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sp. 3.*

Vespertilio Americanus , capite globofo , ore leporino. *Klein. Quadr. p. 61.*

Vespertilio Caro similis Americanus. *Seb. Vol. I. p. 39. Fig. T. 55. F. 1. (Fig. optimâ).*

Pilis dilutè rufis in toto corpore vestitur. Caput habet globosum ; orem patulum ; mentum pendulum ; nares rotundas ; auriculas magnas ; caudam cum membranâ volatui inserviente connexam ; in pedibus anterioribus digitos 4 , in posterioribus verò 5. Habitat in Americâ.

Tout son corps est couvert de poils d'un roux clair. Elle a la tête ronde ; la bouche large ; le menton pendant ; les narines rondes ; les oreilles grandes ; la queue jointe avec la membrane qui luy sert à voler ; 4 doigts aux pieds de devant , & 5 à ceux de derrière. On la trouve en Amérique.

F f ij

6. LA CHAUVE-SOURIS D'AMÉRIQUE.

Vespertilio murini coloris, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, naso cristato... VESPERTILIO AMERICANUS.

Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sf. 4.


Vespertilio Americanus vulgaris, longioribus auricularis, & è naso erectâ cristulâ. Klein. Quadr. p. 61.

Vespertilio Americanus vulgaris. Seb. Vol. I. p. 90. Fig. T. 55. F. 2. (Fig. optimâ).

Elle ressemble assez par la forme du corps à la première espèce; mais elle a les oreilles plus amples, & plus longues qu'elle. Elle porte sur le nez une espèce de petite crête, assez semblable à un casque : elle n'a point de queue : elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derrière. La couleur de son poil est un gris de Souris, On la trouve en Amérique,

Quoad formam corporis speciem primam sat benè imitatur; majores tamen atque longiores habet auricularis, & è naso erectam, Cassidi ferè æmulam, cristulam gerit : caudâ caret : 4 in pedibus anterioribus digitis donatur, in posterioribus verò 5. Pilorum color est Murinus. Habitat in Americâ.





ORDO XV.

QUADRUPEDA

Dentibus incisiforibus in maxilla superiore sex, in inferiore quatuor; & digitis unguiculatis prædita.

UNICO QUADRUPEDE, *Phoca* scilicet, seu *Vitulo-Marino*, constituitur hic Ordo.

XXXIII.

Genus Phoca.

Hujus character est
Dentes incisores in maxilla superiore sex, in inferiore quatuor:

In singulis pedibus digiti quinque unguiculati,

Membranis inter se connexi:

Pedes posteriores retrorsum extensi.

Obs. Amphibium est hoc animal, & diutius in mare quam in terra commoratur. 4 dentibus caninis, dentium *Canum* æmulis, præditum est, scilicet in utraque maxilla utrinque uno: dentium molarium variat numerus.

ORDRE XV.

LES QUADRUPÉDES

Qui ont six dents incisives à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUPEDE, sçavoir le *Phocas*, ou *Veau-Marin*.

XXXIII.

Le Genre du Phocas:

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure:

A chaque pied cinq doigts onguiculés,

Joint ensemble par des membranes:

Les pieds postérieurs tournés en arrière.

Obs. Cet animal est amphibie & habite plus la mer que la terre. Il a 4 dents canines semblables à celles des *Chiens*, sçavoir une de chaque côté à chaque mâchoire: le nombre de ses dents molaires varie.

** 1. LE PHOCAS, OU VEAU-MARIN;

Phoca, seu Vitulus-Marinus.

Phoca dentibus caninis tectis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 9. sp. 1.**Faun. Suec. Linn. N^o. 11.*Phoca seu Vitulus marinus. *Raj. Syn. Quadr. p. 189.**Aldrov. Pisc. p. 712. Fig. p. 724. [Fig. mala].**Jonst. Pisc. p. 156. Fig. T. 44. [Fig. mala].*Phoca. *Klein. Quadr. p. 93.**Gefn. Pisc. bis Fig. p. 830. [Fig. superior sat bona, inferior mala].**Gefn. Icon. Aquat. Fig. p. 164. (Fig. mala), & p. 366. B. (Fig. sat bona).**Charlet. Exer. Pisc. p. 48. N^o. 6.*Vitulus marinus. *Jonst. Quadr. Fig. T. 68. (Fig. mala).**Bell. de Aquat. p. 19. Fig. p. 21. [Fig. mala].*Veau Marin. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 189. Fig. Pl. 27. (Fig. assez bonne).**Voy. de la B. de Hud. Tom. II. Fig. p. 24. [Fig. assez bonne].**Kolbe. Tom. III. p. 128.*Chien, ou Veau de mer. *Hist. de l'Isle. & de Gro. Tom. II. p. 165. Fig. p. 168. (Fig. assez bonne, exceptez les pieds).*Loup Marine. *Klein.**Les Grecs l'appellent τούνα.**Les Espagnols, LOBO MARINO. Gefn. Aldro.**Les Italiens, VECCHIO MARINO. Gefn. Aldro. Bell.**Les Genevois, BUO, ou BOVE MARINO. Gefn. Aldro.**Les Allemands, MEER-WOLFF, ou MEER-HUND. Gefn. Aldro.**Les Polonois, MORSKIECIELE. Gefn.**Les Suédois, SIAL. Linn.**Les Norvégeois, KAABE. Klein. Hist. d'Isle.**Les Groenlandois, PUSA. Klein. Hist. d'Isle.**Les Danois, SER-HUND. Charlet. SÅLHUND. Klein. Hist. d'Isle.**Les Hollandois, ZEEHUNDT. Aldro.**Les Flamands, ZEEHOND. Gefn. Aldro.**Les Anglois, SEA CALF, ou SEALE. Raj. Charlet. SEAL-HUND. Hist. d'Isle.**Les Habitans du Cap de B. Esp. CHIEN MARIN. Kolbe.**Les Amériquains Septentrionaux, LOUP MARINE. Hist. d'Isle.*

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 4 pieds de long. Son museau est oblong : ses yeux sont grands, & enfoncés profondé-

Corpus, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 4 circiter pedes longum est. Rostrum habet oblongum; oculos magnos, in orbitas pro-

LES QUADRUPÉDES, Classe I. Ordre XV. 231
 fundè demersos. Caret auriculis externis; sed non caret foraminibus, quibus sonum recipit. Collum ei est oblongum; pectus latum: crura sub cute clausa latitant; pedes soli exseruntur, & extrorsum apparent; anteriores 4 pollices longi sunt; posteriores verò 9: digiti omnes singulorum pedum validis membranis inter se sunt connexi, validisque unguibus muniti. Cauda 3 circiter pollices longa, horizontaliter plana est. Per universum corpus vestitur pilis brevibus, rigidis, cinereis splendentibus in dorso, maculisque nigricantibus variegatis; in ventre verò ex sordide albo flavicantibus: dantur & omnino nigra. Habitat in mare, quandoque in terrâ.

ment dans leurs orbites. Il n'a point d'oreilles extérieurement; mais à leur place il y a des trous par lesquels il entend; son col est oblong; sa poitrine large: ses jambes sont tout à fait cachées sous la peau; il n'y a que les pieds qui paroissent; ceux de devant ont 4 pouces de long, & ceux de derrière 9 pouces: tous leurs doigts sont joints ensemble par de fortes membranes, & armés d'ongles forts. Sa queue a environ 3 pouces de long, & est platte horizontalement. Tout son corps est couvert de poils courts, roides, d'un gris brillant, & marqués de taches noires en dessus; & d'un blanc sale & jaunâtre en dessous: il y en a aussi de tout à fait noirs. On le trouve dans la mer, & quelque fois à terre.





ORDRE XVI.

ORDO XVI.

LES QUADRUPEDES

QUADRUPEDA

Qui ont six dents incisives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés,

Dentibus incisivibus in utraque maxillâ sex, & digitis unguiculatis prædita.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre les uns ont les doigts séparés les uns des autres; & les autres les ont joints ensemble par des membranes. Ils sont tous Carnivores. Ils ont quatre dents canines, scavoir une de chaque côté à chaque mâchoire : le nombre des dents molaires varie. Ils se divisent en deux Sections. Dans la première sont ceux qui ont les doigts séparés les uns des autres, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Belette*, l'*Ours*, &c. Dans la seconde, ceux dont les doigts sont joints ensemble par des membranes, comme la *Loutre*.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia sunt quorum digiti à se invicem sunt separati, alia quorum digiti membranis inter se connectuntur. Omnia Carnivora. Quatuor dentibus caninis prædita sunt, scilicet uno utrinque in utraque maxillâ : dentium molarium variat numerus. In duas sectiones dividuntur. Prima continet ea quorum digiti à se invicem separati sunt, sicut *Canis*, *Felis*, *Mustela*, *Ursus*, &c. Secunda, ea quorum digiti membranis inter se connecti sunt, ut *Lutra*.

SECTION I.

SECTIO I.

Ceux dont les doigts sont séparés les uns des autres.

Ea quorum digiti à se invicem sunt separati.

CETTE Section contient six Genres de QUADRUPEDES, dont les caractères sont

SEX in illâ Sectione continentur genera QUADRUPEDUM, quorum caractères

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 233

raâteres à pedibus defumuntur. Alia quatuor digitis in pedibus anterioribus, & quinque in posterioribus donantur, ut *Hyæna*. Alia quinque in pedibus anterioribus, & quatuor tantum in posterioribus, digitis prædita sunt, ut *Canis*. Alia in singulis pedibus quinque digitos habent: ex his ultimis alia sunt quorum pollex ab aliis digitis remotus est, & superius collocatus, ut *Mustela*: & alia quorum pollex aliis digitis est proximus; ut *Meles*. Alia calcaneis incedunt, ut *Ursus*. Alia denique unguibus hamatis & retractilibus prædicta sunt, ut *Felis*.

tirés des pieds. Les uns ont quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derrière, comme l'*Hyène*. D'autres ont cinq doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derrière, comme le *Chien*. D'autres ont 5 doigts à chaque pied: parmi ces derniers, les uns ont le pouce séparé des autres doigts, & articulé plus haut, comme la *Belle*: & les autres ont le pouce placé auprès des autres doigts, comme le *Blaireau*. D'autres s'appuyent sur le talon en marchant, comme l'*Ours*. D'autres enfin ont les ongles crochus, & qui peuvent être retirés, & entièrement cachés, comme le *Chat*.

XXXIV.

Genus *Hyæna*.

Hujus caractere est
Dentes incisores in utraque
maxillâ sex:
Digiti unguiculati in pedibus
anterioribus quatuor, in
posterioribus quinque,
Omnes à se invicem separati.

XXXIV.

Le Genre de l'*Hyène*.

Son caractere est
D'avoir six dents incisives à cha-
que mâchoire:
Quatre doigts onguiculés aux
pieds de devant, & cinq à
ceux de derrière,
Tous séparés les uns des autres.

** 1. L'HYÈNE.

HYÆNA.

Hyæna. Gesh. Quadr. Fig. p. 624. (Fig. bona, si nigra esset nec maculata).
Hyæna, vel Belbus. Gesh. Icon. Quadr. Fig. p. 75. (Fig. eadem).
Zilio Hyæna. Jonst. Quadr. Fig. T. 56. (Fig. ut supra).
Animal Nectrophagum, sive Jelef, sive Hyæna. Euf. Nieremb. p. 181.
Canis pilis cervicis erectis longioribus. Hyæna. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 3.
Sp. 4.

Gg

Gulo; Boophagus; Magnus vorator; Rosomacha. *Klein. Quadr. p. 83. Fig. T. 5. (Fig. mala).*

Gulo. *Gefn. Quadr. Fig. p. 613. (Fig. mala).*

Gefn. Icon. Quadr. p. 78. Fig. p. 79. (Fig. mala).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 178.

Jonst. Quadr. p. 91. Fig. T. 57. (Fig. mala).

Charlet. Exer. p. 15.

Rosomacha. *Euf. Nieremb. p. 188.*

Dabuh Arabum. *Charlet. Exer. p. 15.*

Lupus vespertinus Julii Capirolini. *Aldro.*

Vultur Quadrupes, Scaligeri. *Klein. Charlet. Jonst.*

Les Arabes l'appellent LABO, ou DABUH. Gefn. Jonst.

Les Siriens, DABUA, ou DAHAB. Gefn.

Les Suédois, FILFRAS. Linn.

Les Allemands, VILFRAS. Gefn. Aldro. Jonst.

Les Africains, JESEF. Gefn. Euf. Nieremb. SESEF. Jonst. Charlet.

Il est de la grandeur & de la figure d'un Loup. Il a les oreilles courtes. Tout son corps est couvert de poils assez longs, & noirs. On le trouve en Afri-

Magnitudine & figurâ Lupum æmulatur. Breves habet aurículas. Per univcrsum corpus vestitur pilis sat longis, & nigris. Habitat in Africâ.

X X X V. ●

X X X V.

Le Genre du Chien.

Genus Caninum.

Son caractère est

D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire :

Cinq doigts onguiculés aux pieds de devant, & quatre à ceux de derrière,

Tous séparés les uns des autres.

Hujus character est

Dentes incisores in utrâque maxillâ sex :

Digiti unguiculati in pedibus anterioribus quinque, in posterioribus quatuor,

Omnes à se invicem separati,

Obs. Il arrive quelquefois que les Chiens domestiques ont ; doigts à chaque pied ; mais cette variété ne peut point induire en erreur, parce qu'on ne la trouve que dans les Chiens domestiques, qui sont des animaux trop connus, pour qu'on puisse les confondre avec d'autres.

Obs. Canes domestici quandoque in singulis pedibus quinque digitis donantur ; quæ varietas in errorem inducere nequit, quoniam reperitur in solis domesticis Canibus, animalibus ita notis, ut nullis aliis confundi possint.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 235

** 1. LE CHIEN.

CANIS DOMESTICUS.

Canis caudâ (sinistrorsum) recurvâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 1.
Faun. Suec. Linn. N° 12.

Canis. Raj. Syn. Quadr. p. 175.

Klein. Quadr. p. 68.

Gefn. Quadr. Fig. p. 173. (Fig. bonis).

Gefn. Icon. Quadr. p. 25. Fig. p. 25, 26 & 27. (Fig. bonis).

Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 482.

Jonst. Quadr. p. 122. Fig. T. 69, 70 & 71. (Fig. bonis).

Charlet. Exer. p. 26.

Sloane. Vol. II. p. 329.

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 244.

Les François appellent le mâle CHIEN ; & la femelle, CHIENNE.

Les Hébreux l'appellent KELEB. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, KALBA. Gefn. Aldro.

Les Arabes, KELBE. Gefn. Aldro.

Les Grecs, κύων.

Les Sarafins, KEPE, ou KOLPE. Gefn.

Les Perses, SAG. Gefn. Sig. Aldro.

Les Médes, SPACA. Gefn. Aldro.

Les Espagnols, PERRO. Gefn. Aldro.

Les Italiens, CANE. Gefn. Aldro.

Les Illyriens, PES, ou PAS. Gefn. Aldro.

Les Allemands, HUND. Gefn. Aldro.

Les Suédois, HUND. Linn.

Les Anglois, DOG. Raj.

*Canis est animal omnibus
 ità notum, ut descriptione
 non indigeat.*

*Le Chien est un animal si con-
 nu de tout le monde, qu'il n'a
 pas besoin de description.*

*Obs. Omnes Canum, quas vide-
 mus, differentia sunt tantummo-
 do ejusdem speciei varietates, non
 verò species distinctæ.*

*Obs. Toutes les différences, que
 nous remarquons dans les Chiens, ne
 sont que des variétés de la même espe-
 ce, & point du tout des especes diffé-
 rentes.*

** 2. LE LOUP.

Canis ex griseo flavesceus... LUPUS VULGARIS.

Canis caudâ incurvâ. Lupus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 2.

G g ij

- Fauri Suec.* Linn. N°. 13.
Lupus vulgaris. Klein. *Quadr.* p. 70.
Charleu. *Exer.* p. 15.
Lupus. Raj. *Syn.* *Quadr.* p. 173.
Gefn. *Quadr.* p. 716. *Fig.* p. 717. (*Fig. sat bona*).
Gefn. *Icon.* *Quadr.* *Fig.* p. 79. (*Fig. sat bona*).
Aldro. *Quadr. dig. viv.* p. 144.
Jonst. *Quadr.* p. 89. *Fig. T.* 56. (*Fig. bona*).
Rzac. *Hist. Nat. Pol.* p. 219.
Lupus, seu *Canis sylvestris.* *Rzac.* *Auct.* p. 311.
Les François appellent le mâle LOUP; la femelle, LOUVE; & le jeune, LOU-
VETEAU.
Les Hébreux l'appellent ZEB. *Gefn.* *Aldro.*
Les Chaldéens, DEBA, & DEBA. *Gefn.* *Aldro.*
Les Arabes le mâle, DIB; la femelle, ZEBDAH. *Gefn.* *Aldro.*
Les Grecs, ΛΥΣ.
Les Sabins, HIRPUS. *Aldro.*
Les Espagnols, LOBO. *Gefn.* *Aldro.*
Les Italiens, LUPO. *Gefn.* *Aldro.*
Les Allemands, WOLFF. *Gefn.* *Aldro.* *Rzac.*
Les Illyriens, WLK. *Gefn.*
** Les Polonois, WILK.* *Rzac.*
Les Suédois, WARG; ULF. Linn.
Les Anglois, WOLF. Raj. *Gefn.*

Le Loup est un animal assez connu, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est d'environ 2 pieds 8 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 7 pouces : sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, est d'environ 1 pied, 8 pouces. Son museau est allongé & obtus (en quoi il diffère du Renard, qui a le museau plus pointu) : ses oreilles sont assez courtes & droites : sa queue est grosse, & couverte de longs poils. La cou-

Lupus est animal satis notum, ut amplâ descriptione non indigeat. Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 2 est circiter pedum cum 8 pollicibus; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 7 pollicum : à parte superiore dorsi ad terram usque, unum pedem & 8 pollices circiter altus est. Rostrum habet elongatum & obtusum, (quo differt à Vulpes rostro acutiori donato); auriculas sat breves & erectas; caudam crassam, pilis longis obsitam. Pilorum color vulgaris est ex griseo flavesc-

LES QUADRUPÈDES, Classe 1. Ordre XVI. 237
 cens, quandoque etiam nigricantibus pilis in dorso mixtis : in Septentrionalibus Regionibus candidissimi reperiuntur. Habitat in sylvis.
 leur de ses poils est ordinairement un gris tirant sur le jaunâtre, quelquefois mêlée de noirâtre sur le dos ; il y en a de tout à fait blancs dans les Pays Septentrionaux. On le trouve dans les bois.

3. LE LOUP DORÉ.

Canis flavus... LUPUS AUREUS.

Canis, Lupus aureus dictus. Linn. *syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 3.*

Lupus aureus, Asiaticus. Klein. *Quadr. p. 70.*

Lupus aureus. Raj. *Syn. Quadr. p. 174.*

Gesn. *Quadr. p. 717.*

Aldro. *Quadr. dig. viv. p. 174.*

Jonst. *Quadr. p. 91.*

Charlet. *Exer. p. 15.*

Kämpf. *p. 413. Fig. p. 407. F. 3.*

Asiaticum Animal Adil nuncupatum. Bell. *Obf. p. 160.*

Les Grecs modernes l'appellent SQUILACHI. Raj. Klein. Aldro. Bell.

Les Perses, SIECHAL. Kämpf.

Les Suédois, JACKHALS. Linn.

Les Flamands, JAKHALS. Kämpf.

Les Anglois, JACKCALL. Raj. Klein. Kämpf.

Lupo vulgari magnitudine cedit, & Vulpem antecellit. Quoad figuram verò Lupum æmulatur. Pilorum color est eleganter flavus. Habitat in Ciliciâ, Turciâ, & universâ Asiâ.
 Sa grandeur tient le milieu entre le Loup & le Renard. Quant à sa figure, il ressemble au Loup. La couleur de ses poils est d'un beau jaune. On le trouve en Cilicie, en Turquie, & dans toute l'Asie.

4. LE LOUP DU MÉXIQUE.

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus, taniis subnigris à dorso ad latera deorsum hinc inde deductis... LUPUS MEXICANUS.

Xoloitzcuintli : Lupus Mexicanus. Hernand. *Hyst. Mex. Fig. p. 479. (Fig. bona).*

G g iij

Cuetlachtli, seu Lupus Indicus. *Fern. Hist. N. Hisp. p. 7.*

Lupus Indicus. *Euf. Nieremb. p. 180.*

Les Indiens l'appellent CUETLACHTLI. *Euf. Nieremb.*

Il est de la grandeur du Loup ordinaire ; mais il a la tête plus grosse. Il a les yeux agards & étincellants ; les oreilles assez longues, & droites ; le col gras & épais ; la queue assez longue, & point velu. Il luy sort de la levre supérieure de gros poils, roides comme les picquants flexibles du *Porc-Epic*, variés de gris & de blanc, & couchés en arriere. La couleur de tout son corps est grise, & variée çà & là de taches fauves ; sa tête est aussi grise, & marquée de bandes transversales noirâtres : il a sur le front de larges taches fauves : ses oreilles sont grises : son col est marqué d'une longue tache fauve : il en a une pareille à la poitrine, & une autre à la partie antérieure du ventre : des bandes noirâtres s'étendent de part & d'autre depuis le dos jusqu'aux côtés. Sa queue est grise, & a vers son milieu une tache fauve, qui s'efface peu à peu. Ses jambes & ses pieds sont variés de bandes grises & noirâtres, qui s'étendent du haut au bas. On le trouve dans les endroits chauds de la *Nouvelle Espagne*,

Magnitudine *Lupum vulgarem* adæquat ; sed ampliori capite gaudet. Torvos habet & lucentes oculos ; aurículas sat longas, & erectas ; collum obesum, & crassum ; caudam satis longam, non villosam. Ex superiore labro hirti admodum pili, retrorsum flexi, mollioribus *Hystricis* aculeis non absimiles, ex cinereo alboque colore variantes, erumpunt. Color in toto corpore cinereus ; maculistamen subinde fulvis variegatus : totum caput cinereum est, lineis quibusdam transversis subnigricantibus ornatum ; maculæ latæ coloris fulvi integrum frontem interstingunt : auriculæ sunt cinereæ : collum longâ fulvâque maculâ præditum est, cui similem in pectore, alteram etiam similem in parte ventris anteriore gerit : tæniæ subnigræ, à dorso ad latera, deorsum hinc inde deductæ sunt. Cauda, quæ cinerea est, in medio subfulvam obtinet maculam, paulatim evanescentem. Crura ac pedes cinereis & nigricantibus lineis, à summo ad imum deductis, variegantur. Habitat in calidis *Nova Hispania* locis.

** 5. LE RENARD.

Canis fulvus, pilis cinereis intermixtis... *VULPES VULGARIS*.

Canis caudâ rectâ, extremitate albâ. *Vulpes vulgaris*. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 6.*

Canis caudâ rectâ, extremitate nigrâ. *Vulpes campestris*. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 5.*

Canis caudâ erectâ. *Vulpes fulvus*. *Faun. Suec. Linn. No. 14.*

Vulpes vulgaris. *Klein. Quadr. p. 71.*

Vulpes. *Raj. Syn. Quadr. p. 177.*

Gefn. Quadr. Fig. p. 1081. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. p. 88. Fig. p. 89. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 195.

Jonst. Quadr. p. 92. Fig. T. 56. (Fig. bona).

Charlat. Exer. p. 15.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 231.

Rzac. Aud. p. 314.

Les Hébreux l'appellent SCRUVAL. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, THAAL. *Gefn. Aldro.*

Les Arabes, THALEB. *Gefn. Aldro.*

Les Grecs, ΚΑΛΟΝΕΣ.

Les Espagnols, RAPOSA. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, VOLPE. *Gefn. Aldro.*

Les Allemands, FUCHSS. *Gefn. Aldro. Rzac.*

Les Illyriens, LISSKA. *Gefn.*

Les Polonois, LIS ; LISZKA. *Rzac.*

Les Suédois, RÅV. *Linn.*

Les Flamands, Vos. *Gefn.*

Les Anglois, Fox. *Raj. Gefn.*

Vulpes est animal ita notum, ut amplâ descriptione non indigeat. Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 1 est circiter pedis & 8 pollicum; capitis, à vertice ad nares, 5 $\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ 15 pollicum. A parte superiore dorsif ad terram usque, 15 aut 16 pollicum altus est. Rostrum habet elongatum & acu-

Le Renard est un animal assez connu, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est d'environ 1 pied 8 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'aux narines, de 5 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa queue de 15 pouces. Sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, est de 15

ou 16 pouces. Son museau est allongé & pointu, (en quoi il diffère du *Loup*, qu'a le museau plus obtus). Ses oreilles sont droites. Sa queue est grosse, & couverte de poils longs & épais: ceux qui couvrent la partie supérieure du corps, sont fauves, mêlés de quelques poils gris; & ceux qui couvrent la partie inférieure, sont gris. On le trouve dans les bois.

tum, (quo differt à *Lupo*; rostro obtusiori prædito); aurículas erectas; caudam crassam, pilis longis & densis vestitam. Pili partem corporis superiorem tegentes, sunt fulvi, pilis quibusdam cinereis intermixtis; qui verò partem corporis inferiorem vestiunt, sunt cinerei. Habitat in sylvis.

6. LE RENARD CROISÉ.

Canis fulvus, crucem nigram in dorso gerens... VULPES CRUCIGERA.

Canis caudâ erectâ. Vulpes cruciatus. Faun. Succ. Linn. No. 14.

Vulpes crucigera. Gsf. Icon. Quadr. Fig. p. 90. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 221. Fig. p. 222. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 93.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 231.

Renard croisé. Kolbe. Tom. III. p. 62.

Les Polonois l'appellent KRZYŻAKI. Rzac.

Les Suédois, KROSSAR. Linn.

Les Européens du Cap de B. Esp. JAKHALS. Kolbe.

Les Hottentots, TENLIC, ou KENLÉE. Kolbe.

Il est de la grandeur, de la figure, & de la couleur du *Renard ordinaire*: il en diffère seulement par une bande longitudinale noire, qui s'étend depuis le bout de museau jusqu'au bout de la queue, en passant par-dessus la tête & le dos, & une seconde transversale, qui passe sur le dos, & s'étend sur les deux jambes antérieures; de façon que ces deux bandes ensemble, forment

Magnitudine, figurâ & colore *Vulpem vulgarem* æmulatur: ab eâ autem notâ insigni differt; nam ab ore, per caput & dorsum, ad caudæ apicem usque, recta, longitudinalis, nigri coloris tæniâ ducitur, alterâ tæniâ transversâ etiam nigrâ per dorsum & pedes anteriores ductâ; ita ut duæ illæ tæniæ simul crucis similitudinem exprimant.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 241
 primant. Habitat in Polonid, une croix. On le trouve en Po-
 Suecia, & Capite B. Spei. logne, en Suede, & au Cap de
 Bonne Esperance.

7. LE RENARD GRIS.

Canis ex cinereo argenteus... VULPES CINEREA.

Vulpes cinereus Americanus. Klein. Quadr. p. 71.
 Renard gris. Cat. Tom. II. Fig. p. 78. [Fig. très bonne],
 Les Anglois l'appellent GRAY FOX. Cat.

Magnitudine & figurâ *Vul-*
pem vulgarem æmulatur : ab
 eâ autem differt colore qui
 est ex cinereo argenteus. Ha-
 bitat in Carolinâ, & Virgi-
 niâ in cavis arboribus.

Il est à peu-près de la gran-
 deur, & de la figure du Renard
 ordinaire : il en differe par sa
 couleur qui est un gris argenté.
 On le trouve à la Caroline, &
 à la Virginie dans des trous d'ar-
 bres.

8. LE RENARD BLANC.

Canis hieme albus, æstate ex cinereo cœrulescens... VULPES
 ALBA.

Canis cauda recta unicolore. a. Vulpes alba. b. Vulpes cœrulescens. Linn.
 syst. nat. ed. 6. g. 3. sp. 7.

Canis caudâ erectâ. Vulpes albus. Vulpes cœrulescens. Faun. Suec. Linn.
 No. 14.

Vulpes alba. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 220. Fig. p. 221. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 93.

Renard blanc. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. p. 56.

Les Suédois l'appellent FÄLL RACKA, lorsqu'il est blanc ; & BLÅRÅK, lorf-
 qu'il est bleuâtre. Linn.

Magnitudine & figurâ *Vul-*
pem vulgarem æmulatur : ab
 eâ autem differt colore, qui
 æstate ex cinereo cœrulescit,
 hieme verò albus est. Habi-
 tat in Septentrionalibus Re-
 gionibus.

Il est à peu-près de la gran-
 deur, & de la figure du Renard
 ordinaire : il en differe par sa
 couleur, qui est d'un gris bleuâ-
 tre en Été, & blanche en Hi-
 ver. On le trouve dans les Pays
 du Nord.

Hh

XXXVI.

XXXVI.

Le Genre de la Belette.

Genus *Mustela*.

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à cha-
que mâchoire ;
A chaque pied cinq doigts ongui-
culés ,
Tous séparés les uns des autres :
Le pouce éloigné des autres
doigts , & articulé plus haut.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ sex :
Digiti unguiculati in singulis
pedibus quinque ,
Omnes à se invicem separati :
Pollex ab aliis digitis remotus ,
& altius collocatus.

Obs. Tous les QUADRUPÈDES de ce
Genre ont le corps allongé , & les
jambes courtes.

Obs. Omnia hujus Generis
QUADRUPEDA corpus habent gra-
cile , & crura breviora.

* * I. LA BELETTE.

Mustela supra rutila, infra alba... MUSTELA VULGARIS.

Mustela caudæ apice atro. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 5.

Faun. Suec. Linn. No. 9.

Mustela vulgaris. Raj. syn. Quadr. p. 195.

Klein. Quadr. p. 62.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 307.

Jonst. Quadr. p. 105: Fig. T. 64. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 20.

Mustela propriè sic dicta. Gessn. Quadr. Fig. p. 851. (Fig. sat. bona).

Mustela. Gessn. Icon. Quadr. p. 99. Fig. p. 100. [Fig. sat. bona].

Rac. Hist. Nat. Pol. p. 235.

Les Hébreux l'appellent CHULDAH. Gessn.

Les Chaldéens , CHULDA. Gessn.

Les Arabes , CALDAH. Gessn.

Les Grecs , ΙΑΛΙΝ , ou ΙΑΛΙ.

Les Perses , GURBA. Gessn.

Les Espagnols , COMADREIA. Gessn. Aldro.

Les Italiens , DONNOLA ; BALLOTTULA ; BENULA. Gessn. Aldro.

Les Illyriens , KOICZAWA. Gessn. Aldro.

Les Allemands , WISEL. Gessn. Aldro.

Les Smolandois , WESLA. Linn. Klein.

Les Anglois , WEASEL , ou WEESEL. Raj. Gessn. Aldro.

Les Habitans d'York , FOUMART , ou FITCHET. Raj.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 243

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, 7 est circiter pollicum; caudæ 2 pollicum. Oculos habet parvos & nigros; aurículas breves, sed latas & subrotundas; crura unius pollicis longitudinem non multum superantia. Per universum corpus vestitur pilis brevibus, in parte corporis superiore rutilis, in inferiore verò albis. Habitat in agris & sylvis.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces; & celle de sa queue, de 2 pouces. Elle a les yeux petits & noirs; les oreilles courtes, mais larges & arrondies: ses jambes n'ont gueres plus d'un pouce de long. Tout son corps est couvert de poils courts, roux dans la partie supérieure du corps, & blancs dans la partie inférieure. On la trouve dans les champs, & dans les bois.

** 2. L' HERMINE.

Mustela hieme alba, æstate suprà rutila infrà alba; caudæ apice nigro.

Mustela Armellina; *Mustela alba* extremâ caudâ nigrâ. *Klein. Quadr. p. 63.*

Mustela caudæ apice atro. *Faun. Succ. Linn. No. 9.*

Mustela candida, sive *Ermineum*. *Linn. syst. nat. ed. 6 g. 6. sp. 6.*

Mustela candida, sive *Animal Ermineum recentiorum*. *Raj. fyn. Quadr. p. 192.*

Mustela candida in extremâ caudâ nigricans. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 309. Fig. p. 310. [Fig. sat bona].*

Mustela alba. *Gefn. Quadr. Fig. p. 851. [Fig. sat bona].*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 100. (Fig. sat bona).

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 233.

Rzac. Aut. p. 328.

Mustela tota alba, *Hermellani dicta*. *Jonst. Quadr. p. 105.*

Mustela Alpina Junii. *Rzac.*

Hermellanus Charlet. Exr. p. 20.

Les Italiens l'appellent ARMELINO. Rzac.

Les Polonois, GRONOSTAY. Rzac.

Les Allemands, HERMELIN, ou WYSS WISELIN. Gefn. Rzac.

Les Suédois, HERMELIN, ou LEKATT. Linn.

Les Norvégeois, LEKAT. Gefn.

Les Anglois, ERMINE, ou STOAT. Raj.

Figurâ suâ *Mustelam* vulgarem imitatur; sed eam sa figure; mais elle est un peu

H h ij

plus grande. Elle a les ongles blancs, & le bout de la queue noir. Tout le reste de son corps est blanc en Hiver; & en Été la partie supérieure du corps est rousse, & la partie inférieure est blanche. On la trouve en *Russie*, en *Scandinavie*, & dans tous les *Pays du Nord*; & rarement en *France*.

magnitudine superat. Ungues huic albi sunt, & caudæ apex niger; quo excepto, Hieme in toto corpore alba est; ætate verò in parte corporis superiore rutila, in inferiore verò alba. Habitat in *Russia*, *Scandinavia*, & in omnibus *Septentrionalibus Regionibus*; in *Gallia* rarissima.

** 3. LE FURET.

{ Mustela pilis subflavis, longioribus castaneo colore terminatis, vestita... VIVERRA MAS.

{ Mustela pilis ex albo subflavis vestita... VIVERRA FEMINA,

Mustela sylvestris Viverra dicta. Raj. Syn. Quadr. p. 198.

Linn. syst. nat. ed. 6 g. 6. sp. 4.

Mustela Viverra dicta. Klein. Quadr. p. 63.

Mustela sylvestris. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 325. Fig. p. 327. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 167.

Mustela sylvestris, lctis. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 235.

Viverra; Furo; lctis. Gsf. Quadr. Fig. p. 862. (Fig. sat bona).

Viverra. Gsf. Icon. Quadr. Fig. p. 101. (Fig. sat bona).

Charlet. Exer. p. 20.

Furunculus Sipontino. Rzac.

Les Grecs l'appellent κρις, ou κρις.

Les Espagnols, HURON; FURAM. Gsf.

Les Polonois, LASKA; LASICA LESNA. Rzac.

Les Allemands, FRETTE; FRETTEL; FURETTE. Gsf. Aldro.

Les Anglois, FERRET. Raj. Gsf. FRET; FERRETTE. Gsf. Aldro.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 14 pouces; & celle de sa queue de 5 pouces. Il a les yeux rouges; les oreilles courtes, larges, & arrondies; & les ongles blancs. Le mâle a le bout du museau blanc; la tête jaunâtre; & tout

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exitum, 14 est pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet rubicundos; aurículas breves, latas & subrotundas; & ungues albos. In mare rostri extremitas alba est; caput subflavum; & reliqua

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XVI. 245

corpus pilis subflavis, longioribus castaneo colore terminatis, vestitum. Fœmina, quæ mati magnitudine cedit, in parte capitis anteriore alba est, & in reliquo corpore ex albo subflava. *Africa* incola esse dicitur, indeque ad nos translata. le reste du corps couvert de poils jaunâtres, dont les plus longs sont terminés de marron. La femelle est un peu plus petite que le mâle : elle a la partie antérieure de la tête blanche, & tout le reste du corps d'un blanc jaunâtre. On prétend qu'il nous a été apporté d'*Afrique*.

4. LE FURET DES INDES.

Mustela ex griseo rufescens... VIVERRA INDICA.

Mustela Glauca. Mungo. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 9.*
Viverra Indica ex griseo rufescens. *Raj. Syn. Quadr. p. 198.*

Klein Quadr. p. 63.
Les Portugais l'appellent MUNGO. Raj.
Les Zeyloniens, MUNGATHIA. Raj.

A précédente differt couleur, qui ex griseo rufescit. Il differe du précédent par sa couleur, qui est un gris roussâtre. On le trouve dans l'*Inde*.
Habitat in India.

5. LE FURET DE JAVA.

Mustela supra rufa, infra dilutè flava, caudæ apice nigricante... VIVERRA JAVANICA.

Mustela Javanica, *Koger Angan dicta. Klein. Quadr. p. 64.*
Mustela Javanica. Seb. Vol. I. p. 77. Fig. T. 48. F. 4. (Fig. bona).
Les Habitans de Java l'appellent KOKER ANGAN: Seb.

Magnitudine & figurâ *Viverram nostratam* circiter æquat: ab eâ autem colore differt. Pili caput regentes, sunt obscurè spadicei; qui dorsum obtegunt, sunt rufi; qui verò ventrem vestiunt, dilutè flavi. Cauda in apicem acutum nigricantem desinit. *Habitat in Java.* Il est à peu-près de la grandeur, & de la figure de notre *Furet* : il en differe par sa couleur. Les poils qui couvrent sa tête, sont d'un rouge-bay obscur; ceux du dos sont roux; & ceux du ventre d'un jaune clair. Sa queue se termine en une pointe noirâtre. On le trouve à *Java*.

Hh üj

** 6. LE VISON.

Mustela pilis coloris saturatè castanei in toto corpore vestita...
 VISON.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 15 pouces de long : sa queue est longue de 7 pouces. Ses oreilles sont très courtes, larges, & arrondies. Tout son corps est couvert de poils d'un marron foncé. On le trouve en Canada, d'où il a été envoyé à M. l'Abbé Aubry, qui le conserve dans son Cabinet.

Ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 15 circiter pollices longus est : cauda 7 pollices longa. Auriculas habet brevissimas, latas, & rotundatas. In toto corpore vestitur pilis coloris saturatè castanei. Habitat in Canadæ. Ex museo Dom. Aubry.

** 7. LA FOUINE.

Mustela pilis in exortu albidis, castaneo colore terminatis, vestita, gutture albo... FOYNA.

Mustela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 2.*

Faun. Suec. Linn. N^o. 7.

Martes, aliis Foyna. *Raj. Syn. Quadr. p. 200.*

Martes saxorum, non fagorum, seu domesticus. *Klein. Quadr. p. 64.*

Martes domestica. *Gesn. Quadr. Fig. p. 865. (Fig. bona).*

Gesn. Icon. Quadr. p. 97. Fig. p. 98. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 332.

Jonst. Quadr. p. 108. Fig. T. 64. (Fig. bona).

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 122.

Martes fagina. *Rzac. aud. p. 314.*

Les Italiens l'appellent FOYNA, ou FOYINA. *Gesn.*

Les Allemands, MARDER; TACH MARDER; HUHES MARDER; STEIN MARDER; BÜCH MARDER. *Gesn. Rzac.*

Les Suédois, MÅRD. *Linn.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'un pied 5 pouces; & celle de sa queue de 11 pouces. Elle a les oreilles larges, & arrondies; & la

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum usque, unius est pedis & 5 pollicum; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet latas & subrotundas; caudam lon-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 247

gis pilis oblitam. Per universum corpus, excepto guttore albo, vestitur pilis in exortu albidis, castaneo colore terminatis : qui caudam & 4 crura obtegunt, ex castaneo nigricant. Habitat in sylvis, & circa domos.

queue couverte de longs poils. Tout le corps, excepté la gorge qui est blanche, est couvert de poils blanchâtres à leur origine, & terminez de marron : ceux qui couvrent les 4 jambes & la queue, sont d'un marron noirâtre. On la trouve dans les bois, & auprès des maisons.

* * 8. LA MARTE.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis, castaneo colore terminatis, vestita, gutture flavo... MARTES.

Mustela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 2.

Faun. Suec. Linn. No. 7.

Mustela Martes Klein. Quadr. p. 64.

Martes Raj. Syn. Quadr. p. 100.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 331.

Charlet. Exer. p. 20.

Martes sylvestris. Gesn. Quadr. p. 867. Fig. p. 866. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 108.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 222.

Martes abietina. Rzac. Aud. p. 314.

Martis altera species nobilior. Gesn. Icon. Quadr. p. 99.

Les Espagnols l'appellent MARTA. Gesn. Aldro.

Les italiens, MARTA; MARTURO; MARTARO; & MARTORZELLO. Aldro.

Les Pelletiers Boulonnois, MARTIRE. Aldro.

Les Allemands, FELD MARDER; WILD MARDER. Gesn.

Les Polonois, KUNA. Aldro. Rzac.

Les Suédois, MÅRD. Linn.

Les Anglois, MARTIN, ou MARTLET. Raj.

Magnitudine & figurâ *Fov-* Elle ressemble à la *Fouine* par
nam æmulatur; ab eâ autem sa figure, & sa grandeur; mais
differt præcipuè gutturis co- elle en differe principalement
lore flavo. In toto reliquo par la couleur de sa gorge,
corpore vestitur pilis in exor- qui est jaune. Tout le reste de
tu ex cinereo albidis, casta- son corps est couvert de poils
neo colore terminatis. Syl- d'un gris blanchâtre à leur ori-

gine, & terminés de marron. Elle ne sort gueres des bois. On la trouve en Canada, & rarement en Europe.

9. LA MARTE ZIBELINE.

Mustela obscurè fulva, gutture cinereo... MARTES ZIBELLINA.

Mustela Zibellina; Martes Scythica; Mus Sarmaticus; Mus Scythicus.

Klein. Quadr. p. 64.

Mustela Zibellina. Raj. Syn. Quadr. p. 201.

Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 7.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 335.

Jonst. Quadr. p. 108.

Charlet. Exer. p. 20.

Mustela Sobella. Gessn. Quadr. p. 869;

Rzac. Auct. p. 317.

Mustela Scythica. Rzac.

Ictis Scythica. Rzac.

Satherius Aristotelis. Charlet.

Cebalus Niphi. Charlet.

Les Allemands l'appellent ZOBEL. Gessn. Rzac.

Les Polonois & les Illyriens, SOBOL. Gessn. Aldro. Rzac.

Les Suédois, SABEL. Linn.

Les Anglois, SABLE. Raj.

Elle ressemble à la *Marte*; mais elle est un peu plus petite. Tout son corps, excepté sa gorge qui est grise, est couvert de poils d'un fauve obscur. La partie antérieure de sa tête, & ses oreilles sont d'un gris blanchâtre. On la trouve en Lithuanie, dans la Russie blanche, dans la partie Septentrionale de la Moscovie, & dans la Scandinavie.

Martem figurâ suâ imitatur; sed eâ paulò minor est. In toto corpore, excepto gutture cinereo, vestitur pilis obscurè fulvis. Capitis pars anterior, & auriculæ sunt ex albido cinereæ. Habitat in Lithuanid, alba Russid, Moscovia Septentrionali Regionè, & Scandinavid,

** 10. LE PUTORIS.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis, vestita, oris circumferentiâ albâ... PUTORIUS.

Mustela flavescens nigricans, ore albo, collari flavescens. Putorius. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 3.

Faun. Suec. Linn. No. 8.

Mustela fœtida. Putorius. Klein. Quadr. p. 63.

Putorius. Raj. Syn. Quadr. p. 199.

Gesn. Quadr. Fig. p. 868. (Fig. sat bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 99. [Fig. sat bona].

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 329. Fig. p. 330. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 107. Fig. T. 64. sub isto nomine, Martes. [Fig. sat bona].

Charlet. Exer. p. 20.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 236.

Rzac. Aud. p. 329.

Martes domestica Matthioli. Rzac.

Les Picards l'appellent CATHARET. Gesn.

Les Italiens, FOETTA. Gesn. PUZOLO. Aldro.

Les Savoyards, POUTTET. Gesn. Aldro.

Les Allemands, ILTIS; ULK; BUNTSING. Gesn.

Les Illyriens ou les Bohêmes, TCHORZ. Gesn. Aldro.

Les Polonois, VYDRA. Gesn. Aldro. TCHORZ. Rzac.

Les Habitans de la Province de Skone, ILLER. Linn.

Les Anglois, POLECAT, ou FITCHET. Raj.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium usque, 13 est pollicum; caudæ 5 $\frac{1}{2}$ pollicum. Auriculas habet breves, latas & subrotundas. Per universum corpus vestitur pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis in toto corpore, exceptis lateribus, in quibus colore dilutè castaneo terminantur. Tota oris circumferentia alba est. Habitat in sylvis.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 13 pouces; & celle de sa queue de 5 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a les oreilles courtes, larges & arrondies. Tout son corps est couvert de poils d'un gris blanchâtre à leur origine, & terminés de noirâtre par tout le corps, exceptés aux côtés, où ils sont terminés de marron clair. Tout le tour de sa bouche est blanc. On le trouve dans les bois.

II. LE PUTOIS RAYÉ.

Mustela nigra, tæniis in dorso albis... PUTORIUS STRIATUS.

Mustela Americana fortida, Klein. Quadr. p. 64.

Putois. Cat. Tom. II, Fig. p. 62. [Fig. tres bonne].

Il est à peu-près de la grandeur du précédent ; mais il a le museau un peu plus long. Il est noir, avec 5 bandes blanches sur le dos, dont une s'étend depuis le derrière de la tête, tout le long du milieu du dos jusqu'à la queue, & deux autres de chaque côté, qui luy sont parallèles. On le trouve dans tout le Continent Septentrional d'Amérique.

Præcedentem magnitudine circiter adæquat ; sed rostro longiore donatur. Pilis vestitur nigris, tæniis 5 in dorso albis, quarum media à cer vice, in medio dorso, ad caudam usque decurrit, duabus utrinque aliis mediæ parallelis. Habitat in omni America Septentrionali Regione.

**** 12 L'ICHNEUMON OU LA MANGOUSTE : Vulgairement LE RAT DE PHARAON.**

Mustela pilis ex albido & nigricante variegatis, vestita... ICHNEUMON : MUS PHARAONIS VULGÖ.

Mustela Egyptiaca. Ichneumon, i. e. Investigator. Mus Pharaonis ; Mus Egypti ; Damula ; Donola ; Mustela Egypti peculiaris ; Lutra Egypti. Klein. Quadr. p. 64.

Meles unguitibus uniformibus leucophæa. Ichneumon. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 10. sp. 3.

Ichneumon. Raj. Syn. Quadr. p. 202.

Gesn. Quadr. Fig. p. 63 5. [Fig. mala].

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 102. [Fig. malis].

Jonst. Quadr. p. 105. Fig. T. 67. [Fig. mala]

Charlet. Exer. p. 19.

Bell. de Aquat. p. 44. Fig. p. 45. (Fig. mala).

Bell. obs. Fig. p. 96. (Fig. mala).

Ichneumon, sive Lutra Egypti. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 298. Fig. p. 301. [Fig. mala].

Ichneumon, seu Mus Pharaonis. Prosp. Alp. Egypt. p. 234. Fig. T. 14. F. 3. (Fig. mala).

Ichneumon. Kolbe. Tom. III. p. 52. Fig. p. 4. (Fig. mauv).

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 251

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium usque, 1 est pedis cum $\frac{1}{2}$ pollicibus; caudæ 1 $\frac{1}{2}$ pedis. Anteriora crura, à ventre ad apicem unguum, 5 circiter pollices longa sunt; posteriora verò paulo longiora. Aurículas habet brevissimas, latas, & subrotundas; caudam in exortu crassam, in acumen desinentem. In toto corpore, excepto ventre ex raso flavicante, vestitur pilis, ab exortu ad apicem usque, ex albido & nigricante variegatis. Habitat in *Ægypto*.

Alia est *Ichneumonis* species, ab istâ discrepans magnitudine tantum quâ ei cedit: ab extremitate rostri ad caudæ exortum usque, 13 tantum pollices longa est; & caudæ longitudo 9 pollices æquat. Ex museo *Realmurian* o.

Ichneumon cujus *Seba* descriptionem dedit *Vol. I. p. 66.* & figuram *T. 41. Fig. 1.* idem cum isto esse videtur. Descriptio quam hujus dedit, isti sâ benè convenit, & figura eum perfectè repræsentat. A *Ceylonensi Insula* ad eum vivus missus est.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'un pied 9 pouces; & celle de sa queue de 1 $\frac{1}{2}$ pied. Ses jambes de devant ont environ 5 pouces de long, depuis le ventre jusqu'au bout des ongles; & celles de derrière sont un peu plus longues. Il a les oreilles très courtes, larges & arrondies; la queue grosse à son origine, & finissant en pointe. Tout son corps, excepté le ventre, qui est d'un roux jaunâtre, est couvert de poils variés, depuis leur origine jusqu'à leur extrémité, de noirâtre & de blanchâtre. On le trouve en *Égypte*.

Il y en a une seconde espèce, qui ne diffère de celle-ci que parce qu'elle est beaucoup plus petite: elle n'a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, que 13 pouces de long, & sa queue 9 pouces. Elle est dans le Cabinet de M. de *Reaumur*.

L'*Ichneumon* que *Seba* a décrit *Tom. I. p. 66.* & dont il a donné la figure *Pl. 41. Fig. 1.* ressemble beaucoup à celui-ci. La description luy convient assez, & la figure encore mieux. On le luy a envoyé vivant de l'*Ile de Ceylan*.

** 13. LA GENETTE.

*Mustela caudâ ex annulis alternatim albidis & nigris variegatâ...
GENETTA.*

Mustela caudâ annulis nigris albidisque cinctâ, Genetta. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 8.

Genetta, vel Ginetta. Raj. Syn. Quadr. p. 201.

Cçari, Ginetta Hispanis. Klein. Quadr. p. 73.

Genetta. Gefn. Quadr. p. 619. Pellis Fig. p. 1102. [Fig. bona].

Gefn. Icon. Quadr. p. 70. Fig. p. 71. (Fig. sat bona). Pellis ibi Fig. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 337. Fig. p. 339. [Fig. sat bona].

Jonst. Quadr. p. 109. Fig. T. 72. (Fig. sat bona).

Bell. obs. Fig. p. 76. (Fig. sat bona).

Genetta ; Catrus Hispaniæ , & Genethocatus. Charlet. Exer. p. 20.

Les Allemands l'appellent GENETHKATZ. Gefn.

Les Suédois, DESMANSKATT. Linn.

Elle est à peu-près de la grandeur d'un Chat ; mais elle a le corps plus effilé. Son museau est allongé, & très pointu : ses oreilles ressemblent à celles du Chat. Tout son corps est couvert de poils variés de brun & de blanchâtre, avec des taches noires par tout le corps, exceptés à la tête & aux jambes. Sa queue est garnie d'anneaux alternativement noirs & blanchâtres. On la trouve en Espagne, & en Turquie.

Magnitudine *Felem domesticam* circiter æquat ; sed corpore graciliori donatur. Rostrum habet elongatum & acutissimum ; auriculas auriculis *Felinis* similes. Per universum corpus vestitur pilis ex fusco & albedo variegatis, maculis nigris in toto corpore, exceptis cruribus & capite, dispersis. Cauda annulis alternatim albidis & nigris cingitur. Habitat in Hispaniâ, & Turciciâ.

XXXVII.

Le Genre du Blaireau.

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire :

XXXVII.

Genus Melis.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque maxillâ sex ;

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 253
 Digiti unguiculati in singulis A chaque pied cinq doigts on-
 pedibus quinque, guiculés,
 Omnes à se invicem separati: Tous séparés les uns des autres :
 Pollex aliis digitis proximus. Le pouce proche des autres
 doigts.

**** I. LE BLAIREAU, OU TAISSON.**

Meles pilis ex fordidè albo & nigro variegatis vestita, capite
 tanius alternatim albis & nigris variegato... MELES.

Meles unguibus anticis longissimis. Taxus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 10.*
sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 15.

Taxus, sive Meles. *Raj. Syn. Quadr. p. 185.*

Meles. *Gefn. Quadr. p. 778. Fig. p. 1103. (Fig. bona).*

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 86. (Fig. bona).

Rzac. Aud. p. 315.

Taxus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 263. Fig. p. 266. (Fig. mala).*

Jonst. Quadr. p. 101. Fig. T. 64. [Fig. bona].

Charlet. Exer. p. 18.

Melis, sive Taxo; Taxus; Tassus; Blerellus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 233.*

Melis seu Taxus; Blerellus. *Rzac. Aud. p. 327.*

Coati caudâ brevi; Taxus; Meles. Coati griseus. *Klein. Quadr. p. 73.*

Les Grecs l'appellent ΜΑΛΙΣ.

Les Espagnols, TASUGO; TEXON. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, TASSO. *Gefn. Aldro.*

Les Grisons, TASCH. *Gefn. Aldro.*

Les Allemands, TACHS, ou DAR. *Gefn. Aldro. DACHS. Rzac.*

Les Illyriens, GRZWECZ. *Gefn. Aldro.*

Les Polonois, JAZWIEC; BORSUK; KOT-DZIKI; ZBIK. *Rzac.*

Les Suldois, GRÄF-SVIN. *Linn.*

Les Anglois, BADGER; BROCK, ou GRAY. *Raj. Gefn.*

Les Anglois Septentrionaux, PATE. *Raj.*

Longitudo corporis, ab ex-
 tremitate rostri ad caudæ ex-
 ortum, 2 $\frac{1}{2}$ circiter est pe-
 dum; caudæ 10 pollicum.
 Oculos habet parvos pro ra-
 tione corporis; auriculas bre-
 ves; partim albas, partim ni-
 gras; crura brevissima; un-

La longueur de son corps, de-
 puis le bout du museau jusqu'à
 la queue, est d'environ 2 $\frac{1}{2}$ pieds;
 & celle de sa queue de 10 pou-
 ces. Ses yeux sont petits; ses
 oreilles courtes, partie blanches,
 & partie noires; ses jambes très
 courtes; ses ongles noirs: ceux

des pieds de devant sont très longs & forts. Il a immédiatement audeffous de l'origine de la queue, & audeffus de l'anus, un large orifice, qui s'ouvre comme une espece de petit sac, peu profond, & qui a la figure d'une petite bourse : de la superficie intérieure de cette bourse suinte, mais en petite quantité, une substance blanche, qui a une certaine consistance, & à laquelle je n'ai trouvé aucune odeur particulière. Tout son corps est couvert de poils rudes au toucher : ceux qui couvrent la partie supérieure du corps, & la queue, sont d'un blanc sale à leur origine, & variés de noir & de ce même blanc sale dans le reste de leur longueur : ceux qui couvrent la partie inférieure du corps, les 4 jambes, & les 4 pieds sont noirs. Sa tête est variée de larges bandes longitudinales alternativement blanches & noires ; sçavoir une bande blanche, qui s'étend depuis le nez jusqu'à l'occiput ; audeffous de celle là, de chaque côté est une bande noire, qui s'étend depuis les narines jusqu'au delà des oreilles, en passant par les yeux ; & encore audeffous de ces dernières est une bande blanche de chaque côté, qui s'étend dans toute la longueur des jouës. On le trouve dans les bois,

gues pedum anteriorum longissimos & validos, pedum posteriorum breves, omnes nigros. Statim sub cauda exortu, supra anum, latum habet orificium, quod in solliculum aperitur, non admodum profundum, bursa aut sacculi figurâ, ex cujus superficie internâ exsudat, parvâ quidem quantitate, substantia quædam alba, quidam consistentiâ prædita, in quâ nullum insignem odorem reperi. In toto corpore vestitur pilis ad tactum rigidis : qui partem corporis superiorem obtegunt, sunt in exortu sordide albi, & in reliquâ longitudine ex nigro & sordide albo variegati : qui verò partem corporis inferiorem, & crura & pedes cooperiunt, sunt nigri. Caput tæniis latis longitudinalibus alternatim albis & nigris variegatur ; à naso scilicet ad occipitium usque, tænia protenditur alba ; infra eam utrinque, à naribus, per oculos, nigra ultra aurículas tænia produci-tur : deindè iterum inferius adhuc utrinque tænia est alba, secundum genarum longitudinem protensa. Habitat in sylvis.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 255.

** 2. LE BLAIREAU BLANC.

Meles supra alba, infra ex albo flavicans... MELES ALBA.

Ab extremitate rostri ad caudæ initium, 1 pede cum 9 pollicibus longa est. Oculos habet parvos, pro ratione corporis; auriculas breves; crura brevissima; ungues albos. Per universum corpus vestitur pilis densissimis, in parte corporis superiore albis, in inferiore autem ex albo flavicantibus. Habitat in *Eboraco novo*. Ex museo *Realmuriano*.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 1^r pied 9 pouces de long : sa queue est longue de 9 pouces. Ses yeux sont petits, à proportion de la grandeur de son corps; ses oreilles courtes; ses jambes très courtes; ses ongles blancs. Tout son corps est couvert de poils très épais, blancs dans toute la partie supérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. On le trouve dans la *Nouvelle York*, d'où il a été apporté à M. de Reaumur.

3. LE BLAIREAU DE SURINAM.

Meles ex saturatè spadiceo nigricans, caudâ fuscâ, annulis flavicantibus quasi cinctâ... MELES SURINAMENSIS.

Ichneumon de *Yzquiepatl*, seu *Vulpecula Americana*, quæ colore *Maizium* torrefactum æmulatur. *Seb. vol. I. p. 68. Fig. T. 42. F. 1. [Fig. bona]*.

Yzquiepatl, seu *Vulpecula*, quæ *Maizium* torrefactum colore æmulatur; *Hernandezii. Raf. Syn. Quadr. p. 181.*

Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 332. (Fig. non æquè bona).

Coati Hernandezii. Klein. Quadr. p. 72.

Vulpes Indica, Izquiepatl dicta. Jonst. Quadr. p. 94.

Les Américains l'appellent QUASTE. Seba.

Corporis longitudo 1 $\frac{1}{2}$ circiter est pedis. Breves habet auriculas; sinciput rotundum; rostrum elongatum; crura breviora; ungues nigros, longos & incurvos. In toto corpore,

La longueur de son corps est d'environ 1 $\frac{1}{2}$ pied. Il a les oreilles courtes; le devant de la tête rond; le museau allongé; les jambes courtes; les ongles noirs, longs & recourbés. Tout son

corps, excepté son ventre, qui est jaune, est couvert de poils d'un marron foncé & noirâtre : la couleur du devant de la tête est moins foncée que celle du dos. Sa queue, qui est de la longueur de son corps, est brune, & comme annelée de jaunâtre. On le trouve dans la Nouvelle Espagne, & à Surinam.

Hernandez dit qu'il y en a deux autres espèces ; l'une appelée *Yzquiepatl*, qui diffère du précédent par plusieurs bandes blanches qu'il a sur le dos ; & l'autre appelée *Conepatl*, qui en diffère par une seule bande blanche qu'il a de chaque côté, & qui s'étend aussi sur la queue.

excepto ventre flavescens ; vestitur pilis ex saturatè spaldiceo nigricantibus : incipit color colore dorsi paulò dilutior est. Cauda, quæ corporis longitudinem adæquat, fusca est, annulisque flavicantibus quasi cincta. Habitat in Novâ Hispaniâ, & Surinamensi Insulâ.

Hernandez alias duas species refert ; quarum una *Yzquiepatl* vocata, à præcedente differt fasciis multis in dorso candentibus ; altera verò *Conepatl* vocata, ab eâ discrepans, unicâ tantum, utrinque ductâ, candente fasciâ, perque caudam ipsam eodem modo delatâ.

4. LA CIVETTE.

Meles fasciis & maculis albis, nigris, & rufescentibus variegata... CIVETTA.

Meles unguibus uniformibus cinerea. Zibethica. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 10. sp. 2.

Coati, Civetta vulgò. Klein. Quadr. p. 73.

Animal Zibethicum. Raj. Syn. Quadr. p. 178.

Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 580. & 581. (Fig. sat bonis).

Animal Zibethi. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 340. Fig. p. 343. [Fig. sat bona].

Jonst. Quadr. p. 109. Fig. T. 72. (Fig. sat bona).

Charlet. Exer. p. 20.

Felis Zibethi. Gess. Quadr. Fig. p. 948. (Fig. sat bona).

Catus aut Felis Zibethi. Gess. Icon. Quadr. Fig. p. 72. & 126. [Fig. sat bonis].

Catus Zibethicus Scaligeri. Jonst. Charlet.

Hyaena odorifera Zibethum gignens, quæ Civetta vulgò. Jonst. Quadr. p. 151. Fig. T. 73. (Fig. sat bona).

Hyaena veteribus nuncupata, nunc autem Civetta. Bell. Obs. Fig. p. 94. (Fig. sat bona).

Civette.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XVI. 257

Civette. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 159. Fig. Pl. 23. [Fig. très bonne].

Les Suédois l'appellent ZIBET. Linn.

Les Anglois, CIVET CAT. Raj.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exitum, 2. est pedum & 5 pollicum. Caput habet strictum; rostrum elongatum; oculos parvos, longos & nigros; aurículas auricularum *felinarum* circiter æmulas; sed minores & obtusiores; crura brevissima, anteriora præsertim, quæ à ventre ad unguium apicem usque 5 tantum pollices longa sunt; ungues nigros, rectos & obtusos. Caput & crura pilis brevibus obsita sunt: in reliquo corpore vestitur pilis duorum generum; alii enim sunt breves, molles, lanæ instar crispæ, & ex cinereo fusci; alii multò longiores, ex albo, nigro, & rufescente variegati: unde fit ut corporis pars superior fasciis & maculis magnitudine inæqualibus, aliis albis, aliis nigris, aliis rufescentibus variegata videatur. Nasi extremitas est nigra; rostrum album. In quolibet capitis latere maxima est macula nigra, in quâ oculus situs est. Pili partem capitis superiorem tegentes, ex albo & nigro variegati sunt: unde pars ita grisea apparet. Auriculæ

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 2 pieds 5 pouces. Elle a la tête étroite; le museau long; les yeux petits, noirs & longs; les oreilles à peu-près semblables à celles des *Chats*, mais moins pointuës, & plus petites; les jambes très courtes, surtout celles de devant, qui n'ont que 5 pouces depuis le ventre jusqu'au bout des ongles, lesquels sont noirs, droits & obtus. Sa tête & ses jambes sont couvertes de poils courts: tout le reste de son corps est couvert de deux sortes de poils; l'un court, doux, frisé comme de la laine, & d'un gris brun; & l'autre beaucoup plus long, & varié de blanc, de noir, & de roussâtre: de là vient que le dessus du corps de l'animal paroît varié de bandes & de taches de différentes grandeurs, les unes blanches, les autres noires, & les autres roussâtres. Le bout du nez est noir, & le museau blanc. Il y a deux grandes taches noires, une de chaque côté de la tête, dans lesquelles sont les yeux. Le dessus de la tête paroît gris, par le mélange du blanc & du noir, dont chaque poil est varié. Les oreil-

K k

les font noires en dehors & bordées de blanc, & garnies en dedans d'un long poil blanc. La gorge, le ventre, & les 4 pieds sont noirs. La queue est noire par dessus, & mêlée d'un peu de blanc par dessous. L'ouverture qui conduit aux receptacles, où s'amasse la matiere odorante, est immédiatement audeffous de l'anus, & a 3 pouces de long; & lorsqu'on la dilate, elle a plus de $1\frac{1}{2}$ pouce de large. Les sacs qui servent à la sécrétion de cette matiere odorante, sont très bien décrits dans les *Mem. de l'Académie*, à l'endroit cité cy-dessus. On la trouve à la *Chine*, & dans la *Nouvelle Espagne*.

extus nigra, albo circumdata; intus longis pilis albis obsita sunt: guttur, venter, & pedes 4 nigri. Cauda in parte superiore est nigra, in inferiore verò ex albo variegata. Statim infra anum orificium habet 3 pollices longum, cumque dilatatur $1\frac{1}{2}$ pollice & amplius latum: quod orificium in receptacula, in quibus colligitur substantia quædam odorata, conducit. Optimam vide folliculorum, hujus substantiæ odoratæ secretioni inservientium, descriptionem, apud *Academicos Parisienses*, loco suprâ citato. Habitat in *Sinensi Regione*, & *Novâ Hispaniâ*.

XXXVIII.

Le Genre de l'Ours.

Son caractère est:
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous séparés les uns des autres:
De s'appuyer sur le talon en marchant.

XXXVIII.

Genus Ursinum.

Hujus character est.
Dentes incisores in utraque maxillâ sex:
Digiti unguiculati,
Omnes à se invicem separati:
Pedes calcaneis incedentes,

** I. L' O U R S.

Ursus niger, caudâ unicolore... URUS.

Ursus caudâ abruptâ. Ursus vulgò. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 4. sp. 1. Faun. Suec. Linn. No. 2.*

Ursus. *Raj. Syn. Quadr. p. 171.*

Klein. Quadr. p. 82.

Gefn. Quadr. Fig. p. 1065. (Fig. sat bona).

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XVI. 259

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 65. (Fig. eadem).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 117. Fig. p. 119. (Fig. ut suprà).

Jonst. Quadr. p. 86. Fig. T. 55. (Fig. bonis).

Charles. Exer. p. 14.

Mus. Worm. p. 318.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 225.

Rzac. Aust. p. 321.

Ours. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 83. Fig. Pl. 9. (Fig. très bonne, excepté le nez qui est trop court).

Les Hébreux l'appellent DOB. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, DUBA. Gefn. Aldro.

Les Arabes, DUBB. Gefn. Aldro.

Les Grecs, Κῆντα.

Les Italiens, & les Espagnols, ORSO. Gefn. Aldro.

Les Allemands, BAR, ou BEER. Gefn. Aldro. Rzac.

Les Bohémiens, NEDWED. Gefn.

Les Polonois, WIEWER. Gefn. NIEDZWIEDZ. Rzac. Klein.

Les Suédois, BİSRU. Linn.

Les Anglois, BEAR. Raj. Gefn.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ extremum usque, $5 \frac{1}{2}$ pedum est; capitis, à naribus ad occipitum, 1 pedis & 5 pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet, pro mole corporis, valdè exiguos; auriculas sat breves, versùs apicem rotundatas; crura brevia; in singulis pedibus digitos 5 validis, incurvis, & nigris unguibus munitos; pollice minimo, & ab aliis digitis non remoto. In toto corpore vestitur pilis longis & densis, in aliquibus nigris, in aliis ex fusco nigricantibus, & in aliis ex nigro & argenteo mixtis. Habitat in Alpibus, inque Germaniâ, Poloniâ, Lithuanâ, Russiâ, Moscoviâ, Nor-

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de $5 \frac{1}{2}$ pieds; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 1 pied 5 pouces; & celle de sa queue de 5 pouces. Ses yeux sont très petits, à proportion de la grandeur de son corps; ses oreilles assez courtes & arrondies vers le bout; ses jambes courtes. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles forts, crochus, & noirs: le pouce est le plus petit, & n'est point séparé des autres doigts. Tout son corps est couvert de poils longs & épais, noirs dans quelques uns, dans d'autres d'un brun noirâtre, & dans d'autres mêlés de noir & d'argenté. On le trouve dans les Alpes, en Allemagne,

K k ij

en Pologne, en Lithuanie, en Russie, en Moscovie, en Nor-
vegé, & dans tous les Pays du
Nord.

**** 2. L'OURS BLANC.**

Ursus albus; caudâ unicolore... URSUS ALBUS.

Ursus albus Martensii. Klein. Quadr. p. 82.

Ursus albus. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 120.

Jonst. Quadr. p. 88.

Mus. Worm. p. 319.

Ours blanc. Hist. d'Issl. & de Gro. Tom. II. p. 47.

Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p. 56. Fig. Tom. II. p. 24. (Fig. bonne).

Il differe du précédent par sa tête qui est plus longue, par son col qui est beaucoup plus mince, & par sa couleur qui est blanche. On le trouve dans le Nord.

A précédente differt capite longiore, collo multo graciliore, & colore, qui albus est. Habitat in Septentrionalibus Regionibus.

3. L'OURS DE LA BAYE DE HUDSON.

Ursus castanei coloris, caudâ unicolore, rostro pedibusque nigris... URSUS Freti HUDSONIS.

Coati Ursulo affinis Americanus. Klein. Quadr. p. 74.

Petit Ours, ou Louveteau. Edwards. Tom. II. Fig. p. 107. (Fig. bonne).

Quickhatch, ou Wolverenne. Voy. de la B. de Hud. Tom. I. Fig. p. 58.

(Fig. bonne).

Quickhatch. Cat. App. p. 29.

Il est un peu plus grand qu'un Loup ordinaire. Ses yeux sont petits & noirs; ses oreilles courtes & rondes; sa queue est d'une longueur médiocre, & paroît plus petite à son origine que vers son bout, où elle est couverte de plus longs poils. Il a le museau & les 4 pieds noirs; le devant de la tête blanchâtre;

Magnitudine *Lupum vulgarem paululum superat. Oculos habet parvos & nigros; auriculas breves & rotundas; caudam mediocris longitudinis, in exortu tenuiorem, quàm versùs extremitatem, in quâ longioribus pilis obsita est. Rostrum & pedes 4 sunt nigri; sinciput albidum; gut-*

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 261
 tur album, maculis nigris variegatum; reliquum corpus castanei coloris, in dorso saturatoris. Habitat in Freto Hudsonis.
 la gorge blanche, marquée de noir : tout le reste de son corps est d'un châtain plus foncé sur le dos qu'ailleurs. On le trouve à la Baye de Hudson.

**** 4. LE COATI.**

Ursus caudâ annulatim variegatâ... COATI.

Ursus caudâ elongatâ. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 4. sp. 2.

Vulpis affinis Americana: Raj. Syn. Quadr. p. 179.

Sloane. Vol. II. p. 329.

Coati Brasiliensium. Klein. Quadr. p. 72.

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 218. [Fig. sat bona].

Coati. Jonst. Quadr. p. 95.

Mus. Worm. Fig. p. 319. (Fig. optima).

Cuati. Jo. de Lact. p. 553.

Vulpes Americana, Mapach dicta. Charles. Exer. p. 13.

Mapach. Jonst. Quadr. Fig. T. 74. (Fig. sat bona exceptis pedibus).

Eusf. Nieremb. Fig. p. 175. (Fig. eadem ut supra).

Mapach, seu Animal cuncta prætentans manibus. Fern. Hist. N. Hisp. p. 11.

Coati simplement dit. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 23.

Raccoon. Cat. App. p. 29.

Les Indiens l'appellent MAPACH. Eusf. Nieremb.

Les Guianois, QUACHY. Barr.

Longitudine corporis Feltm circiter adæquat; crassitie verd eam multum superat. Caput habet latum; rostrum acuminatum; maxillam inferiorem superiore breviorē; oculos exiguos; auriculas breves & subrotundas; crura brevia; in singulis pedibus digitos quinque sat longos, acutis unguibus munitos; pedes posteriores anterioribus majores; plantam pedum pilis omnino destitutam. In toto corpore, exceptis quatuor

Il est à peu-près de la grandeur d'un Chat; mais il a le corps beaucoup plus gros. Il a la tête large; le museau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la supérieure; les yeux petits; les oreilles courtes & arrondies; les jambes courtes; à chaque pied cinq doigts assez longs, armés d'ongles aigus. Ses pieds de derrière sont plus grands que ceux de devant. La plante des pieds est tout à fait dénuée de poils. Tout son corps, exceptés les quatre pieds, qu'il

K k iij

sont couverts de poils courts, est couvert de poils longs & épais, gris & terminés de noir sur le dos, & roux & terminés de gris sur le ventre. Son museau est d'un blanc sale, excepté une bande transversale noire, qui passe par les yeux. Sa queue est annelée alternativement de noir & de blanc jaunâtre. (Il y en a dont tout le poil est d'un roux brun : ils ont aussi la queue annelée). Ses pieds de devant luy servent de mains; soit qu'il s'en serve, comme les *Chiens*, pour tenir ce qu'il mange; soit pour le porter à sa bouche, comme l'*Ours*. On le trouve en *Amérique*,

pedibus pilis brevibus testis; vestitur pilis longis & densis, cinereis apice nigro in dorso, in ventre verò in exortu rufis in exitu cinereis. Facies ei sordide albicat, excepta areola transversa nigra, per oculos ducta. Cauda annulis cingitur alternatim nigris & ex albo flavicantibus. (Sunt qui in toto corpore vestiuntur pilis ex rufo fuscis: cauda ipsorum annulatim etiam variegatur.) Pedibus anterioribus velut manibus utitur; sive, more *Canis*, anterioribus pedibus teneat cibum; sive, sicut *Ursus*, cibum ori admoveat. Habitat in *America*,

* * 5. LE COATI-MONDI,

Ursus naso producto & mobili, caudâ unicolore... COATI-MONDI.

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 15 pouces; & celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, d'environ 6 pouces. Il a le nez fort long, & mobile comme celui d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la supérieure; les oreilles courtes & rondes; à chaque pied 5 doigts armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds de

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 15 circiter est pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 6 circiter pollicum. Nasum habet longissimum, nasi *Porcini* instar mobile; maxillam inferiorem superiore multo breviorum; auriculas breves & rotundas; in singulis pedibus digitos 5 nigris, longis & incurvis unguibus munitos. Pedum anteriorum digiti digi-

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XVI.* 263

tis pedum posteriorum paulò sunt longiores: plantæ pedum pilis omninò denudatæ. In toto corpore vestitur pilis brevibus ex cinereo fuscis. Pili caudæ ejusdem sunt coloris. Apud D. *Lievre* Distillatorem hoc Animal vidj. devant sont un peu plus longs que ceux de derrière. La plante des pieds est tout à fait dénuée de poils. Tout son corps est couvert de poils courts, d'un gris brun: ceux de sa queue sont de la même couleur. Je l'ai vu chez M. *Lievre* Distillateur.

** 6. LE COATI-MONDI A QUEUE ANNELÉE.

Ursus naso producto & mobili, caudâ annulatim variegatâ.

Vulpes minor rostro superiori longiusculo, caudâ annulatim ex nigro & rufo variegatâ. *Barr. Hist. Fr. Eq. p. 167.*

Coati Mondî Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 180.*

Klein. Quadr. p. 72.

Marcgr. Hist. Br. p. 118.

Taxus Suillus. Aldrov. Quadr. dig. viv. Fig. p. 167. (Fig. satisfonâ.)

Coati Mondî. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 17. Fig. Pl. 37. (Fig. très bonne.)*

• Longitudo corporis, ab occipitio ad caudæ exortum usque, 16 est pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 6 $\frac{1}{2}$ pollicum. Caudam habet toto corpore longiorem; nasum longissimum, nasi *Porcini* instar mobile; maxillam inferiorem superiorem multò breviorē; oculos valdè exiguos; aures rotundas, extus pilis brevissimis vestitas, intus vero pilis longis & albidis obfitas; in singulis pedibus digitos 5 nigros, longis & incurvis unguibus munitos; pedum anteriorum digitos digitis posteriorum pedum paulò longiores. La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est de 16 pouces; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 6 $\frac{1}{2}$ pouces. Sa queue est plus longue que tout son corps. Il a le nez fort long, & mobile comme celui d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la supérieure; les yeux très petits; les oreilles rondes, & garnies en dehors de poils fort courts, & en dedans de poils plus longs & blanchâtres; 5 doigts à chaque pied, armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds de devant sont un peu plus longs

que ceux de derrière. La plante des pieds est tout à fait dénuée de poils. Tout son corps est couvert de poils courts, variés de roux & de noir dans la partie supérieure du corps, & tout à fait roux dans la partie inférieure. Sa queue est annelée alternativement de noir & de roux. On le trouve en Amérique.

XXXIX.

Le Genre du Chat.

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire;
Les doigts onguiculés,
Tous séparés les uns des autres:
Les ongles crochus, & qui peuvent être retirés & cachés entièrement.

Obs. Toutes les espèces de ce Genre ont la tête ronde; le museau court; & la langue garnie de pointes, qui la rendent fort rude au toucher. Toutes aussi, exceptés les deux dernières, ont la queue très longue.

XXXIX.

Genus Felinum.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque maxillâ sex:
Digiti unguiculati,
Omnes à se invicem separati:
Ungues hamati, & retractiles.

Obs. Omnes hujus generis species capite rotundo; rostro brevi; & linguâ aculeis scabrâ donantur. Omnes etiam, exceptis duabus ultimis, caudâ longissimâ gaudent.

** I. LE CHAT DOMESTIQUE.

FELIS DOMESTICA.

Felis caudâ elongatâ, auribus æqualibus. Catus. Linn. *Syst. nat. ed. 6.* g. 5. sp. 6.

Faun. Suec. Linn. N° 3.

Catus Domesticus; Felis Domestica. Klein. *Quadr. p. 75.*

Felis Domestica, seu Catus. Raj. *Syn. Quadr. p. 170.*

Sloane. Vol. II. p. 329.

Felis, seu Catus Domesticus. Rzac. *Hist. Nat. Pol. p. 244.*

Felis Domestica. *Jussl. Quadr. p. 126. Fig. T. 72. (Fig. bona.)*

Charlet:

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 265

Charlet. Exer. p. 20.

Felis, vel Catus. Gsf. Quadr. p. 344. Fig. p. 345. (Fig. bona).

Gsf. Icon. Quadr. Fig. p. 28. (Fig. bona.)

Felis. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 564.

Les Hebreux l'appellent CATUL, & SCHANAR, ou SCHUNARA. Gsf. Aldro.

Les Grecs, ΚΑΤΑΡ.

Les Sarasins, KATT. Gsf.

Les Espagnols, GATO, ou GATA. Gsf. Aldro.

Les Italiens, GATTA, ou GATTO. Gsf. Aldro.

Les Allemands, KATZ. Gsf.

Les Illyriens, KOCZKA. Gsf.

Les Polonois, KOC. Rzac.

Les Suédois, KATTA. Linn.

Les Anglois, CAT. Raj. Gsf. Aldro.

Felis est animal omnibus ita notum, ut descriptione non indigeat. Le Chat est un animal trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire.

** 2. LE CHAT SAUVAGE.

Felis pilis ex fusco, flavicante, & albido variegatis vestita; caudâ annulis alternatim nigris & ex fordidè albo flavicantibus cincta.... FELIS SYLVESTRIS.

Catus sylvestris ferus, vel feralis; Eques arborum. Klein. Quadr. p. 75.

Catus sylvestris. Gsf. Quadr. p. 353.

Gsf. Icon. Quadr. p. 97.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 217.

Felis sylvestris. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 582. Fig. p. 583. (Fig. bona).

Jonst. Quadr. p. 127. Fig. T. 72. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 21.

Eques arborum, Germanis. Gsf. Aldro.

Les Hebreux l'appellent ZIM. Gsf. Aldro.

Les Espagnols, GATO MONTÉS. Gsf.

Les Allemands, WILDE KATZE, Rzac.

Les Polonois, KOT DZIKI; ZBIK. Rzac.

Figurâ suâ Felem domesticam æmulatur; sed magnitudine eam paululum antecellit. In pedibus anterioribus 5 digitis donatur, in posterioribus verò 4 tantum: pollex, Il ressemble par sa figure au Chat domestique; mais il est un peu plus grand. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux derrière: le pouce, dans les pieds de devant, est éloigné des

autres doigts , & articulé plus haut. Tout son corps est couvert de poils variés de brun, de jaunâtre , & de blanchâtre : le brun domine sur le dos, & le blanchâtre sous le ventre. Sa queue est annelée alternativement de noir & de blanc sale & jaunâtre , & est terminée de noir. On le trouve dans les forêts.

in anticis pedibus, ab aliis digitis est remotus , & altius collocatus. Per universum corpus vestitur pilis ex fusco, flavicante, & albedo variegatis: dorsum fuscus est; venter verò magis albidus. Cauda annulis alternatim nigris & ex fordide albo flavicantibus cingitur, nigroque colore terminatur. Habitat in sylvis.

3. LE CHAT SAUVAGE TIGRÉ.

Felis ex griseo flavescens , maculis nigris variegata... FELIS SYLVESTRIS TIGRINA.

Felis sylvestris tigrinus, ex Hispaniolâ. Seb. Vol. I. p. 77. Fig. T. 48. F. 2. (Fig. bona).

Feles fera tigema. Barr. Hist. Er. 27. p. 153.

Catus Tepe Maxtlaton dictus, Tigrinus, ex Hispaniolâ. Klein. Quadr. p. 75.

Tepe Maxtlaton. Fern. Hist. N. Hisp. p. 9.

Maraguao, sive Maracua. Marcgr. Hist. Br. p. 233.

Chat-Tigre. Kolbe. Tom. III. p. 50.

Les Espagnols l'appellent TEPE MAXTLATON. Seba.

Les François de la Guiane, CHAT-TIGRE. Barr.

Les Guianois, MALAKAYA. Barr.

Il est de la grandeur du Chat domestique. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles courtes & arrondies; la queue longue & pointue. Tout son corps est d'un gris jaunâtre, marqué de taches noires. On le trouve au Cap de Bonne Espérance , & en Amérique.

Magnitudine *Felem domesticam* adæquat. Ingentes habet & nigros oculos; auriculas breves & subrotundas; caudam longam & acutam. Color totius corporis est ex griseo flavicans, maculis nigris inspersis. Habitat in Capite Bona Spei, & Americâ.

** 4. LE CHAT D'ANGORA.

Felis pilis longissimis toto corpore vestita... FELIS ANGORENSIS,

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 267.
Felis caudâ elongatâ, auribus penicilliformibus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 5.

Figurâ suâ *Felem domesticam* imitatur : ab ea autem differt pilis longissimis, quibus corpus vestitur. Habitat in Angorâ. Il ressemble au *Chat domestique* par sa figure : il en diffère seulement par ses poils qui sont tres longs. On le trouve à Angora.

**** 5. LE LION.**

Felis caudâ in floccum desinente... LEO.

Felis caudâ elongatâ, floccosâ, thorace jubato. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 1.

Leo. Raj. Syn. Quadr. p. 161.

Klein. Quadr. p. 81.

Gefn. Quadr. Fig. p. 642. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 66. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 2. Fam. Fig. p. 6. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 78. Fig. T. 50. & 51. (Fig. bonis).

Charlet. Exer. p. 14.

Mus. Worm. p. 317.

Bont. Ind. ori. p. 55.

Lion. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. Le Mâle p. 3. Fig. Pl. 1. La Femelle p. 19. Fig. Pl. 3. (Fig. très bonnes).

Kolbe. Tom. III. p. 2. Fig. p. 4. F. 1. & 2. (Fig. bonnes).

Les François appellent le mâle LION ; & la femelle, LIONNE.

Les Latins, le mâle, LEO ; & la femelle, LEONA.

Les Hebreux, LABI ; LAISCH ; ARI ; ARIECH ; GUR ; & KEPHUR. Gefn. Aldro.

Les Chaldéens, ARIAYAN. Gefn. Aldro.

Les Grecs, ΛΕΩΝ.

Les Arabes, ASAD. Gefn. Aldro.

Les Perses, GERAD. Gefn. Aldro.

Les Sarasins, SEBEY. Gefn. Aldro.

Les Espagnols, LEON. Gefn. Aldro.

Les Italiens, LEONE. Gefn. Aldro.

Les Allemands & les Illyriens, LEW. Gefn. Aldro.

Les Suédois, LEYON. Linn.

Les Anglois, LION. Raj. Gefn. Aldro.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exitum usque, 7 $\frac{1}{2}$ pedes æquar; altitudo, à parte superiore

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 7 $\frac{1}{2}$ pieds ; & sa hauteur, depuis la

partie supérieure du dos jusqu'à terre, de 4 $\frac{1}{2}$ pieds. Sa queue est très longue, & est terminée par un bouquet de poils. Sa tête est grosse : ses yeux sont brillants ; ses oreilles courtes & arrondies. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière. La couleur de ses poils est fauve dans la partie supérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. Lorsqu'il est vieux, son col & sa poitrine sont couverts d'une très longue crinière.

La femelle est beaucoup plus petite que le mâle ; & quelque vieille qu'elle soit, elle n'a jamais de crinière.

On le trouve en *Asie* & en *Afrique*.

dorsi ad terram, 4 $\frac{1}{2}$ pedes ; Caudam habet longissimam, in pilorum floccum definitem ; caput crassum ; splendentes oculos ; aurículas breves & subrotundas ; in pedibus anterioribus 5 digitos, in posterioribus 4 tantum. Pilorum color in parte corporis superiore est fulvus, in inferiore ex albo flavicans. Cum senescit animal, collum ipsius & pectus jubâ longissimâ ornatur.

Fœmina mare multò minor est ; & quamquàm senectutem adeptâ fuerit nunquam jubatâ eff.

Habitat in *Asia* & *Africa*.

6. LE TIGRE.

Felis flava, maculis longis nigris variegata... TIGRIS.

Felis caudâ elongatâ, maculis virgatis. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 2.

Tigris. Raj. Syn. Quadr. p. 165.

Klein. Quadr. p. 78.

Gesn. Quadr. Fig. p. 1060. (Fig. sat bona, excepto capite) ;

Gesn. Icon. Quadr. p. 66. Fig. p. 67. (Fig. eadem) ;

Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 101. Fig. p. 104. (Fig. eadem) ;

Jonst. Quadr. p. 84. Fig. T. 54. (Fig. eadem) ;

Charlet. Exer. p. 14.

Bont. Ind. ori. p. 52. Fig. p. 53. (Fig. eadem) ;

Tigre. Kolbe. Tom. III. p. 5. Fig. p. 50. (Fig. mauv.) ;

Les Grecs l'appellent Τίγρις.

Les Espagnols, TIGRE. Aldro.

Les Italiens, TIGRE, ou TIGRA. Gesn. Aldro.

Les Allemands, TIGERTHIER. Gesn. Aldro.

Les Suédois, TIGER. Linn.

Les Anglois, TIGER. Raj.

Les Habitans de Java, RADIA OUTANG. Bont. !

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 269

Magnitudine *Leoni* cedit. Il est un peu plus petit que le *Lion*. Ses yeux sont brillants, & Splendentes habet & lucidos oculos; auriculas breves & subrotundas; caudam, caudæ *Leoninæ* instar, longissimam. In toto corpore vestitur pilis brevibus, quorum color est flavus, longis maculis nigris variegatus. Tout son corps est couvert de poils courts, dont la couleur est jaune & variée de taches noires & longues. On le trouve Habitat in *Asia* & *Africa*. en *Asie* & en *Afrique*.

7. LE TIGRE ROYAL.

Felis in dorso fulva, in lateribus subcinerea, in ventre alba; maculis longis nigris variegata... TIGRIS REGIA.

Tigris quam *Lusitani Tigre Royal* appellant. *Klein. Quadr. p. 80.*

Tigre de la grande espèce, que les *Portugais* appellent *Tigre Royal. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 2. p. 137.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ extremum usque, 4 est pedum cum 9 pollicibus; capitis, ab occipitio ad caudæ extremitatem, 14 pollicum; caudæ 2 $\frac{1}{2}$ pedum. Corporis altitudo, à parte superiore dorsi ad terram usque, 3 circiter pedum. Color est in dorso fulvus; in lateribus subcinereus; in ventre albus: totumque corpus longis maculis nigris variegatur. Habitat in *Brasiliâ*.

La longueur de son corps; depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 4 pieds 9 pouces; celle de sa queue de 2 $\frac{1}{2}$ pieds; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 14 pouces; & sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, d'environ 3 pieds. La couleur de son dos est sauve: celle des côtés tire sur le gris; & le ventre est blanc: & en outre tout le corps est varié de longues bandes noires. On le trouve au *Bresil*.

** 8. LE TIGRE D'AMÉRIQUE.

Felis flavescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam rosam referentibus, variegatâ... TIGRIS AMERICANA.

Pardus, an Lynx Brasiliensis, *Jaguara* dicta, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr.* p. 168.

Tigris Americana, *Jaguara Brasiliensis*. *Klein. Quadr.* p. 80.

Jaguara Brasiliensis. *Marcgr. Hist. Br. Fig.* p. 235.

Jaguara. *Pifon. Hist. Nat. Fig.* p. 103.

Tlarlauqui occlori, seu *Tigris Mexicanus*. *Hernand. Hist. Mex. Fig.* p. 498. (*Fig. sat bona*).

Gros Tigre de la Guiane. *Des March. Tom. III.* p. 299.

Tigre. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 3. Fig. Pl. 1.* (*Fig très bone*).

Les Portugais l'appellent ONÇA. *Raj. Klein. Marcgr. Pifon.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 4 pieds; celle de sa queue de 2 $\frac{1}{2}$ pieds; celle de ses jambes de devant, depuis la poitrine jusqu'au bout des doigts, de 1 $\frac{1}{2}$ pied; & celle des jambes de derrière, depuis le ventre jusqu'au bout des doigts, de 1 pied 10 pouces. Il a la tête grosse; les yeux petits, brillants, & pleins de feu; les oreilles petites & arrondies; une barbe pareille à celle d'un Chat; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière. Toute la partie supérieure de son corps est jaunâtre, variée de taches noires, dont quelques unes sont assemblées de façon qu'elles représentent une rose; & la partie inférieure est blanche, variée aussi de taches noires. Les poils sont courts dans les adultes; & dans les jeunes ils sont plus

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium usque, 4 est pedum; caudæ 2 $\frac{1}{2}$ pedum; crurum anteriorum, à pectore ad digitorum apicem usque, 1 $\frac{1}{2}$ pedis; & crurum posteriorum, à ventre ad apicem digitorum, 1 pedis cum 10 pollicibus. Caput habet crassum; oculos parvos, splendentes & lucidos; auriculas breves & subrotundas; barbam barbæ *Felineæ* æmulam; in pedibus anterioribus digitos 5, in posterioribus vero 4. Totæ corporis pars superior flavescit, maculisque nigris, quibusdam ita dispositis ut rosam quodam modo referant, variegatur; & pars corporis inferior alba est, maculis etiam nigris variegata. Pili in adultioribus breves sunt; in junioribus verò longiores, & pau-

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVI. 271
 lulum crispis. Habitat in Ame- longs, & un peu frisés. On le
 ricâ. trouve en Amérique.

9. LE TIGRE NOIR.

Felis nigra, maculis nigris saturationibus variegata... **TIGRIS NIGRA.**

Tigris Jaguarète, Marcgravii. *Klein. Quadr. p. 81.*

Jaguarète Brasiliensis. Raj. Syn. Quadr. p. 169.

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 235.

Jaguarète. Pison. Hist. Nat. Fig. p. 103.

Onçe, espece de Tigre. *Des March. Tom. III. p. 300.*

Les Portugais l'appellent Onça. Raj. Marcgr. Pison.

Magnitudine *Juvenum an-* Il est de la grandeur d'un
num adæquat; & figurâ suâ *Veau d'un an*, & de la figure du
Tigridem Americanam æmu- *Tigre d'Amérique.* Tout son corps
 latur. In toto corpore vesti- est couvert de poils courts, d'un
 tur pilis brevibus, splenden- noir ondé & lustré, varié de ta-
 tibus, nigris, cum umbrâ ches d'un noir plus foncé. On le
 mixtis, cumque maculis co- trouve dans la *Guiane*, & dans
 loris nigri saturationis in cor- le *Brésil*.
 pore dispersis. Habitat in
Guianâ & Brasiliâ.

10. LE TIGRE-BARBET, OU TIGRE FRISÉ.

Felis pilis crispis vestita, maculis nigris variegata... **TIGRIS CRISPA.**

Loup Tigre. *Kolbe. Tom. III. p. 60.*

Pilis crispis, Canis Aqua- Tout son poil est frisé, com-
tici modo, in toto corpore me celui d'un *Barbet*; & il est
 vestitur; & maculis nigris, marqué de taches noires, com-
Tigridis instar, variegatur. me un *Tigre*. On le trouve au
 Habitat in *Capite Bon. Spei. Cap de Bonne-Espérance.*

II. LE TIGRE ROUGE.

*Felis ex flavo rufescens, mento & infimo ventre albicantibus...
TIGRIS FULVA.*

Tigris fulvus. Barr. Hist. Fr. eq. p. 165.

Tigris Cuguacu arana Marcgravii. Klein. Quadr. p. 81.

Cuguacu arana Brasilienſibus. Raj. Syn. Quadr. p. 169.

Marcgr. Hist. Br. p. 235.

Cuguacu ara. Piſon. Hist. Nat. p. 103.

Les Portugais l'appellent TIGRE. Raj. Klein. Marcgr.

Les François de la Guiane, TIGRE ROUGE. Barr.

Il eſt de la grandeur & de la Magnitudine & figurâ cum figure du Tigre d'Amérique : il Tigride Americanâ planè convenit : ab eâ autem colore ex en differe par ſa couleur, qui eſt flavo rufefcente, in dorſo obſcuro, plus foncé ſur le dos qu'ailleurs. Le deſſous diſſert. Sub mento albicat paululûm, ut & in infimo ventre. Pilos habet in tototo corpore breves. Habitat in Guianâ & Braſiliâ. dans le Bréſil.

** 12. LE LEOPARD.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris, in dorſo orbiculatis, in ventre longis, variegata... LEOPARDUS.

Felis caudâ elongatâ, maculis ſuperioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 5. ſp. 3.

Pardalis. Raj. Syn. Quadr. p. 166.

Pardus. Klein. Quadr. p. 78.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 64. Fig. p. 68. (Fig. ſat bona).

Charlet, Exer. p. 14.

Panthera, ſeu Pardalis; Pardus; Leopardus. Gefn. Quadr. Fig. p. 936.

(Fig. ſat bona).

Panthera; Pardalis; Varia; Africana; Leopardus. Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 67. (Fig. ſat bona).

Pardus, Leopardus. Jonſt. Quadr. p. 81. Fig. T. 53. [Fig. bona].

Pardus; Panthera. Proſp. Alp. Egypt. p. 237. Pullus. Fig. T. 15. F. 2. (Fig. ſat bona).

Leopardus, ſeu Panthera. Bont. Ind. Ori. p. 55.

Pardalion

LES QUADRUPÉDES, Classe I. Ordre XVI. 27

Pardalion Aristotelis. Aldro. Klein.

Varia Latinis. Raj. Klein. Gfñ.

Africana Plinio. Raj. Klein.

Lupus Canarius, vel Luparius GAZZ. Klein.

Leopard. Kolbe. Tom. III. p. 5.

Panthère. Kolbe. Tom. III. p. 5.

Les Hébreux l'appellent Namer. Gfñ. Aldro.

Les Chaldéens, NIMRA. Gfñ.

Les Grecs, Πανθήρ; le mâle, Παρδύς; la femelle, Παρδαλίς.

Les Espagnols, LEONPARDAL, ou LEONPARDO. Gfñ. Aldro.

Les Italiens, LEONPARDO. Gfñ. Aldro.

Les Allemands, LEPPARD. Gfñ. Aldro.

Les Illyriens, LEWHART. Gfñ.

Les Suédois, PANTER. Linn.

Les Anglois, LEOPARD. Raj. LYBARDE, ou LEPARDE. Gfñ. Aldro.

Magnitudine *Tigridem Americanam* circiter æquat, & figurâ æmulatur : ab eâ autem differt colore suo, & figurâ & dispositione macularum. Color autem corporis est ex albo flavicans, maculis nigris, in ventre longis, in dorso orbiculatis, sed omnibus à se invicem separatis, & *rosas* nullo modo referentibus, variegatus. In pedibus anterioribus digitos habet 5, in posterioribus 4 tantum. Habitat in *Africâ* & *Indiâ Orientali*.

Il est à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Tigre d'Amérique* : il en diffère par sa couleur, & l'arrangement & la figure de ses taches. Sa couleur est un blanc jaunâtre, varié de taches noires, longues sous le ventre, & arrondies sur le dos, mais toutes séparées les unes des autres, & qui ne représentent point des *roses*. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière. On le trouve en *Afrique* & dans les *Indes Orientales*.

13. LE CHAT-PARD.

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans, maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis, variegata... CATUS-PARDUS.

Felis caudâ elongatâ, maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 5. sp. 4.*

Pardus caudâ brevi. Klein. *Quadr. p. 78.*

Catus Pardus, sive Catus Montanus Americanorum. Raj. *Syn. Quadr. p. 169.*

Tlacoozclôtl; Tlalocelotl; Catus Pardus Mexicanus. *Hernand. Hist. Mex. M m*

Fig. p. 512. (Fig. sat bona).

Chat - Pard. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 109. Fig. Pl. 13. (Fig. bonne).*

Les Anglois l'appellent CAT A MOUNTAIN. Raj.

Les Suédois, WILKATT. Linn.

La longueur de son corps ; depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 2 $\frac{1}{2}$ pieds ; celle de sa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'au bout des doigts des pieds de devant, est de 1 $\frac{1}{2}$ pied. Sa figure extérieure est parfaitement semblable à celle du Chat. Sa queue seulement est moins longue, à proportion de la grandeur de son corps, que celle du Chat. La couleur de tout son corps, exceptés le ventre & l'intérieur des jambes de devant, qui sont d'un blanc jaunâtre, & le dessous de la gorge & de la mâchoire inférieure, qui sont blancs, est rousse, variée de taches noires, longues sur le dos, & rondes sur le ventre & les jambes. Ses oreilles sont rayées transversalement de bandes très noires. On le trouve dans les forêts d'Amérique.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exitum usque, est 2 $\frac{1}{2}$ pedum ; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte superiore dorsi ad apicem digitorum pedum anteriorum, 1 $\frac{1}{2}$ pedis. Figura corporis externa Felem per omnia refert, cauda dumtaxat excepta, quæ, pro ratione magnitudinis animalis, brevior est quàm in Fele. Color totius corporis, exceptis ventre & interiori crurum parte ex albo flavicantibus, & maxillæ inferioris parte inferiore & gutture albis, est rufus, maculis nigris, in dorso longis, in ventre & cruribus orbiculatis, variegatus. Auriculas habet tenuis transversis nigerrimis ornatas. Habitat in America sylvis.

14. LE CHAT-CERVIER.

Felis alba, maculis nigris variegata, caudâ brevî... CATUS CERVARIUS.

Felis caudâ truncatâ, corpore albo maculato. Linn. *syfl. nat. ed. 6. g. 5. sp. 8.*

Lynx colore albo, maculis nigris, caudâ truncatâ. Ad. Upsal. *Klein, Quadr. p. 77.*

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XVI.* 275

Les Prussiens l'appellent KATZ-LUCHS. Klein.

Les Suédois, KATTLO. Linn. Klein.

Caudam habet brevem; La couleur de tout son corps
inque toto corpore albus est, est blanche, variée de taches
maculis nigris variegatus. Ha- noires; & il a la queue courté,
bitat in Canadâ. On le trouve en Canada.

15. LE LOUP-CERVIER.

Felis auricularum apicibus pilis longissimis præditis, caudâ bre-
vi... LYNX.

Felis caudâ truncatâ, corpore rufescente maculato. Linn. syst. nat. ed. 6,
g. 5. sp. 7.

Faun. Suec. Linn. No. 4.

Lynx Aldrovandi. Klein. Quadr. p. 77.

Lynx. Raj. Syn. Quadr. p. 166.

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 90. Fig. p. 91. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 83. Fig. T. 71. (Fig. bonis).

Charlet. Exer. p. 14.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 222.

Lynx; Lupus Cervarius; Chaus; Raphius. Gefn. Icon. Quadr. p. 73. Fig.
p. 74. (Fig. sat bona, excepto capite).

Lynx, seu Lupus Cervarius. Rzac. Aud. p. 313.

Lupus Cervarius; Lynx; Chaus. Gefn. Quadr. Fig. p. 769. (Fig. eadem).

Lupus Cervarius. Gaz. Rup. Best. Fig. T. 13. (Fig. bona).

Lupus Armenius. Rzac.

Lynx. Kolbe. Tom. III. p. 63.

Loup-Cervier. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 127. Fig. Pl. 17. (Fig.
sat bonne).

Les Grecs l'appellent λύξ. Gefn. Aldro.

Les Espagnols, LYNCE. Gefn. Aldro.

Les Italiens, LUPO GATTO. Best.

Les Italiens, les Grisons, & les Savoyards, LUPO CERVERO, ou CERVIERO.
Gefn.

Les Allemands, LUCHS, ou Lws. Gefn. Aldro. Rzac.

Les Prussiens, LUCHS. Gefn.

Les Illyriens, LUPO CERVIRO. Gefn.

Les Polonois, RYS; OSTROWIDZ. Rzac.

Les Suédois, WARGLO. Linn.

Les Anglois, OUNCE. Raj. LYZARNE. Gefn.

Corporis longitudo, ab oc- La longueur de son corps, de-
cipitio ad caudæ exortum us- puis l'occiput jusqu'à l'origine
que, 2 est pedum cum 4 pol- de la queue, est de 2 pieds 4
licibus; capitis, ab extremi- pouces; celle de sa tête, depuis

M m ij

le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 7 pouces; & celle de sa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à l'extrémité des pieds de devant, est de 1 pied 8 pouces. Ses yeux sont brillants & pleins de feu. Sa tête & ses oreilles ressemblent à la tête & aux oreilles d'un *Chat*: au bout de chaque oreille il a une houppé de poils fort longs. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derrière. Les Loups-Cerviers varient beaucoup en couleur: les uns sont mêlés confusément de noir, de gris, & de roux: d'autres sont roux dans toute la partie supérieure du corps, & marqués de taches noires; & dans la partie inférieure d'un gris cendré, aussi marqués de taches noires, mais moins foncées, plus grandes, & en plus petite quantité.

On le trouve en *Italie*, en *Allemagne*, en *Pologne*, en *Lithuanie*, en *Russie*, en *Moscovie*, en *Suède*, en *Asie*, en *Afrique* & en *Canada*.

L'Animal que *M. Charleton* a décrit *Exer. p. 21*, sous le nom de *Siyah-Ghush*, & dont il a donné la Figure *p. 23*, me paroît être de cette espèce.

tate rostri ad occipitium, 7 pollicum; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte dorso superiore ad extremitatem pedum anteriorum, 1 pedis & 8 pollicum. Fulgentes & lucidos habet oculos; caput & aurículas capiti & auriculis *Felinis* similes: in auricularum apicibus fasciculus extat pilis longissimis confusus. Pedes anteriores in 5 digitos, posteriores in 4 tantum fissi sunt. Lynces coloribus multum variant: alii enim ex nigro, cinereo, & rufo confusè mixti sunt: alii in parte corporis superiore rufi, maculis nigris variegati; & in parte inferiore cinerei, maculis pariter nigris, sed dilutioribus, majoribus, minùsque frequentibus, etiam variegati.

Habitat in *Italia*, *Germania*, *Polonia*, *Lithuania*, *Russia*, *Moscovia*, *Suecia*, *Asia*, *Africa* & *Canada*.

Animal à Dom. *Charleton* *Exer. p. 21*. descriptum, sub isto nomine *Siyah-Ghush*, & figuratum *p. 23*, *Lyncis* species mihi videtur.

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre XVI. 277

SECTIO II.

SECTION II.

Ea quorum digiti membranis inter se connectuntur.

Ceux dont les doigts sont joints ensemble par des membranes.

UNICO Genère, *Lutra* scilicet, constituitur hæc Sectio.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, sçavoir celui de la *Loutre*.

X L.

X L.

Genus Lutra.

Le Genre de la Loutre.

Hujus character est
Dentes incisores in utraque
maxillâ sex :
In singulis pedibus digiti quin-
que unguiculati,
Membranis inter se connexi.

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à cha-
que mâchoire :
A chaque pied cinq doigts on-
guiculés,
Jointes ensemble par des mem-
branes.

Obs. Omnia hujus Generis
Quadrupeda Amphibia sunt, pis-
cibusque victitant.

** Obs.* Toutes les especes de ce Gen-
re sont Amphibies, &c se nourrissent
de Poissons.

** I. LA LOUTRE.

Lutra castaneæ coloris... LUTRA.

Lutra digitis æqualibus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 7. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 30.

Lutra. Raj. Syn. Quadr. p. 187.

Klein. Quadr. p. 91.

Gesn. Quadr. p. 774. Fig. p. 776. (Fig. bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 84. (Fig. bona).

Gesn. Pisc. Fig. p. 608. (Fig. bona).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 292. Fig. p. 293. (Fig. mala).

Jonst. Quadr. p. 104. Fig. T. 68. (Fig. sat bona).

Charlet. Exer. p. 18.

Bell. de aquat. p. 31. Fig. p. 32. (Fig. bona).

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 221.

Lutra, vel Lutra, vel etiam Lutris. Gesn. Icon. Aquat. Fi. p. 353. (Fig. bona).

M m iiij

Lutra, seu *Canicula aquatica*. *Rzac. Aut.* p. 313.

Canis fluviatilis Aëtii. *Gefn. Aldro. Jonst.*

Loutre. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 151. Fig. Pl. 21. (Fig. très-bonne).*

Les Grecs l'appellent *ἰσδρις*.

Les Espagnols, *NUTRIA*. *Gefn. Aldro.*

Les Italiens, *LODRA*; *LODRIA*; *LOUTRA*. *Gefn. Aldro.*

Les Savoyards, *LEURE*. *Gefn. Aldro.*

Les Illyriens & les Polonois, *WYDRA*. *Gefn. Aldro. Rzac.*

Les Suédois, *UTTER*. *Linn.*

Les Anglois & les Allemands, *OTTER*. *Raj. Gefn. Aldro.*

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est de 2 pieds 2 pouces; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, est de 5 pouces; & celle de sa queue de $1\frac{1}{2}$ pied. Ses yeux sont très-petits; ses oreilles très-courtes, rondes, & placées plus bas que les yeux; ses jambes très-courtes. Elle a à chaque pied 5 doigts, tous joints ensemble par des membranes: le pouce est plus court que les autres doigts. Toute la partie supérieure du corps, la queue & les jambes sont d'un marron plus ou moins foncé, La gorge, l'estomach, & le ventre sont d'un gris blanc. On la trouve aux bords des eaux,

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum usque, 2 est pedum cum 2 pollicibus; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 5 pollicum; caudæ $1\frac{1}{2}$ pedis. Oculos habet valdè exiguos; aurículas brevissimas, rotundas, infra oculos positas; crura brevissima; in singulis pedibus digitos 5, omnes membranis inter se connexos; pollice aliis digitis brevior. Pilorum color in parte corporis superiore, caudâ & cruribus est castaneus, in aliis dilutior, in aliis saturatior. Guttur, pectus, & venter ex cinereo albicant, Habitat in ripis aquarum.

2. LA LOUTRE DU BRÉSIL.

Lutra atricoloris, maculâ sub gutture flavâ... *LUTRA BRASILIENSIS*,

Lutra pollice digitis brevior. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 7. sp. 2.

Lutra nigricans, caudâ depresso & glabrâ. *Barr. Hist. Fr. 17. p. 155.*

Lutra Brasiliensis. Raj. Syn. Quadr. p. 189.

Klein. Quadr. p. 91.

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XVI.* 279

Jiya, quæ & Cariguebeju appellatur à Brasiliensibus. *Marcegr. Hist. Br.*

Fig. p. 234.

Jiya, five Carigueibeju. *Jonst. Quadr. p. 104. Fig. T. 60.*

Carygueibeyn. *Charles, Exerc.* p. 19.

Loutre, ou Cariguebéu. *Des March. Tom. III. p. 306.*

Les Portugais l'appellent LOUTRA. Raj. Marcgr.

Præcedenti magnitudine cedit; eam autem figurâ æmulatur. Oculos habet nigros, & rotundos; auriculas breves, subrotundas, & infra oculos positas; in singulis pedibus digitos 5 (*m*) unguitibus fuscis & acutis munitis; pollice aliis digitis brevior. In toto corpore vestitur pilis atris, exceptis qui caput obtegunt, qui sunt obscurè fusci, & maculâ sub gutture flavâ. Habitat in *Brasilid*.

Elle est un peu plus petite que la précédente; mais elle lui ressemble par sa figure. Ses yeux sont noirs & ronds; ses oreilles courtes, arrondies, & placées plus bas que les yeux. Elle a à chaque pied 5 doigts (*m*) armés d'ongles bruns & aigus; le pouce est plus court que les autres doigts. Tout son corps est couvert de poils noirs, exceptés ceux de la tête qui sont d'un brun foncé, & une tache jaune, qu'elle a sous la gorge. On la trouve au Brésil.

(m) Utrum digiti membranis inter se connexi sunt, prorsus ignoro: si revera sunt separati, in hoc Genere Animalis istud non est reponendum.

(m). Je ne sais si les doigts sont joints ensemble par des membranes : s'ils ne l'étoient pas, elle ne seroit pas de ce Genre.





ORDRE XVII. ORDO XVII.
LES QUADRUPEDES QUADRUPEDA

Qui ont six dents incisives à la mâchoire supérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

Dentibus incisivis in maxilla superiore sex, in inferiore octo; & digitis unguiculatis prædita.

CET Ordre ne contient qu'un seul Genre, qui est celui de la Taupe.

UNICO Genere, *Talpa* scilicet, constituitur hic Ordo.

XLI.

Le Genre de la Taupe. (Fig. 7.)

Son caractère est
D'avoir six dents incisives à la mâchoire supérieure (Fig. 7. a.), huit à l'inférieure (Fig. 7. b.);

Les doigts onguiculés:

La plante des pieds de devant tournée en dehors.

Obs. Toutes les espèces de ce Genre vivent sous terre, & y font des tanières, dans lesquelles elles se cachent,

XLI.

Genus *Talpa*. (Fig. 7.)

Hujus caracter est
Dentes incisores in maxilla superiore sex (Fig. 7. a.), in inferiore octo (Fig. 7. b.);

Digiti unguiculati:

Plantæ pedum anteriorum extrorsum versæ.

Obs. Omnes hujus Generis species sub terrâ vitam agunt, ibiqueuniculos condunt, in quibus delitescunt.

** I. LA TAUPE.

- *Talpa caudata*, nigricans, pedibus anticis & posticis pentadactylis... TALPA VULGARIS.

Talpa caudata. Linn. *syfl. nat.* ed. 6. g. 13. sp. 1.
Faun. Suec. Linn. No. 17.

Talpa

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVII. 281

Talpa nostras, nigra communiter. Klein. Quadr. p. 60.

Talpa. Raj. Syn. Quadr. p. 236.

Gefn. Quadr. Fig. p. 1055. [Fig. sat bona].

Gefn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. (Fig. eadem).

Aldro. Quadr. dig. viv. p. 449. Fig. p. 451. No. 2. (Fig. sat bona).

Jonst. Quadr. p. 118. Fig. T. 66. [Fig. sat bona].

Charlet. Exer. p. 25.

Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 236.

Talpa. Kolbe. Tom. III. p. 51.

Les Grecs l'appellent *Arvax*.

Les Espagnols, *Topo*. Gefn. Aldro.

Les Italiens, *TALPA*. Gefn. Aldro.

Les Boulonnois, *TOPINARA*. Aldro.

Les Suisses, *SCHÄR*, ou *SCHÄRMUS*. Gefn.

Les Allemands, *MULWERF*. Gefn. Aldro. *MAUL-WURFF*. Rzac.

Les Illyriens, *KRTICZE*. Gefn. Aldro.

Les Polonois, *KRET*. Rzac.

Les Suédois, *MULLVAD*. Linn.

Les Smolandois, *SURCK*. Linn.

Les Flamands & les Hollandois, *MOLL*, ou *MOLLMUSS*. Gefn. Aldro.

Les Anglois, *MOLE*, ou *MOLDWRAP*, ou *WANT*. Raj. Gefn. Aldro.

Corporis longitudo, ab extremitate nasi ad caudæ exitum, 5 est circiter pollicum; capitis, ab extremitate nasi ad occipitium, 1 $\frac{1}{2}$ pollicis. Caudam habet brevissimam; oculos seminis *Millii* magnitudine, nigros, & sub pilis occultos; nasum 4 lineis ultra maxillam superiorem prominentem; crura brevissima; pedes anteriores posterioribus latiores, & ad humum fodiendum aptatos; in singulis pedibus digitos 5, validis unguibus munitos, præsertim in anticis pedibus. Per univ. corpus vestitur pilis brevibus, densis, ferici instar mollissimis, & ni-

La longueur de son corps, depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 5 pouces; celle de sa tête, depuis le bout du nez jusqu'à l'occiput, de 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Sa queue est très courte. Ses yeux sont gros comme un grain de millet, noirs, & cachés sous les poils. Son nez avance de 4 lignes au-delà de la mâchoire supérieure. Ses jambes sont très courtes: ses pieds de devant sont plus larges que ceux de derrière, & propres à fouiller la terre. Elle a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles forts, surtout ceux des pieds de devant. Tout son corps est couvert de poils courts, épais, doux, & noirs.

N n

râtres. On la trouve sous terre gricantibus. Habitat sub terrâ dans les champs, les prés, & les in agris, pratis & hortis. jardins.

** 2. LA TAUPE BLANCHE.

Talpa caudata, alba, pedibus anticis & posticis pentadactylis... TALPA ALBA.

Talpa caudata. Faun. Suec. Linn. N°. 17.

Talpa coloris albi. Raj. Syn. Quadr. p. 236.

Talpa nostrâs albi coloris. Klein. Quadr. p. 60.

Talpa alba nostras. Seb. Vol. I. p. 51. Fig. T. 31. F. 1. (Fig. bona).

Talpa alba. Rzac. Autt. p. 329.

Les Polonois l'appellent KRET. Rzac.

Elle est de la grandeur, & de la figure de la précédente : elle n'en diffère que par sa couleur qui est blanche. On la trouve aussi sous terre dans les champs, les prés, & les jardins.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmulat : ab eâ autem differt colore, qui in toto corpore albus est. Habitat, ut illa, sub terrâ in agris, pratis, & hortis.

3. LA TAUPE VARIÉE.

Talpa caudata, ex albo & nigro variegata, pedibus anticis & posticis pentadactylis... TALPA VARIEGATA.

Talpa caudata. Faun. Suec. Linn. N°. 17.

Talpa maculata, Oost-frisia. Klein. Quadr. p. 60.

Seb. Vol. I. p. 68. Fig. T. 41. F. 4. (Fig. bona).

Elle diffère des précédentes, parce qu'elle est un peu plus grande, & que tout son corps est comme marbré de taches noires & de taches blanches.

A præcedentibus differt magnitudine quâ eas paululum antecellit, & colore, qui in toto corpore maculis albis & maculis nigris, mar-moris in modum, variegatur.

Obs. Je crois que ces trois Tanpes ne sont que des variétés de la même espèce.

Obs. Tres Talpæ præcedentes ejusdem speciei varietates mihi videntur.

LES QUADRUPÈDES, *Classe I. Ordre XVII.* 283

4. LA TAUPE DE VIRGINIE.

Talpa caudata, nigricans, ex saturatè purpureo mixta, pedibus anticis & posticis pentadactylis... TALPA VIRGINIANA.

Talpa caudata. Faun. Suec. Linn. No. 17.

Talpa nigra Virginiana. Klein. Quadr. p. 60.

Talpa Virginiana niger. Seb. Vol. I. p. 51. Fig. T. 32. F. 3. (Fig. bona).

Magnitudine & figurâ *Talpam vulgarem æmulatur* : ab eâ tantum differt colore pilorum, qui nigricantes sunt, splendentes, & saturatè purpureo coruscantes. Habitat in *Virginid.*

Elle est de la grandeur & de la figure de la *Taupe ordinaire* : elle en diffère seulement par la couleur de son poil qui est noirâtre, luisant, & mêlé d'un pourpre foncé. On la trouve en *Virginie.*

5. LA TAUPE ROUGE D'AMÉRIQUE.

Talpa caudata, ex dilutè cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis... TALPA AMERICANA RUFA.

Talpa rubra Americana. Klein. Quadr. p. 60.

Seb. Vol. I. p. 52. Fig. T. 32. F. 2. (Fig. bona).

Magnitudine & figurâ corporis *Talpam vulgarem æmulatur* ; ab eâ autem differt figurâ pedum, quorum anteriores in 3 tantum fissi sunt digitos, quorum exterior unguem gerit validissimum, longum, acutum, & parumper incurvum ; medius minor, minore etiam ungue munitus est ; interior verò minimus. Pedes posteriores in 4 abeunt digitos æqualibus ferè unguibus armatos. Per universum corpus vestitur pilis ex dilutè

Elle est de la grandeur de la *Taupe ordinaire* : elle luy ressemble par la figure de son corps ; mais elle en diffère par celle de ses pieds, dont ceux de devant n'ont que trois doigts, dont l'extérieur est muni d'un ongle très fort, long, pointu, & un peu recourbé ; le doigt du milieu est plus petit, ainsi que son ongle ; & le doigt intérieur est très petit. Les pieds de derrière ont chacun 4 doigts armés d'ongles presque égaux. Tout son corps est couvert de poils

N n ij

d'un roux tirant sur un cendré cinereo rufus. Habitat in A-clair, On la trouve en Amérique. *mericâ.*

6. LA TAUPE DORÉE DE SIBERIE.

Talpa ecaudata, ex viridi aurea, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis... *TALPA SIBERICA AURÆA.*

Talpa ecaudata. Linn. *syff. nat. ed. 6. g. 13. sp. 2.*

Talpa Sibericus versicolor, *Aspalax dictus.* Klein. *Quadr. p. 60.*

Seb. Vol. I. p. 51. Fig. T. 32. Mas F. 4. Femina F. 5. [Fig. bonis].

Elle est à peu près de la grandeur de la *Taupe ordinaire*; elle en differe parce qu'elle a le nez beaucoup plus court, qu'elle n'a point de queue, & par la figure de ses pieds, qui sont semblables à ceux de la précédente. Tout son corps est marqueté de diverses couleurs, parmi lesquelles domine l'or & le verd. On la trouve en *Siberie*. Magnitudine *Talpam vulgarem* circiter æquat; ab eâ autem differt naso multò brevior, caudæ defectu, & figurâ pedum pedibus præcedentis similia. In toto corpore variis refulget coloribus, quos inter præcipuè emicat ex viridi aureus. Habitat in *Siberiâ*.





ORDO XVIII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisivis in maxilla superiore decem, in inferiore octo; & digitis unguiculatis donata.

UNICO Genere, Philandri scilicet, hic ordo, sicut & præcedens, constituitur.

XLII.

Genus Philandri.

Hujus character est

Dentes incisores in maxilla superiore decem, in inferiore octo:

In singulis pedibus digiti quinque unguiculati:

Pollex distinctus.

Obs. 10. Omnes hujus Generis species caudam habent caudæ Murina æmulam, & longissimam, exceptâ specie ultimâ, quæ brevissimâ caudâ donatur.

Obs. 20. In maxilla superiore 10 sunt dentes incisores, quorum 2 intermediis alijs sunt majores; in maxilla inferiore octo tantum: præterea in utraque maxilla den-

ORDRE XVIII.

LES QUADRUPÈDES

Qui ont dix dents incisives à la mâchoire supérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans le précédent, qu'un seul Genre, sçavoir celui du Philandre.

XLII.

Le Genre du Philandre.

Son caractère est

D'avoir dix dents incisives à la mâchoire supérieure, huit à l'inférieure:

A chaque pied cinq doigts onguiculés:

Le pouce bien distinct.

Obs. 10. Toutes les especes de ce Genre ont une queue semblable à celle d'un Rat, & très longue, excepté la dernière, qui l'a très courte.

Obs. 20. Elles ont toutes à la mâchoire supérieure 10 dents incisives, dont les 2 du milieu sont plus grandes que les autres; & 8 à la mâchoire inférieure: elles ont en outre à chaque

N n ij

mâchoire plusieurs dents canines de chaque côté, & ensuite plusieurs dents molaires dont le nombre varie.

tes canini plures utrinquē, & deinde molares etiam plures utrinquē, quorum varietat numerus.

Obf. 30. Leurs pieds sont conformés de même que ceux des *Singes*. Comme eux, elles s'appuyent sur le talon en marchant. Leurs ongles sont aigus.

Obf. 30. Pedes habent pedibus *Simiarum* similes; *Simiarumque* instar super calcanea incedunt. Unguibus acutis donantur.

** 1. LE PHILANDRE.

Philander saturatē spadiceus in dorso, in ventre flavus, maculis suprà oculos flavis.. PHILANDER.

Philander, Opallum, seu Carigueia Brasiliensis. *Seb. Vol. I. p. 56. Fig. T. 36. Mas F. 1. Fœmina F. 2. Pullus F. 3. (Fig. optimis).*
Didelphis mammis intrâ abdomen. *Poss. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 1.*

Mus Marsupialis sylvestris Brasiliensis. *Klein. Quadr. p. 59.*
Carigueia Brasiliensis. *Raj. Syn. Quadr. p. 182.*

Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 222. (Fig. mala).
Carigueia. *Jonst. Quadr. p. 94. Fig. T. 63. [Fig. mala].*
Pijon. Hist. Nat. Fig. p. 323. [Fig. mala].
Carigue, vel Sarigoy. *Jo. de Laët. p. 82.*

Opallum. *Jo. de Laët. p. 82.*

Opallum. *Cœ. App. p. 29.*

Tlaquatzin. *Jonst. Quadr. Fig. T. 73. [Fig. sat bona, si pilus brevior esset].*
Euf. Nieremb. Fig. p. 156. (Fig. ut supra).

Hernand. Hist. Mex. p. 330.

Vulpes major putoria, caudâ tereti & glabrâ. *Barr. Hist. Fr. eq. p. 166.*

Semivulpa. *Gesn. Quadr. Fig. p. 98. (Fig. fœla). (n).*

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 90. (Fig. eadem).

Jonst. Quadr. Fig. T. 58. (Fig. eadem).

Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p. 223. (Fig. etiam fœla).

Carigoy, vel Sarigoy Lerii. *Raj. Jonst. Marcgr.*

Jupatima nonnullis. *Raj. Jonst. Marcgr.*

Manicou du P. Feuillée. *Klein.*

Les Portugais l'appellent ROPOZA. *Raj.*

Les Anglois, POSSUM. *Raj.*

Les François de la Guiane, PUANT. *Barr.*

Les Guianois, AOUARI. *Barr.*

(n) Les Figures qu'ont donné de cet animal *Gesner*, *Jonston*, & *Aldrovande*, ne lui ressemblent en aucune façon, ni n'ont à aucun *Quadrupède* connu.

(n) Figures, quæ hujus animalis dederunt *Gesnerus*, *Jonstonus*, & *Aldrovandus*, nullo modo id repræsentant, nec etiam ullam *Quadrupedem* notum.

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVIII. 287

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum usque, 8 circiter est pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 3 pollicum; caudæ 1 pedis. Crura anteriora 3 pollices longa sunt; posteriora verò paulo plus 4 pollices. Rostrum habet acuminatum; maxillam superiorem ultrà inferiorem paulò prominentem; parvos, rotundos, & lucidos oculos; auriculas longas, latas, glabras, ad tactum mollissimas, tenuissimas & translucidas, *Vulpinarum* instar erectas; barbam *Felinam*, nigris confatam setis, cujusmodi & in genis & suprà oculos habentur. Cauda, ab exortu ad tertiam longitudinis partem, pilis obsita est; in reliquâ longitudine squamulis tegitur, caudamque *Murinam* æmularur. Pili saturatè spadicei partem corporis superiorem obtegunt; qui verò oris ambitum, ventrem, & crura cooperiunt, sunt flavi. Caput pilis fuscis vestitur, & suprà utrumque oculum macula inest flava. Habitat in *Americâ*.

Hujus speciei femina in infimo ventre, propè crura posteriora, sacculum habet, cujus orificium $2\frac{1}{2}$ pollices longum est, in quo mamma

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 8 pouces; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 3 pouces; celle de sa queue de 1 pied; celle de ses jambes de devant de 3 pouces; & celle des jambes de derrière d'un peu plus de 4 pouces. Son museau est pointu; sa mâchoire supérieure un peu plus longue que l'inférieure: ses yeux sont petits, ronds & brillants; ses oreilles longues, larges, sans poils, douces au toucher, très minces, transparentes, & droites comme celles d'un *Renard*. Il a une barbe semblable à celle d'un *Chat*, composée de foyes noires: il a aussi de pareilles foyes aux joues, & par-dessus les yeux. Sa queue est couverte de poils depuis son origine jusqu'au tiers de sa longueur; le reste est couvert de petites écailles, & semblable à la queue d'un *Rat*. Toute la partie supérieure de son corps est d'un rouge-bay foncé: le tour de sa gueule, son ventre, & ses jambes sont jaunes. Sa tête est brune, & il a au-dessus de chaque œil une tache jaune. On le trouve en *Amérique*.

La femelle de cette espèce a à la partie inférieure du ventre, auprès des jambes de derrière, une espèce de sac, dont l'ouverture a environ $2\frac{1}{2}$ pouces, dans

lequel sont renfermées les mamelles, & où elle met ses petits nouvellement nez.

includuntur, & in quem factus, postquam editi sunt, recipit.

2. LE PHILANDRE ORIENTAL.

Philander saturatè fuscus in dorso, in ventre flavus, maculis supra oculos flavis... PHILANDER ORIENTALIS.

Philander Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 60. Fig. T. 38. F. 1. (Fig. optima).*
Mus Marsupialis. Klein. Quadr. p. 59.
Les Indiens l'appellent PELANDOR-AROE ; selon Fr. Valentin. Seba.

Il ressemble parfaitement au précédent par la figure de toutes ses parties ; mais il est beaucoup plus grand. La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 11 pouces ; & celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 4 pouces ; le reste à proportion. La partie supérieure de son corps est d'un brun foncé ; & l'inférieure est jaune : il a aussi une tache jaune par-dessus chaque œil. On le trouve aux *Indes Orientales*.

Sa femelle a, comme celle du précédent, à la partie inférieure du ventre ce petit sac, dans lequel elle renferme ses petits nouvellement nez.

Omnium partium figurâ præcedenti simillimus est ; ab eo autem differt magnitudine quâ eum antecellit. Corporis enim longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 11 pollices circiter æquat ; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 4 pollices ; reliquæ partes servatâ proportionem longæ sunt. In parte corporis superiore saturatè fuscus est ; in inferiore flavus : & supra utrumque oculum macula est flava. Habitat in *Indiâ Orientali*.

Hujus speciei fœmina, sicut & præcedentis, in infimo ventre sacculo donatur, in quem factus, postquam editi sunt, recipit.

3. LE PHILANDRE D'AMBOINE.

Philander atro spadiceus in dorso, in ventre ex albedo cinereo flavicans, maculis suprâ oculos obscure fuscis... PHILANDER AMBOINENSIS.

Philander maximus Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 64. Fig. T. 39. (Fig. optima).*

Didelphis mammis intra abdomen. *Poss. Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 1.*

Mus Marfupialis maximus Orientalis. *Klein. Quadr. p. 59.*

On l'appelle à Amboine COES-COES. *Seba.*

Corporis longitudo, ab occipito ad caudæ initium usque, 13 est circiter pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitum, 4 $\frac{1}{2}$ pollicum. Caudam habet longissimam, squamis rhomboideis in totâ longitudine testam; rostrum valdè elongatum; auriculas latas, & arrectas; barbam barbæ præcedentium æmulam. Pili partem corporis superiorem tegentes, longi sunt, setacei, atro spadicei; & ad ventris latera utrinquè paulò dilutiorem acquirunt colorem: qui verò partem corporis inferiorem vestiunt, sunt ex albedo cinereo flavicantes. Suprà utrumque oculum macula est obscure fusca. Habitat in *Ambonenfi Insulâ*.

Hujus speciei femina, sicut & præcedentium femina, in infimo ventre sacculo

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 13 pouces; & celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 4 $\frac{1}{2}$ pouces. Sa queue est très-longue, & toute couverte d'écailles rhomboïdes. Son museau est fort allongé. Ses oreilles sont larges, & élevées. Il a une barbe pareille à celle des précédents. Les poils qui couvrent la partie supérieure de son corps, sont longs & soyeux, & d'un rouge-bay noirâtre; & cette couleur s'éclaircit un peu de chaque côté, en s'approchant du ventre: ceux qui couvrent la partie inférieure, sont d'un blanchâtre qui tire un peu sur le jaune cendré. Il a au dessus de chaque œil une tache d'un brun foncé. On le trouve à l'Isle d'Amboine.

La femelle de cette espece a aussi à la partie inférieure du ventre ce petit sac, dans lequel

elle met ses petits nouvellement nez.

donatur, in quem foetus recenter natos recipit.

Obs. Je ne sçais si les especes suivantes ont le caractère de ce Genre : je ne les ai jamais vûes ; & les Auteurs qui les ont décrites, n'ont point déterminé le nombre de leurs dents incisives. Aucune de ces especes n'a à la partie inférieure du ventre ce petit sac propre à renfermer les petits nouvellement nez ; mais, à ce sac près, elles ressemblent assez aux especes précédentes. La forme de leur tête & de leur museau, celle de leur queue, de leurs pieds, qui ont chacun 5 doigts, & dont le pouce est très distinct, sont à peu près les mêmes. D'ailleurs elles ont à peu près la même façon de vivre ; ce qui m'a déterminé à les placer dans ce Genre, jusqu'à ce que de plus exactes observations nous ayeut instruit de leur vrai caractère.

Obs. Utrum species sequentes hujus Genetis characterem habeant protius ignoro : eas nunquam vidi ; auctoresque, qui earum descriptionem dederunt, nullam de numero dentium incisorum mentionem fecerunt. Nulla in infimo ventre sacculus habent, ad foetus recenter natos includendos, comparatum ; in omnibus verò aliis, solo sacculo excepto, cum præcedentibus speciebus satis bene conveniunt. Forma capitis, rostri, caudæ ; & pedum in 5 digitos fissorum, pollice distincto, est ferè eadem. Præterea, eodem ferè modo videntur ; ob quas rationes, eas in hoc Genere reposui, usque dum exactis observationibus ipsarum characteris veram cognitionem habeamus.

4. LE PHILANDRE DU BRÉSIL.

Philander pilis in exortu albis, in extremitate nigricantibus vestitus... PHILANDER BRASILIENSIS.

Taijbi Brasiliensibus. Raj. Syn. Quadr. p. 185.

Marcgr. Hist. Br. p. 223.

Mus Tlaquatzin, seu Taijbi Brasiliensibus. Klein. Quadr. p. 99.

Tlaquatzin, seu Taijbi Brasiliensibus dicta. Seb. Vol. I. p. 57. Fig. T. 36.

F. 4. [Fig. bona].

Taijbi. Jonst. Quadr. p. 95.

Les Portugais l'appellent CACHORRO DOMATO. Raj. Jonst. Marcgr. Seba.

Les Flamands, BOSCHRAATJE. Raj. Marcgr.

Son corps est long de 14 doigts, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue. Son museau est pointu : ses yeux sont noirs, & à fleur de tête ; ses oreilles arrondies, denuées de

Corporis longitudo, ad occipitio ad caudæ exortum, 14 est digitorum. Orem habet acutum ; nigros & prominentes oculos ; auriculas subrotundas, glabras, & te-

LES QUADRUPÈDES, Classe 1. Ordre XVIII. 291
 nuissimas; barbam barbæ *Feline æmulam*; caudam longissimam, ab exortu ad tertiam circiter longitudinis partem, pilis in exortu albis in extremitate nigricantibus obsiram, reliquâ longitudine squamulis teââ. Per universum corpus vestitur pilis in exortu albis splendentibus, in extremitate nigricantibus, & magis quidem in dorso, maximè tamen in cruribus. Habitat in *Brazilia*.
 poils, & fort minces. Il a une barbe semblable à celle d'un Chat. Sa queue, qui est très longue, est couverte, depuis son origine environ jusqu'au tiers de sa longueur, de poils blancs à leur origine & terminés de noirâtre; le reste est couvert de petites écailles. Les poils, qui couvrent tout son corps, sont d'un blanc éclatant à leur origine, & leur extrémité est noirâtre: cette dernière couleur est plus foncée sur le dos, & beaucoup plus encore sur les jambes. On le trouve au *Brazil*.

5. LE PHILANDRE D'AMÉRIQUE.

Philander saturatè spadiceus in dorso, in ventre dilutè flavus, pedibus albicantibus... PHILANDER AMERICANUS.

Mus Scalopes. Klein. Quadr. p. 58.

Mus sylvestris Americanus, Scalopes dictus. Seb. Val. I. p. 48. Fig. T. 31.

Mas F. 1. Fœmina F. 2. (Fig. bonis).

Scalopes. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 416.

Les Brâsiliens l'appellent MARMOSA. Seba.

Magnitudine *Rattum* circiter æquat. Rostrum habet elongatum, & in acumen desinens; magnos & nigros oculos; auriculas latas, pendulas, rarissime dumtaxat pilis obsitas. Promissus mystax labium superius ornat. Cauda est longissima, omnino pilis destituta, & in extremo spiraleriter intorta. Superior corporis pars, & oculorum circumferentia sunt saturatè spa-

Il est à peu près de la grandeur d'un Rat. Son museau est allongé, & se termine en pointe: ses yeux sont grands & noirs; ses oreilles larges, pendantes, garnies seulement de quelques poils clair-semés. Il a à la lèvre supérieure une longue moustache. Sa queue est très longue, & tout à fait dénuée de poils; & son extrémité est roulée en spirale. La partie supérieure du corps, & le tour des yeux sont

d'un rouge-bay foncé: le ventre & le front sont d'un jaune clair: ses pieds sont sans poils, & blanchâtres. On le trouve en Amérique.

6. LE PHILANDRE D'AFRIQUE.

Philander saturatè spadiceus in dorso, in ventre ex albo flavicans, cauda ex saturatè spadiceo maculata... PHILANDER AFRICANUS.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 2.*

Mus Africanus, Kayopollin dictus. *Klein. Quadr. p. 58.*

Seb. Vol. I. p. 49. Fig. T. 31. F. 3. [Fig. bona].

Mus Indicus, dictus Coyopollin. *Charlet. exer. p. 25. No. 5.*

Animal caudimanum, seu Coyopollin. *Euf. Nieremb. p. 158.*

Coyopollin. *Jonst. Quadr. p. 118.*

Fern. Hist. N. Hisp. p. 10.

Il est de la grandeur, & de la figure du précédent; il a seulement la tête plus grosse, ainsi que la queue, qui est toute tachetée de rouge-bay foncé. Ses oreilles sont très minces & transparentes. La partie supérieure de son corps est d'un rouge-bay foncé; son ventre d'un blanc jaunâtre; & ses jambes & ses pieds sont blancs. On le trouve en Afrique.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmuletur; paulò tamen crassius ejus caput est; ita & cauda tantillum crassior & ex saturatè spadiceo maculata. Auriculæ tenuissimæ sunt & translucidæ. Corporis pars superior saturatè spadicea est; venter ex albo flavicans; cruraque & pedes albi. Habitat in Africa.

7. LE PHILANDRE DE SURINAM.

Philander ex rufo helvus in dorso, in ventre ex flavo albicans... PHILANDER SURINAMENSIS.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 2.*

Mus sylvestris Americanus, catulos suos suprà dorsum ferens. *Klein.*

Quadr. p. 58.

Mus seu forex sylvestris Americanus. *Seb. Vol. I. p. 49. Fig. T. 31. Mas F.*

4. Fæmina F. 5. [Fig. bonis].

LES QUADRUPÈDES, Classe I. Ordre XVIII. 293

Magnitudine , & figurâ præcedentes æmulatur. Mirè lucidos habet oculos ; aurículas nudas & rigidas ; prolixam in labio superiore barbam ; & suprà quemlibet oculum binas feras quasi *Suillas* ; caudam glabram , in extremo spiralliter intortam , maculis saturatè spadiceis per totam longitudinem dispersis , in mare tantum , non quidem in fœminâ. Corporis pars superior ex rufo helva est : venter , pedes , rostrum , & frons ex flavo albicant : & oculorum ambitus est saturatè fuscus. Ungues omnes pedum anteriorum , sicut & ungues pollicum pedum posteriorum , breves sunt & obtusi , reliquis unguibus acutis. Habitat in *Surinamensi Insulâ*.

Il est de la grandeur , & de la figure des précédents. Ses yeux sont brillants ; ses oreilles dénuées de poils , & roides. Il a à la lèvre supérieure une longue barbe ; & sur chaque œil deux poils semblables à des soies de *Cochon*. Sa queue est nuë , roulée en spirale à son extrémité , & marquetée , dans le mâle seulement , de taches d'un rouge-bay foncé. La partie supérieure du corps est d'un roux tirant sur le rouge clair : le ventre , les pieds , le museau & le front sont d'un jaune blanchâtre : & le tour des yeux est d'un brun foncé. Tous les ongles des pieds de devant , & ceux des pouces des pieds de derrière sont courts & obtus , & les autres sont aigus. On le trouve à *Surinam*.

8. LE PHILANDRE A GROSSE TESTE.

Philander ex rufo luteus in dorso , in ventre ex flavo albicans , capite crasso... PHILANDER CAPIT CRASSO.

Didelphis mammis extrâ abdomen. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 2.

Mus Americanus major , agrestis , capite grandi. Klein. Quadr. p. 52.

Mus seu forex Americanus , major agrestis , capite grandi. Seb. Vol. I. p. 50. Fig. T. 31. F. 8. (Fig. bona).

Caput habet crassum , latum , & albicans ; aurículas ingentes & glabras ; prolixam in labio superiore barbam. Dorsum est ex rufo luteum : venter verò , cauda crura-

Il a la tête grosse , large & blanchâtre ; les oreilles grandes & sans poils ; une longue barbe à la lèvre supérieure. Son dos est d'un roux qui tire sur le jaune : son ventre , le dessous de

O o iij

sa queue & de ses jambes sont que subitè ex flavo albicant.
d'un jaune blanchâtre. On le Habitat in Americâ.
trouve en Amérique.

9. LE PHILANDRE A COURTE QUEUE.

Philander obscurè rufus in dorso, in ventre helvus, caudâ
brevi & crassâ... PHILANDER CAUDA BREVI.

Didelphis mammis extrâ abdomen. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 2.
Mus sylvestris Americanus. Seb. Vol. I. p. 50. Fig. T. 31. F. 6. (Fig. bona).

Il est de la grandeur, & de la figure du *Philandre de Surinam*. Ses oreilles sont denuées de poils. Il a à la lèvre supérieure une longue barbe; & sur chaque œil deux poils semblables à des foyes de *Cochon*. Sa queue est courte & grosse. Tous ses ongles sont aigus. Son dos est d'un roux foncé; son ventre d'un roux pâle: son museau & son front sont d'un jaune blanchâtre; & le tour de ses yeux est d'un brun foncé. On le trouve en Amérique.

Magnitudine & figurâ *Philandrum Surinamense* æmulatur. Glabras habet aurículas; prolixam in labio superiore barbam; & suprâ quemlibet oculum binas festas, quasi *Suillas*; caudam brevem & crassam; ungues omnes acutos. Obscurè rufus est in dorso; in ventre verò helvus: rostrum & frons ex flavo albicant; & oculorum ambitus est saturatè fuscus. Habitat in Americâ.





b

cave scalp

FIGURARUM <i>Explicatio.</i>	EXPLICATION <i>des Figures.</i>
--	---

Figura 1. Caput Armadilli Guianensis. a, a, dentes ipsius molares.

Fig. 2. Caput Musaranci. a, a, dentes incisores superiores. b, b, dentes incisores inferiores. c, c, c, dentes canini.

Fig. 3. Caput Erinacei. a, dentes incisores superiores. b, dentes incisores inferiores. c, c, dentes canini.

Fig. 4. Caput Pteropi. a, a, a, a, dentes incisores. b, b, b, dentes canini.

Fig. 5. Caput Prosimiz. a, a, a, dentes incisores superiores. b, b, dentes incisores inferiores. c, c, dentes canini.

Fig. 6. Caput Vespertilionis Minoris. a, dentes incisores superiores. b, dentes incisores inferiores. c, dentes canini. d, dens incisorius superior intermedius ope microscopii auctus. e, dens incisorius inferior etiam ope microscopii auctus.

Fig. 7. Caput Talpæ. a, dentes incisores superiores. b, dentes incisores inferiores. c, c, dentes canini.

Figure 1. Tête de l'Armadille de Cayenne. a, a, ses dents molaires.

Fig. 2. Tête de la Musaraigne. a, a, ses dents incisives supérieures. b, b, ses dents incisives inférieures. c, c, c, ses dents canines.

Fig. 3. Tête du Hérisson. a, ses dents incisives supérieures. b, ses dents incisives inférieures. c, c, ses dents canines.

Fig. 4. Tête de la Rouffette. a, a, a, a, ses dents incisives. b, b, b, ses dents canines.

Fig. 5. Tête du Maki. a, a, a, ses dents incisives supérieures. b, b, ses dents incisives inférieures. c, c, ses dents canines.

Fig. 6. Tête de la Petite Chauve-Souris de notre pays. a, ses dents incisives supérieures. b, ses dents incisives inférieures. c, ses dents canines. d, une des dents incisives supérieures intermédiaires grossie à la loupe. e, une des dents incisives inférieures aussi grossie à la loupe.

Fig. 7. Tête de la Taupe. a, ses dents incisives supérieures. b, ses dents incisives inférieures. c, c, ses dents canines.

TABLE

DES QUADRUPÈDES,

*Selon l'Ordre dans lequel ils sont rangés dans cet
Ouvrage.*

O R D R E I.

SECTION I.

I. Genre du Fourmiller.

1. **LE** Fourmiller *Tamanoir*.
2. Le Fourmiller.
3. Le Fourmiller aux longues oreilles.
4. Le Petit Fourmiller.

SECTION II.

II. Genre du *Pholidore*.

1. Le Pholidote.
2. Le Pholidote à longue queue.

O R D R E I I.

SECTION I.

III. Genre du Paresseux.

1. Le Paresseux.
2. Le Paresseux de Ceylan.

SECTION II.

IV. Genre de l'Armadille.

1. L'Armadille.
2. L'Armadille Oriental.
3. L'Armadille des Indes.
4. L'Armadille du Mexique.
5. L'Armadille du Brésil.
6. L'Armadille de Cayenne.
7. L'Armadille d'Afrique.

ORDRE III.

V. Genre de l'Elephant.

- ### 1. L'Elephant.

VI. Genre de la Vache-Marine.

1. La Vache-Marine.
2. Le Lamantin.

ORDRE IV.

VII. Genre du Chameau.

1. Le Chameau.
2. Le Dromadaire.
3. Le Chameau du Perou.
4. La Vigogne.

ORDRE V.

SECTION I.

VIII. Genre de la Giraffe.

- ### 1. La Giraffe.

IX. *Genre du Bouc.*

1. Le Bouc, La Chevre domestique.
2. La Chevre d'Angora.
3. Le Bouc-Estain.
4. La Petite Chevre d'Amérique.
5. Le Petit Chamois d'Amérique.
6. Le Chamois, ou l'Yzard.
7. La Gazelle des Indes.
8. La Gazelle.
9. La Gazelle du Bezoar.

P p

10. La Gazelle d'Afrique.
11. La Gazelle de la Nouvelle Espagne.
12. La Chevre du Levant.
13. La Chevre de Sirie.
14. La Chevre de la Nouvelle Espagne.
15. La Chevre de Crète.

X. *Genre du Bellier.*

1. La Brebis Domestique.
2. La Brebis à large queue.
3. La Brebis à longue queue.
4. La Brebis d'Afrique.
5. La Brebis de Guinée.

XI. *Genre du Bœuf.*

1. Le Bœuf Domestique.
2. Le Buffle d'Afrique.
3. L'Aurochs.
4. Le Buffle.
5. Le Bifon blanc.
6. Le Bifon.
7. Le Bifon d'Amérique.
8. Le Bœuf sauvage.

SECTION II.

XII. *Genre du Cerf.*

1. Le Cerf.
2. Le Cerf d'Allemagne.
3. Le Cerf de Canada.
4. Le Cerf de Groënland.
5. Le Chevreuil.
6. Le Karibou.
7. Le Daim.
8. Le Rhenne.
9. L'Elan.

SECTION III.

XIII. *Genre du Chevrotain.*

1. Le Chevrotain des Indes.
2. Le Chevrotain de Guinée.
3. Le Chevrotain de Surinam.
4. Le Chevrotain d'Afrique.
5. Le Musc.

O R D R E V I.

XIV. *Genre du Cheval.*

1. Le Cheval.
2. Le Zébre, ou l'Âne rayé.
3. L'Asne.
4. Le Mulet.
5. L'Asne sauvage.

O R D R E V I I.

XV. *Genre du Cochon.*

1. Le Cochon Domestique.
2. Le Cochon de la Chine.
3. Le Sanglier.
4. Le Cochon de Guinée.
5. Le Sanglier des Indes Orientales.
6. Le Sanglier du Mexique.

O R D R E V I I I.

XVI. *Genre du Rhinoceros.*

1. Le Rhinoceros.

O R D R E I X.

XVII. *Genre du Cabiai.*

1. Le Cabiai.

O R D R E X.

XVIII. *Genre du Tapir, ou Mani-pouris.*

1. Le Tapir, ou Mani-pouris.

O R D R E X I.

XIX. *Genre de l'Hippopotame.*

1. L'Hippopotame.

ORDRE XII.

SECTION I.

XX. *Genre du Porc-Epic.*

1. Le Porc-Epic.
2. Le Porc-Epic de la Nouvelle Espagne.
3. Le Porc-Epic de la Baye de Hudson.
4. Le Porc-Epic d'Amérique.
5. Le Grand Porc-Epic d'Amérique.
6. Le Porc-Epic des Indes Orientales.

SECTION II.

XXI. *Genre du Castor.*

1. Le Castor, ou le Bièvre.
2. Le Castor blanc.
3. Le Rat musqué.
4. Le Rat musqué de Canada.

XXII. *Genre du Lièvre.*

1. Le Lièvre.
2. Le Lièvre blanc.
3. Le Lièvre noir.
4. Le Lapin de notre pays.
5. Le Riche.
6. Le Lapin d'Angora.
7. Le Lièvre du Brésil.

XXIII. *Genre du Lapin.*

1. Le Lapin de Java.
2. L'Agouty.
3. Le Lapin d'Amérique.
4. Le Pak.
5. Le Lapin de Norvege.
6. Le Lapin d'Allemagne.
7. Le Lapin des Indes.
8. Le Lapin du Brésil.

XXIV. *Genre de l'Ecureuil.*

1. L'Ecureuil.
2. L'Ecureuil blanc de Sibirie.
3. L'Ecureuil noir.

4. L'Ecureuil varié.
5. L'Ecureuil d'Amérique.
6. L'Ecureuil de Virginie.
7. L'Ecureuil du Brésil.
8. L'Ecureuil de la Nouvelle Espagne.
9. L'Ecureuil de la Caroline.
10. L'Ecureuil Palmiste: *vulgairement* Rar Palmiste.
11. L'Ecureuil de Barbarie.
12. L'Ecureuil volant.
13. L'Ecureuil volant de Sibirie.
14. L'Ecureuil volant de Virginie.

XXV. *Genre du Loir.*

1. Le Loir.
2. Le Lérot.
3. Le Croque-noix.
4. La Marmotte de Bahama.
5. La Marmotte d'Amérique.
6. La Marmotte de Pologne.
7. La Marmotte des Alpes.
8. La Marmotte de Strasbourg.

XXVI. *Genre du Rat.*

1. Le Rat.
2. La Souris.
3. Le Rat de bois.
4. Le Grand Rat des champs.
5. La Souris d'Amérique.
6. Le Rat d'Amérique.
7. Le Rat blanc de Virginie.
8. Le Rat de Norvege.
9. Le Mulot.
10. Le Rat Oriental.
11. Le Rat d'eau.
12. Le Petit Rat des champs.

SECTION III.

XXVII. *Genre de la Musaraigne.*

1. La Musaraigne.
2. La Musaraigne du Brésil.

SECTION IV.

XXVIII. *Genre du Hérisson.*

1. Le Hérisson.

Pij

2. Le Hériffon de Sibérie.
3. Le Hériffon de Malacca.
4. Le Hériffon d'Amérique.

O R D R E X I I I .

S E C T I O N I .

XXIX. *Genre du Singe.*

Race I. Le Singe.

1. Le Singe.
2. L'Homme des bois.
3. Le Singe de Ceylan.

Race II. Le Singe Cynocéphale.

1. Le Singe Cynocéphale.
2. Le Singe Cynocéphale de Ceylan.

Race III. Le Babouin.

1. Le Babouin.

Race IV. Le Cercopithèque.

1. Le Sapajou brun.
2. Le Sapajou noir.
3. Le Sapajou cornu.
4. Le Sapajou à queue de Renard.
5. Le Petit Singe Nègre.
6. Le Singe de Guinée.
7. Le Singe musqué.
8. Le Sapajou jaune.
9. Le Singe varié.
10. Le Tamarind.
11. Le Petit Singe-Lion.
12. Le Petit Singe de Para.
13. Le Singe à queue de Rat.
14. Le Sagouin.
15. Le Singe à queue de Lion.
16. Le Singe-Lion.
17. Le Singe verd.
18. Le Grand Singe de la Cochinchine.
19. Le Singe de Guinée à barbe jaunâtre.
20. Le Singe roux de Cayenne.
21. Le Singe blanc à barbe noire.
22. Le Singe noir à barbe blanche.
23. Le Singe de Guinée à barbe blanche.

24. Le Singe barbu.
25. Le Singe barbu à queue de Lion.

26. Le Singe noir d'Egypte.
27. Le Singe roux d'Egypte.
28. Le Petit Singe du Mexique.
29. Le Belzébuth.

Race V. Le Cercopithèque Cynocéphale.

1. Le Cercopithèque Cynocéphale.
2. Le Makaque.
3. Le Magot, ou Tartarin.

S E C T I O N I I .

XXX. *Genre de la Rouffette.*

1. La Rouffette.
2. La Rouffette à col rouge.
3. La Rouffette à longues oreilles.

O R D R E X I V .

S E C T I O N I .

XXXI. *Genre du Maki.*

1. Le Maki.
2. Le Maki aux pieds blancs.
3. Le Maki aux pieds fauves.
4. Le Maki à queue annelée.

S E C T I O N I I .

XXXII. *Genre de la Chauve-Souris.*

1. La Grande Chauve-Souris de notre pays.
2. La Petite Chauve-Souris de Ternate.
3. La Petite Chauve-Souris de notre pays.
4. La Grande Chauve-Souris de Ternate.
5. La Chauve-Souris rousse d'Amérique.
6. La Chauve-Souris d'Amérique.

-ORDRE XV.**XXXIII. Genre du Phocas.**

1. Le Phocas, ou Veau-Marin:

ORDRE XVI.**SECTION I.****XXXIV. Genre de l'Hyène.**

1. L'Hyène.

XXXV. Genre du Chien;

1. Le Chien.
2. Le Loup.
3. Le Loup doré.
4. Le Loup du Mexique.
5. Le Renard.
6. Le Renard croisé.
7. Le Renard gris.
8. Le Renard blanc.

XXXVI. Genre de la Belette.

1. La Belette.
2. L'Hermine.
3. Le Furet.
4. Le Furet des Indes.
5. Le Furet de Java.
6. Le Vison.
7. La Fouine.
8. La Marte.
9. La Marre Zibeline.
10. Le Putois.
11. Le Putois rayé.
12. L'Ichneumon, ou la Mangouste; vulgairement, le Rat de Pharaon.
13. La Genette.

XXXVII. Genre du Blaireau.

1. Le Blaireau, ou Taïffon.
2. Le Blaireau blanc.
3. Le Blaireau du Surinam.
4. La Civette.

XXXVIII. Genre de l'Ours.

1. L'Ours.

2. L'Ours blanc.

3. L'Ours de la Baye de Hudson;

4. Le Coati.

5. Le Coati-Mondi.

6. Le Coati-Mondi à queue annulée.

XXXIX. Genre du Chat.

1. Le Chat Domestique.
2. Le Chat sauvage.
3. Le Chat sauvage tigré.
4. Le Chat d'Angora.
5. Le Lion.
6. Le Tigre.
7. Le Tigre Royal.
8. Le Tigre d'Amérique.
9. Le Tigre Noir.
10. Le Tigre-Barbet, ou le Tigre frisé.
11. Le Tigre rouge.
12. Le Léopard.
13. Le Chat-Pard.
14. Le Chat-Cervier.
15. Le Loup-Cervier.

SECTION II.**XL. Genre de la Loutre.**

1. La Loutre.
2. La Loutre du Brésil.

- ORDRE XVII.**XLI. Genre de la Taupe.**

1. La Taupe.
2. La Taupe blanche.
3. La Taupe variée.
4. La Taupe de Virginie.
5. La Taupe rouge d'Amérique.
6. La Taupe dorée de Sibérie.

ORDRE XVIII.**XLII. Genre du Philandre.**

1. Le Philandre.

P p üj

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Le Philandre Oriental. | 6. Le Philandre d'Afrique: |
| 3. Le Philandre d'Amboine. | 7. Le Philandre de Surinam: |
| 4. Le Philandre du Brésil. | 8. Le Philandre à grosse tête. |
| 5. Le Philandre d'Amérique. | 9. Le Philandre à courte queue: |



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre: la lettre R, la Race: & la lettre E, l'Espece.

A.		G.	E.		G.	E.	
A	GNEAU,	10.	1.	— D'Amérique,	11	7.	
	Agouti,	23	2.	— Blanc,	11	5.	
	Agouty,	23	2.	— Blaireau,	37.		
	Aine,	14	3.	— Blanc,	37	1.	
	— Rayé,	14	2.	— De Surinam,	37	2.	
	— Sauvage,	14	2.	— Bœuf,	11.	3.	
		14	5.	—	11	1.	
	Armadille,	4.		— Domestique,	11	1.	
	—	4	1.	— Marin,	6	2.	
	— D'Afrique,	4	7.	— Sauvage,	11	8.	
	— Du Brésil,	4	5.	— Bouc,	9		
	— De Cayenne,	4	6.	—	9	1.	
	— Des Indes,	4	3.	— Bouc-Estain,	9	3.	
	— Du Mexique,	4	4.	— Brebis,	10	1.	
	— Oriental,	4	2.	— D'Afrique,	10	4.	
Aurochs,	11	3.	— Domestique,	10	1.		
			— De Guinée,	10	5.		
			— A l'arge queue,	10	2.		
			— A longue queue,	10	3.		
			— Buffle,	11	4.		
			—	11	7.		
			— D'Afrique,	11	2.		
B.		G.	R.	E.	C.		
B	Abouin,	29	5.			G. R. E.	
	Belette,	29	3	1.			
	—	36					
	Bellier,	36	1.				
	—	10					
	Belzébub,	10	1.				
	Bère à la grande dent,	29	4	29.	C	Abiaï,	
	Biche,	6	1.			17.	
	— Des Bois,	12	1.			17	1.
	— Des Paletuviers,	12	5.			21.	
	Bièvre,	12	5.			21	1.
	Bison,	12	5.			21	2.
	— Amériquin,	21	1.			29	4.
		11	6.			29	5.
		11	7.			29	5

	G.	E.		G.	E.	
Cerf,	12.		Chevreau,	9	1.	
—	12	1.	Chevreuil,	12	5.	
— D'Allemagne,	12	2.	— Du Brésil,	12	5.	
— De Canada,	12	3.	Chevrotain,	13.		
— De Groënland,	12	4.	— D'Afrique,	13	4.	
Chameau,	7.		— De Guinée,	13	2.	
—	7	1.	— Des Indes,	13	1.	
—	7	2.	— De Surinam,	13	3.	
— Du Perou,	7	3.	Chien,	35.		
Chamois,	9	6.	—	35	1.	
— (Petit) d'Amérique,	9	5.	— Marin,	33	1.	
Chat,	39.		— De mer,	33	1.	
— D'Angora,	39	4.	Chienle,	35	1.	
— Cervier,	39	14.	Civette,	37	4.	
— Domestique,	39	1.	Coati,	38	4.	
— Epineux,	20	4.	— Mondé,	38	5.	
— Pard,	39	13.	—	38	6.	
— Sauvage,	39	2.	— Mondé à queue an-			
— Sauvage tigré,	39	3.	nelée,	38	6.	
— Tigre,	39	3.	— Simplement dit,	38	4.	
Chauve-Souris,	32.		Cochon,	15.		
— D'Amérique,	32	6.	—	15	1.	
— (Grande) de notre			— De la Chine,	15	2.	
pays,	32.	1.	— Domestique,	15	1.	
— (Grande) de Ternate,	32	4.	— D'Eau,	17	1.	
— (Petite) de notre			— De Guinée,	15	4.	
pays,	32	3.	— d'Inde,	23	7.	
— (Petite) de Ternate,	32	2.	— Noir,	15	6.	
— Rouffe d'Amérique,	32	5.	— De Terre,	1	1.	
Cheval,	14.		Croque-Noix,	25	3.	
—	14	1.				
— Marin,	19	1.	D.			
— Ongre,	14	1.		G.	E.	
Chevre,	9	1.	D	Aim,	12	7.
— D'Angora,	9	2.	— D'Espagne,	12	7.	
— De Congo,	13	1.	— De Groënlande,	12	4.	
— De Crète,	9	15.	— De Virginie,	12	7.	
— Domestique,	9.	1.	Diable de Java,	2	1.	
— Du devant,	9	12.	— De Tajoan,	2	2.	
— De la Nouvelle Es-			Dromadaire,	7	2.	
pagne,	9	14.				
— (Petite) d'Améri-			E			
que,	9	4.		G.	E.	
— Privée,	9	1.	E	Cureuil,	24.	
— De Sirie,	9	13.	—	24	1.	
			— D'Amérique,			

DES NOMS FRANÇOIS.

	G.	E.		H.						
D'Amérique,	24	5.								G. R. E.
De Barbarie,	24	11.								
Blanc de Sibirie,	24	2.		H	Ase,	22	1.			
Du Brésil,	24	7.			Hérifon,	28.				
De la Caroline,	24	9.				28	1.			
(Grand) Gtis,	24	6.			D'Amérique,	28	4.			
Noir,	24	3.			De Malacca,	28	3.			
De la Nouvelle Espa-					De Sibirie,	28	2.			
gne,	24	8.			Hermine,	36	2.			
Palmiste,	24	10.			Hippopotame,	19.				
De Terre,	24	9.				19	1.			
Varié,	24	4.			Homme des bois,	29	1	2.		
De Virginie,	24	6.			Hyene,	34.				
Volant,	24	12.				34	1.			
Volant de Sibirie,	24	13.								
Volant de Virginie,	24	14.		I.						
Elan,	9	7.								G. E.
	12	9.		I	Chneumon,	36	12.			
Elant,	12	9.			De Yzquiepatl,	37	3.			
Elephant,	5.			J	jument,	14	1.			
	f	3.		K.						
F.										
	G.	E.		L.						
Aon,	22	1.		K	Aribou,	12	6.			E.
Fouine,	36	7.								
Fourmillier,	1.									
	1	2.								
Aux longues oreilles,	1	3		L	Amantin,	6	2.			G. E.
(Petit)	1	4			Lapin,	23.				
Tamanoir,	1	1.				22	4.			
Ruter,	36	3.			D'Allemagne,	23	6.			
De Java,	36	5.			D'Amérique,	23	3.			
Des Indes,	36	4.			D'Angora,	22	6.			
					De Bahama,	25	4.			
G.					Du Brésil,	23	8.			
	G.	E.			De Java,	23	1.			
Azelle,	9	8.			Des Indes,	23	7.			
D'Afrique,	9	10.			De Norvege,	23	5.			
Du Bezoar,	9	9.			De Notre pays,	22	4.			
Des Indes,	9	7.			Lapreau,	22	4.			
De la Nouvelle Espa-					Laye,	15	3.			
gne,	9	11.			Leopard,	39	12.			
Genette,	36	13.			Léror,	25	2.			
Giraffe,	8.				Lévraut,	22	1.			
	s	1.			Lezard de Clusius,	2	1.			

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum,
Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; Litteræ ST, Stirpem, & Littera S,
Speciem.

A.	G. ST. S.	Aiela, .	G. ST. S.
A Bada; .	<u>16</u>	1. Aielet, .	<u>12</u> <u>12</u>
Acanthio terrestris, .	<u>28</u>	1. Ail, .	<u>10</u> <u>12</u>
Acanthion aculeis longif-		Αἰλίη, .	<u>12</u> <u>12</u>
— sumis, .	<u>28</u>	1. Aï, .	<u>2</u> <u>12</u>
— Cauda prælonga &c, .	<u>20</u>	1. Akbar, .	<u>25</u> <u>12</u>
— Cristatus, .	<u>20</u>	1. Akbera, .	<u>25</u> <u>12</u>
— Echinatus, .	<u>28</u>	2. Alaouïata, .	<u>29</u> <u>4</u> <u>20</u>
— Vulgaris nostras, .	<u>28</u>	4. Alce, .	<u>12</u> <u>20</u>
Acbar, .	<u>26</u>	1. — Vera & legitima, .	<u>12</u> <u>20</u>
Acbera, .	<u>26</u>	2. Alces, .	<u>12</u> <u>20</u>
Acuti, .	<u>25</u>	2. Aleph, .	<u>12</u> <u>12</u>
Adil, .	<u>25</u>	2. Algazel, .	<u>20</u> <u>8</u>
Æber, .	<u>25</u>	— Ex Aphrica, .	<u>9</u> <u>10</u>
Ælg, .	<u>12</u>	1. ALA, .	<u>12</u> <u>20</u>
Æt, .	<u>20</u> <u>1</u>	2. ALAOUË, .	<u>25</u> <u>5</u>
Africana, .	<u>20</u> <u>12</u>	1. Ana, .	<u>10</u> <u>12</u>
Agarone, .	<u>10</u>	1. Ane, .	<u>14</u> <u>20</u>
Agilis, .	<u>3</u>	1. — Rayé, .	<u>14</u> <u>20</u>
Agna, .	<u>10</u>	1. — Sauvage, .	<u>14</u> <u>20</u>
Agneau, .	<u>10</u>	—	<u>14</u> <u>12</u>
Agnello, .	<u>10</u>	1. Animal, (Asiaticum)	<u>35</u> <u>20</u>
Agno, .	<u>10</u>	1. — Bezoarticum Orienta-	
Agnus, .	<u>10</u>	le, .	<u>2</u> <u>20</u>
Agouri, .	<u>25</u>	— Caudimanum, .	<u>42</u> <u>6</u>
Agoury, .	<u>25</u>	— Cuncta prætentans	
Aguti, .	<u>25</u>	manibus, .	<u>28</u> <u>42</u>
Ahu, .	<u>2</u>	— (Elegantissimum)	<u>20</u> <u>12</u> <u>20</u>
Ai, .	<u>2</u>	— Erinaeum recentio-	
Aial, .	<u>12</u>	rum, .	<u>16</u> <u>12</u>
Aiala, .	<u>12</u>	1. — (Exoticum)	<u>4</u> <u>20</u>
Aiatochli, .	<u>4</u>	— Magnum, .	<u>12</u> <u>20</u>
		— Moichaferum, .	<u>13</u> <u>20</u>

Qq iij

	G.	ST.	S.		G.	S.
— Ex Moscovia,	21	3.	— Des Indes,	4	3.	
— Musci,	11	5.	— Du Mexique,	4	4.	
— Necrophagum,	14	1.	— Oriental,	4	2.	
— Zibethi,	17	4.	— Armadillo,	4	1.	
— Zibethicum,	17	4.	—	4	2.	
Animalculum Cynocephalum Ceylonicum,	19	2.	—	4	4.	
Anse,	9	1.	—	4	5.	
Anseb,	11	1.	— Africanus,	4	7.	
Ant-Bear, (Great)	1	1.	— Brasiliensis,	4	5.	
— [Lesser]	1	2.	— Guianensis,	4	6.	
Anta,	18	1.	— Indicus,	4	1.	
Aouaré,	42	1.	— Mexicanus,	4	4.	
Ape,	22	1.	— Nothus,	4	7.	
Aper,	15	1.	— Orientalis,	4	2.	
— Agrestis,	15	2.	— (Wesle-Headed)	4	1.	
— Indicus,	15	2.	— Armellino,	16	2.	
—	15	5.	— Armodillo,	1	1.	
— Mexicanus,	15	6.	— Africanus,	4	7.	
— Mexicanus Moschiferus,	15	6.	— Americanus,	4	6.	
— Orientalis,	15	6.	— Orientalis,	4	2.	
Aperea,	23	5.	— Armodillus squamatus major,	2	1.	
Arctomys Palestinæ,	25	8.	— Arneba,	22	1.	
Arctopithecus,	3	1.	— Arnebet,	22	1.	
—	22	1.	— Arneph,	22	1.	
Ari,	32	5.	— Aroe, [Pelandor]	42	2.	
Ariavan,	32	5.	— Afad,	39	5.	
Ariech,	32	5.	— Asbocha,	14	1.	
Aries,	10.	5.	— Asiaticum Animal,	35	3.	
—	10	1.	— Asiniferus,	14	5.	
— Albus Judeorum,	10	5.	— Asinus,	14	1.	
— Cretensis,	2	15.	— Biformis,	14	4.	
— Cretensis Strepsicerus,	2	15.	— Domesticus,	14	3.	
— Guineensis,	10	5.	— Hybridus,	14	4.	
— Orientalis,	10	2.	— Sylvestris,	14	5.	
Atiete,	10	1.	— Asna,	14	1.	
Arctus,	18	1.	— Asno,	14	1.	
Armadillo,	4.	1.	— Aspalax,	42	6.	
—	4	1.	— Arctomys,	41	1.	
— D'Afrique,	4	7.	— Afs, (Wild)	14	5.	
— Du Brésil,	4	5.	— Affapanick,	14	12.	
— De Cayenne,	4	6.	— Afle,	14	1.	
			— Ataleph,	14	1.	
			— Atalepha,	14	1.	

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Aver-Ochs;	11	3.	Befangerah,	11	4.
Aurochs,	11	3.	Befchet,	7	1.
Ayotochtli,	4	4.	Bête à la grande dent,	6	1.
			Bevaro,	21	1.
B.			Bever,	21	1.
Abi-Roefa,	G.	ST. S.	Bevero,	21	1.
Babian,	15	5.	Biber,	21	1.
Babio,	29	3	Biche,	12	1.
Baboon,	29	3	— Des Bois,	12	5.
Babouin,	29	3	— Des Paletuviers,	12	5.
—	29	3.	Bicho Vergonhofo,	2	2.
Babuino,	29	3	Bievre,	21	1.
Babyroussa;	29	3	Biörn,	38	1.
Bactrianus,	15	5.	Bifem-Mufs,	27	1.
Badger,	7	1.	Bifemreech,	13	5.
Bâfwer,	37	1.	Bifemthier,	13	5.
Baïel,	21	1.	Bifon,	17	6.
Bakar,	14	1.	— Amériquain,	11	7.
Ballottula,	11	1.	— D'Amérique,	11	7.
Baphas,	36	1.	— Blanc,	11	5.
Bâr,	32	1.	Bifon,	11	3.
Barah,	38	1.	—	11	6.
Barbafello,	10	1.	— Albus,	11	5.
Bardato,	32	1.	— Albus Calydonius,	11	5.
Barg,	4	4.	— Albus Scoticus,	11	5.
Batis,	15	1.	— Americanus,	11	7.
Barrus,	29	1	— Indicus,	11	7.
Bar,	5	1.	— Jubatus,	11	6.
Baviaan,	32	1.	— Scoticus,	11	5.
Bauwol,	29	3	—	11	6.
Bawol,	11	4.	Bivaro,	21	1.
Beal,	11	4.	Blaireau,	37.	
Bear,	14	4.	—	37	1.
Beaver,	38	1.	— Blanc,	37	2.
Beccho;	21	1.	— De Surinam,	37	5.
Beer,	9	1.	Blââf,	35	8.
Behemot,	38	1.	Blerellus,	37	1.
Belbus,	19	1.	Boar,	15	1.
Belette,	34	1.	— (Wild)	15	5.
—	36.		Bobak,	25	6.
Bellier,	36	1.	Bobr,	21	1.
—	10.		Bock,	9	1.
Belzébut,	10	1.	Bœuf,	11.	
Benula,	29	4	—	11	1.
	36	1.	— Domestique,	11	1.

	G.	S.		G.	S.
— Macia,	6	2.	Buffelus,	11	41
— Sauvage,	11	8.	Buffes,	11	3.
Bomarin,	19	1.	Buffle,	11	4.
Bonafus,	11	8.	—	11	7.
Boophagus,	34	8.	— D'Afrique,	11	2.
Borluk,	37	1.	Bugill,	11	4.
Bos,	11.	1.	Buk,	15	1.
—	11	1.	Bulges,	11	3.
— Africanus Bellonii,	11	1.	Bull,	11	1.
— Domesticus,	11	2.	Buntling,	36	10.
— (Elegans & Parvus Africanus)	11	1.	Buo Marino,	33	1.
— (Exiguus Africanus)	11	1.	Bupotamus,	19	1.
Boschraue,	23	2.	Burro do Marto,	14	2.
—	42	2.	Busan,	9	1.
Boucaler,	11	8.	Buyrezio,	11	1.
Bouc,	9.	4.	Buz,	9	1.
—	9				
Bouc-Estain,	9				
Boue Marino,	33				
Buit,	11				
Bradypus &c,	3.				
Bandhirs,	11				
Brebis,	10				
— D'Afrique,	16				
— Domestique,	10				
— De Guinée,	10				
— A large queue,	10				
— A longue queue,	10				
Brock,	37				
Bubalus,	11				
—	11				
— Africanus,	11				
— Veretum,	11				
— Vulgaris,	11				
Büch Marder,	36				
Buck,	12				
Bue,	11				
Buey,	11				
— (Pege)	6				
Bufalo,	11				
Bufano,	11				
Buffel,	11				
— (Wilde)	11				

C.

G. ST. S.

1.	Aaigoara,	15	6.
3.	Caballus Marinus,	19	1.
1.	Cabiai,	17.	
—		17	1.
1.	Cabionara,	17	1.
1.	Cabra,	9	1.
4.	Cabrito,	9	1.
1.	Cabron,	9	1.
5.	Cabronzillo Montés,	12	5.
2.	Cachorro Domaro,	42	4.
5.	Cagui Major,	29	4 10.
1.	— Minor,	29	4 14.
2.	Caitaia,	29	4 7.
4.	—	29	4 14.
1.	Caitaja,	29	4 7.
2.	Caldah,	36	1.
4.	Calf,	11	1.
7.	—	12	1.
7.	— (Sea)	33	1.
1.	Camel,	7	1.
—		7	2.
2.	Camello,	7	1.
4.	Camelo Congener,	7	4.
4.	Camelopardalin,	8	1.
4.	Camelopardalis,	8	1.
8.	Camelopardalus,	8	1.

Camelus,

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	ST. S.
Camelus ;	7.	—	Orientalis ,	9	12.
—	7	1.	Parva Americana ,	9	4.
—	7	2.	Pazahartica ,	9	9.
— Arabica ,	7	1.	Srepsiceros ,	9	8.
— Dromas ,	7	2.	Sylvestris Africana ,	13	4.
— Indicus ,	8	1.	Syriaca ,	9	13.
— Laniger ,	7	4.	Caprea ,	9	6.
— Minimus ,	7	2.	—	12	5.
— Peruanus ,	7	3.	Groenlandica ,	12	4.
—	7	4.	Plinii ,	12	5.
— Spurius ,	7	3.	Capreolus ,	12	5.
Camorcia ,	9	6.	— Brasiliensis ,	12	5.
Campagnoli ,	26	4.	— Marinus ,	12	5.
—	26	12.	— Moschi ,	13	5.
Camuza ,	9	6.	Capricerva ,	9	9.
Cane ,	35	1.	Capricornus ,	9	3.
Canicula aquatica ,	40	1.	Capriola ,	12	5.
Canis ,	35.	—	Capriolo ,	12	5.
—	35	1.	— Del Musco ,	13	5.
— Domesticus ,	35	1.	Capybara ,	17	1.
— Fluvialis ,	40	1.	Cate ,	14	3.
— Pili cervicis erectis ,	—	—	Carigoy ,	42	1.
— &c ,	34	1.	Carigue ,	42	1.
— Ponticus ,	21	1.	Cariguebeju ,	40	2.
— Sylvestris ,	35	2.	Carigueibeju ,	40	2.
— Volans ex Novâ His-	—	—	Carigueya ,	42	1.
pania ,	30	3.	— Brasiliensis ,	42	1.
— Volans Ternatanus	—	—	Carnero ,	10	1.
— Orientalis ,	30	1.	Carnevoca ,	26	2.
Caper ,	9	1.	Carygueibeju ,	40	2.
— Mambrinus ,	10	5.	Castor ,	21.	—
— Montanus Alberti ,	9	3.	—	21	1.
Capra ,	9	1.	— Blanc ,	21	2.
— &c ,	13	1.	Castor ,	21.	—
—	13	4.	—	21	1.
— Bezaartica ,	9	9.	— Albus ,	21	2.
— Bezoartica ,	9	9.	— Cauda linearis re-	—	—
— Cerenfis ,	9	15.	— reti ,	26	11.
— Domestica ,	9	1.	Cat ,	39	1.
— Fera Varroni ,	9	3.	— (Civet)	37	4.
— Indica ,	9	13.	— A Mountain ,	39	13.
— Manbrina ,	9	13.	Caraph ,	29	1.
— Montés ,	9	6.	Cataphraetus ,	4.	—
— Moschi ,	13	5.	Catharet ,	36	10.
— Novæ Hispaniæ ,	9	14.	Catul ,	39	1.

R r

	G. ST. S.		G. ST. S.
Carus,	39	— Imberbis secundus Clusii,	29 4 16.
— Cervarius,	39	— Moschum redolens Brasiliensis,	29 4 7.
— Domesticus,	39	— Papio,	29 3 1.
— Feralis,	39	— Sagouin dictus,	29 4 14.
— Hispaniæ,	36	— Simiolus Ceylonicus,	29 4 8.
— Montanus Americanorum,	39	— Tertius Guineensis,	29 4 6.
— Pardus,	39	— Cenalfa,	5 1.
— Pardus Mexicanus,	39	— Cercopithecus,	29 4.
— Sylvestris,	39	— —	29 5 1.
— Sylvestris ferus,	39	— Americanus minor,	29 4 13.
— <i>Tepe Maxlaton</i> dictus,	39	— Angolensis major,	29 5 1.
— Tigrinus,	39	— Barbatus alius Guineensis,	29 4 19.
— Zibethi,	37	— Barbatus Clusii,	29 4 25.
— Zibethicus,	37	— Barbatus Guineensis,	29 4 23.
Cavallo,	14	— Barbatus maximus &c,	29 4 20.
Cavia Aguti,	23	— Barbatus primus Clusii,	29 4 25.
— Aperea,	23	— Barbatus secundus Clusii,	29 4 24.
— Bahamensis,	25	— Brasiliensis primus,	29 4 7.
— Cobaya,	22	— Brasiliensis secundus,	29 4 5.
— —	23	— Brasiliensis tertius,	29 4 14.
— Hydsonis,	20	— <i>Caitaja</i> dictus,	29 4 7.
— Javenis,	23	— Ceylonicus,	29 1 3.
— Paca,	23	— Cynocephalus,	29 5.
— Surinamensis,	23	— <i>Guariba</i> dictus,	29 4 2.
Cavretto,	9	— Guineensis alius,	29 4 6.
Cavriola,	12	— Guineensis tertius,	29 4 6.
Cavriolo,	12	— Meerkatz,	29 4 2.
Cay,	29 4 5.	— Minimus &c,	29 4 10.
Cebalus,	36	— Minor luteus,	29 4 8.
Cebus Angolensis major,	29 5 2.	— <i>Monkje</i> dictus,	29 4 13.
— Barbatus,	29 4 25.	— Moscatas,	29 4 7.
— Barbatus alius Guineensis,	29 4 19.	— Niger &c,	29 4 22.
— Barbatus primus Clusii,	29 4 25.	— Non Barbatus primus Clusii,	29 4 15.
— Barbatus secundus Clusii,	29 4 24.	— Non Barbatus secundus Clusii,	29 4 16.
— Caput mortuum,	29 4 13.	— Sagouin,	29 4 14.
— Elaurandus,	29 4 21.	— Cercopithèque,	29 4.
— Guariba,	29 4 2.	— Cynocéphale,	29 5.
— Imberbis primus Clusii,	29 4 15.	— —	29 5 1.

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	
Cerf,	11.	.	Chamois,	9	315
—	12	1.	— (Peut) d'Amérique,	9	5.
— D'Allemagne,	12	2.	Chamor,	14	3.
— De Canada,	12	3.	Chafir,	15	1.
— De Groënland.	12	4.	Chafira,	15	1.
Cerva,	12	1.	Char,	39.	
— Parvula Africana,	13	1.	— D'Angora,	39	4.
Cervo,	12	1.	— Cervier,	39	14.
Cervula Africana,	13	2.	— Domestique,	39	1.
— Subrubra,	13	3.	— Epineux,	20	4.
— Surinamensis subru-			— Pard,	39	13.
bra,	13	3.	— Sauvage,	39	2.
Cervulus,	12	5.	— Sauvage Tigré,	39	3.
Cervus,	12.		— Tigre,	39	3.
—	9	14.	Chaus,	39	15.
—	12	1.	Chauve-Souris,	32.	
— Africanus,	13	2.	— D'Amérique,	32	6.
— Burgundicus,	12	6.	— [Grande] de notre		
— Canadensis,	12	3.	pays,	32	1.
— Cornibus simpliciffi-			— (Grande) de Ternate,	32	4.
mus,	8	1.	— (Petite) de notre		
— Comutus ex Nova			pays,	32	3.
Hispania,	9	14.	— (Perire) de Ternate,	32	2.
— Getunicus,	12	2.	— Rouffe d'Amérique,	32	5.
— Groenlandicus,	12	4.	Cheval,	14.	
— Juvencus pergracilis			—	14	17.
Africanus,	13	1.	— Marin,	19	1.
— Juvencus perpuillus			— Ongre,	14	1.
Guineensis,	13	1.	Chevre,	9	1.
— Major &c,	12	5.	— D'Angora,	9	2.
— Minimus,	12	5.	— De Congo,	13	1.
— Minor &c,	12	5.	— De Crète,	9	15.
— Mirabilis,	12	8.	— Domestique,	9	1.
— Nobilis,	12	1.	— Du Levant,	9	12.
— Odoratus,	13	5.	— De la Nouvelle Ef-		
— Palmarus,	12	7.	pagne,	9	14.
—	12	8.	— (Petite) d'Amérique,	9	4.
—	12	9.	— Privée,	9	1.
— Platyceros,	12	7.	— De Sirie,	9	13.
— Rangifer,	12	8.	Chevreau,	9	1.
— Temamagana,	9	11.	Chevreuil,	12	5.
Chameau,	7.		— Du Brésil,	12	5.
—	7	1.	Chevrotin,	13.	
—	7	2.	— D'Afrique,	13	4.
— Du Perou,	7	3.	— De Guinée,	13	2.

	G. ST. S.		G.	E.
— Des Indes,	13	1. — Noir,	15	6.
— De Surinam,	13	3. — De Terre,	1	1.
Chien,	35.	Coes-Coes,	42	3.
—	35	1. Coja-Metl,	15	6.
— Marin,	33	1. Comadreia,	36	1.
— De Mer,	33	1. Comozza,	9	6.
Chienné,	35	1. Conéio,	22	4.
Chimpanrée,	29	2. Conepatl,	37	3.
Chirquinchum,	4	4. Coniglio,	22	4.
Choakamna,	29	3. Cony,	22	4.
X ^u ip ^u ,	15	1. Cordero,	10	1.
— X ^u ip ^u ,	15	3. Corza,	12	7.
Chomik,	25	8. Coria,	23	2.
Chulda,	36	1. Cow,	11	1.
Chuldah,	36	1. Coyametl,	15	6.
Cierva,	12	1. Coyopollin,	42	6.
Ciervo,	12	1. Cricetus,	25	8.
Cinghiale,	15	3. Croque-Noix,	25	3.
Cinghiare,	15	3. Cuandu,	20	4.
Civer Cat,	37	4. — Major,	20	5.
Civetta,	37	4. Cuati,	38	4.
Civette,	37	4. Cudana,	14	4.
Coati,	38	4. Cuetlacheli,	35	4.
— Mondé,	38	5. Cuguacu-Apara,	12	5.
—	38	6. — Ara,	39	11.
— Mondé à queue anne-		— Arana,	39	11.
— lée,	38	— Ete,	12	5.
— Simplement dit,	38	4. Cuniculi Brasiliensis spe-		
Coati,	38	— cies,	22	7.
— Brasiliensium,	38	4. —	23	2.
— Cauda brevi,	37	1. —	23	4.
— Civetta,	37	4. Cuniculus,	23.	
— Ginetta,	36	13. —	22	4.
— Griseus,	37	1. — Americanus,	23	3.
— Hernandezii,	37	3. — Americanus & Gui-		
— Ursulo affinis Ame-		— neensis,	23	7.
— ricanus,	38	3. — Angorensis,	22	6.
Coaty,	1	4. — Brasiliensis,	22	7.
Cochon,	15.	—	23	8.
—	15	1. — Germanicus,	23	6.
— De la Chine ;	15	2. — Javenis,	23	1.
— Domestique ;	15	1. — Indicus,	23	7.
— D'Eau,	17	1. —	23	8.
— De Guinée,	15	4. — Indus,	23	7.
— D'Inde,	23	7. — Major palustris,	23	4.

ALPHABETICUS.

	G.	ST.	S.		G.	S.
— Norvagicus;	23	5.		Dib,	35	2.
— Nostras,	22	4.		Didelphis &c;	42.	
— Omnium vulgariffi-				Dikerin,	10	1.
mus,	23	2.		Dob,	38	1.
Cynocephalus,	29	5	3.	Doe,	12	7.
— Primus,	29	2	1.	Dof,	12	7.
— Secundus,	29	5	3.	Dofhiort,	12	7.
				Dog,	35	1.
				Donnola,	36	1.
				Donola,	36	12.
D.				Dorcas,	9	6.
	G.	S.		—	12	5.
D Abha,	34	1.		—	12	5.
Dabuh,	34	1.		— (Greater)	25	2.
Dachs,	37	1.		Dornschweyn,	10	1.
Dahab,	34	1.		Doujong,	6	2.
Daim,	12	7.		Dromadaire,	7	2.
— D'Espagne,	12	7.		Dromas,	7	2.
— De Groënlande,	12	4.		—	7	2.
— De Virginie,	12	7.		Dromedario,	7	2.
Daino,	12	7.		Dromedarius,	7	1.
Dam,	12	7.		—	7	2.
Dama,	12	7.		Dromedary,	7	2.
— Cervus,	12	7.		Duba,	38	1.
— Hispanica,	12	7.		Dubbe,	38	1.
— Recentiorum,	12	7.		Dujung,	6	2.
— Virginiana,	12	7.		Dzyka-Kofa,	9	6.
— Vulgaris,	12	7.				
Damhirsch,	12	7.				
Damhirs,	12	7.				
Dämlin,	12	7.				
Damula,	36	12.				
Daniel,	12	7.				
Danio,	12	7.				
Dar,	37	1.				
Dasyus &c,	4.					
— Cucurbitinus;	4	4.				
—	12	4.				
Deba,	8	1.				
—	35	2.				
Deeba,	35	2.				
Definan,	21	3.				
Definanskatt,	36	13.				
Diable de Java,	2	1.				
— De Tajoan,	2	2.				
Diabolus Tajovanicus,	2	1.				

E.

	G.	S.
E Bamari;	7	2.
Echinus,	28	1.
— Brasiliensis,	4	4.
— Indicus albus,	28	4.
— Sibiricus,	28	2.
— Terrestris,	28	1.
— (Testudinatus)	4	3.
Ecureuil,	24.	
—	24	1.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Sibirie,	24	2.
— Du Brésil,	24	7.
— De la Caroline,	24	9.

R r üj

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 2. Le Philandre Oriental. | 6. Le Philandre d'Afrique. |
| 3. Le Philandre d'Amboine. | 7. Le Philandre de Surinam. |
| 4. Le Philandre du Brésil. | 8. Le Philandre à grosse tête. |
| 5. Le Philandre d'Amérique. | 9. Le Philandre à courte queue. |



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre: la lettre R, la Race: & la lettre E, l'Espece.

A.

A GNEAU,
Agouti,
Agouty,
Aine,
— Rayé,
— Sauvage,
—
Armadille,
—
— D'Afrique,
— Du Brésil,
— De Cayenne,
— Des Indes,
— Du Mexique,
— Oriental,
Aurochs,

G.	E.	
10.	1.	— D'Amérique,
23	2.	— Blanc,
23	2.	Blaireau,
14	1.	—
14	3.	— Blanc,
14	2.	— De Surinam,
14	1.	Bœuf,
14	5.	—
4.	—	Domestique,
4	1.	— Marin,
4	7.	— Sauvage,
4	5.	Bouc,
4	6.	—
4	3.	Bouc-Estain,
4	4.	Brebis,
4	2.	— D'Afrique,
11	3.	— Domestique,
		— De Guinée,
		— A l'arge queue,
		— A longue queue,

G.	E.
11	7.
11	5.
37.	
37	1.
37	2.
37	3.
11.	
11	1.
11	1.
6	2.
11	8.
9	
9	1.
9	3.
10	1.
10	4.
10	1.
10	5.
10	2.
10	3.
11	4.
11	7.
11	2.

B.

B Abouin,
—
Belette,
—
Bellier,
—
Belzébur,
Bête à la grande dent,
Biche,
— Des Bois,
— Des Paletuviers,
Bièvre,
Bison,
— Amériquin,

G.	R.	E.
29	3.	
29	3	1.
36		
36	1.	
10		
10	1.	
29	4	29.
6	1.	
12	1.	
12	5.	
12	5.	
21	1.	
11	6.	
11	7.	

C.

G.	R.	E.
17.		
17		1.
21.		
21		1.
21		2.
29		4.
29		5.
29		5.

C Abiaï,
—
Castor,
—
— Blanc,
Cercopithèque,
— Cynocéphale;
—

	G.	E.	G.	E.		
Cerf,	12.		Chevreau,	9	1.	
—	12.	1.	Chevreuil,	12	5.	
— D'Allemagne,	12	2.	— Du Brésil,	12	5.	
— De Canada,	12	3.	Chevrotain,	13.		
— De Groënland,	12	4.	— D'Afrique,	13	4.	
Chameau,	7.		— De Guinée,	13	2.	
—	7	1.	— Des Indes,	13	1.	
—	7	2.	— De Surinam,	13	3.	
— Du Perou,	7	3.	Chien,	35.		
Chamois,	9	6.	—	35	1.	
— (Petit) d'Amérique,	9	5.	— Marin,	33	1.	
Chat,	39.		— De mer,	33	1.	
— D'Angora,	39	4.	Chiente,	35	1.	
— Cervier,	39	14.	Civette,	37	4.	
— Domestique,	39	1.	Coati,	38	4.	
— Epineux,	20	4.	— Mondî,	38	5.	
— Pard,	39	13.	—	38	6.	
— Sauvage,	39	2.	— Mondî à queue an-			
— Sauvage rigré,	39	3.	nelée,	38	6.	
— Tigre,	39	3.	— Simplement dit,	38	4.	
Chauve-Souris,	32.		Cochon,	15.		
— D'Amérique,	32	6.	—	15	1.	
— (Grande) de notre			— De la Chine,	15	2.	
pays,	32.	1.	— Domestique,	15	1.	
— (Grande) de Ternate,	32	4.	— D'Eau,	17	1.	
— (Petite) de noire			— De Guinée,	15	4.	
pays,	32	3.	— d'Inde,	23	7.	
— (Petite) de Ternate,	32	2.	— Noir,	15	6.	
— Rouffe d'Amérique,	32	5.	— De Terre,	1	1.	
Cheval,	14.		Croque-Noix,	25	3.	
—	14	1.				
— Marin,	19	1.	D.			
— Ongre,	14	1.		G.	E.	
Chevre,	9	1.	D	Aim,	12	7.
— D'Angora,	9	2.	— D'Espagne,	12	7.	
— De Congo,	13	1.	— De Groënlande,	12	4.	
— De Crète,	9	15.	— De Virginie,	12	7.	
— Domestique,	9	1.	Diabie de Java,	2	1.	
— Du devant,	9	12.	— De Tajoan,	2	2.	
— De la Nouvelle Es-			Dromadaire,	7	2.	
pagne,	9	14.				
— (Petite) d'Améri-			E			
que,	9	4.		G.	E.	
— Privée,	9	1.	E	Cureuil,	24.	
— De Sirie,	9	13.	—	24.	1.	
			— D'Amérique,			

DES NOMS FRANÇOIS.

305

	G.	E.		G.	R.	E.
— D'Amérique,	<u>24</u>	5.	H	Ase,	<u>22</u>	1.
— De Barbarie,	<u>24</u>	11.		Hérifson,	<u>28.</u>	
— Blanc de Sibérie,	<u>24</u>	2.		— D'Amérique,	<u>28</u>	<u>1.</u>
— Du Brésil,	<u>24</u>	7.		— De Malacca,	<u>28</u>	<u>2.</u>
— De la Caroline,	<u>24</u>	9.		— De Sibérie,	<u>28</u>	<u>2.</u>
— (Grand) Gris,	<u>24</u>	6.		Hermine,	<u>26</u>	<u>2.</u>
— Noir,	<u>24</u>	3.		Hippopotame,	<u>29.</u>	
— De la Nouvelle Espa-				—	<u>29</u>	<u>1.</u>
gne,	<u>24</u>	8.		Homme des bois,	<u>29</u>	<u>2.</u>
— Palmiste,	<u>24</u>	10.		Hyene,	<u>34.</u>	
— De Terre,	<u>24</u>	9.		—	<u>24</u>	<u>1.</u>
— Varié,	<u>24</u>	4.				
— De Virginie,	<u>24</u>	6.				
— Volant,	<u>24</u>	12.				
— Volant de Sibérie,	<u>24</u>	13.				
— Volant de Virginie,	<u>24</u>	14.	L			
Elan,	9	7.				
—	12	9.	I	Chneumon,	<u>26</u>	<u>12.</u>
Elant,	<u>12</u>	9.		— De Yzquieparl,	<u>27</u>	<u>2.</u>
Elephant,	<u>5.</u>			Jument,	<u>14</u>	<u>1.</u>
—	<u>1</u>	1.				

F.

K.

	G.	E.		G.	E.
F Aon,	<u>12</u>	1.	K Aribou,	<u>12</u>	<u>6.</u>
— Fouine,	<u>26</u>	7.			
Fourmillier,	<u>1.</u>				
—	1	2.	L		
— Aux longues oreilles,	1	3.	Amantin,	<u>6</u>	<u>2.</u>
— (Petit)	<u>1</u>	4.	Lapin,	<u>23.</u>	
— <i>Tamanoir</i> ,	1	1.	—	<u>22</u>	<u>4.</u>
Furet,	<u>26</u>	3.	— D'Allemagne,	<u>23</u>	<u>6.</u>
— De Java,	<u>26</u>	5.	— D'Amérique,	<u>23</u>	<u>1.</u>
— Des Indes,	<u>26</u>	4.	— D'Angora,	<u>22</u>	<u>6.</u>
			— De Bahama,	<u>25</u>	<u>4.</u>
			— Du Brésil,	<u>25</u>	<u>2.</u>
			— De Java,	<u>25</u>	<u>1.</u>
			— Des Indes,	<u>25</u>	<u>7.</u>
			— De Norvege,	<u>25</u>	<u>1.</u>
			— De Notre pays,	<u>22</u>	<u>2.</u>
			Lapreau,	<u>22</u>	<u>4.</u>
			Laye,	<u>25</u>	<u>1.</u>
			Leopard,	<u>29</u>	<u>12.</u>
			Lérot,	<u>25</u>	<u>2.</u>
			Lévraut,	<u>22</u>	<u>1.</u>
			Lezard de Clusius,	<u>2</u>	<u>2.</u>

G.

	G.	E.		G.	E.
G Azelle,	<u>2</u>				
— D'Afrique,	<u>2</u>				
— Du Bezoar,	<u>2</u>				
— Des Indes,	9				
— De la Nouvelle Espa-					
gne,	9				
Genette,	<u>26</u>				
Giraffe,	<u>2.</u>				
—	<u>2</u>				

Qq

	G.	E.		G.	E.
— Ecaillé ;	2	1.	Marcaffin ,	15	3.
— Ecailleux ;	2	1.	Marmotte ,	25	7.
— Des Indes Orientales ,	2	2.	— Des Alpes ,	25	7.
Lievre ,	22.		— Amériquaine ,	25	5.
—	22	1.	— D'Amérique ,	25	5.
— Blanc ,	22	2.	— De Bahama ,	25	4.
— Du Brésil ;	22	7.	— De Pologne ,	25	6.
— De Java ,	23	1.	— De Strasbourg ,	25	8.
— Noir ,	22	3.	Marte ,	36	8.
Lion ,	39	5.	— Zibeline ,	36	9.
Lionne ,	39	5.	Mouron ,	10	1.
Loir ,	25.		— De Perou ,	7	3.
—	25	1.	Mule ,	14	4.
Loup ,	35	2.	Muler ,	14	4.
— Cervier ,	36	15.	Mulot ,	26	9.
— Doté ,	35	3.	Mufaraigne ,	27.	
— Marine ,	33	1.	—	27	1.
— Du Mexique ,	35	4.	— Du Brésil ;	27	2.
— Tigre ,	39	10.	Musc ,	13	5.
Louise ,	40.				
—	40	1.			
—	40	2.			
— Du Brésil ,	40	2.			
Louve ,	35	2.			
Louvetreau ,	35	2.			
—	38	3.			
Linx ,	39	15.			

M.

	G.	R.	E.
M Agot ,	29	5	3.
Makaque ,	29	5	2.
Maki ,	31.		
—	31	1.	
— Aux pieds blancs ,	31	2.	
— Aux pieds fauves ,	31	3.	
— A queue annelée ,	31	4.	
Mange-Fourmis ,	1	1.	
Mangeur de Fourmis ,	1	2.	
— (Gros)	1	1.	
— (Petit)	1	4.	
Mangouste ,	36	12.	
Manicon ,	42	1.	
Manipouris ,	18.		
—	18	1.	

G. R. E.

P.

	G.	E.
P Ak ,	23	4.
Panthere ,	39	12.
Pareffeux ,	3.	
—	3	1.
— De Ceylan ,	3	2.
Philandre ,	42.	
—	42	1.
— D'Afrique ,	42	6.
— D'Amboine ,	42	3.
— D'Amérique ,	42	5.
— Du Brésil ,	42	4.
— A courte queue ,	42	9.
— A Grosse tête ,	42	8.

DES NOMS FRANÇOIS.

	G.	E.		G.	307	E.
— Oriental,	41	2.	Renard,	35		5.
— De Surinam,	41	7.	— Amériquain,	1		1.
Phocas,	33.		— Blanc,	35		8.
—	33	1.	— Croisé,	35		6.
Pholidore,	2.		— Gris,	35		7.
—	1	1.	Rhenne,	12		8.
— A longue queue,	1	1.	Rhinoceros,	16.		
Porc,	15	1.	—	16		1.
Porc-Epic,	10.		Riche,	22		5.
—	10	1.	Rouffette,	30.		
— D'Amérique,	20	4.	—	30		1.
— De l'Amérique Sep-			— A col rouge,	30		2.
rentrionale,	10	5.	— A longues oreilles,	30		5.
— De la Baye de Hud-						
son,	10	5.	S.			
— (Grand) d'Améri-						
que,	20	5.	S	G. R. E.		
— Des Indes Orientales,	10	6.	Agouin,	29 4	14.	
— De la Nouvelle Espa-			Sanglier,	15		3.
gne,	10		— Appellé <i>Pecaris</i> ,	15		6.
Porc-Corne,	16	2.	— Des Indes Orientales,	15		5.
Poulain,	14	1.	— Du Mexique,	15		6.
Puant,	41	1.	Sapajou Brun,	29 4	1.	
Purois,	36	1.	— Cornu,	29 4	3.	
—	36	10.	— Jaune,	29 4	8.	
— Rayé,	36	11.	— Noir,	29 4	2.	
		11.	— A queue de Renard,	29 4	4.	
R.			Singe,	29.		
	G.	E.	—	29 1.		
R At,	16.		—	29 1 1.		
—	16	1.	— Barbu,	29 4	24.	
— D'Amérique,	16	6.	— Barbu à queue de			
— Blanc de Virginie,	26	7.	Lion,	29 4	25.	
— De Bois,	26	3.	— Blanc à barbe noire,	29 4	21.	
— D'Eau,	26	11.	— De Ceylan,	29 1	3.	
— (Grand) des Champs,	26	4.	— Cynocéphale,	29 2.		
— Musqué,	21	3.	—	29 2	1.	
—	21	4.	— Cynocéphale de Cey-			
— Musqué de Canada,	21	4.	lan,	29 2	2.	
— De Norvege,	26	8.	— [Grand] de la Co-			
— Oriental,	26	10.	chinchine,	29 4	18.	
— Palmiste,	24	10.	— De Guinée,	29 4	6.	
— (Petit) des Champs,	26	12.	— De Guinée à barbe			
— De Pharaon,	36	11.	blanche,	29 4	23.	
— De Pont,	24	12.	— De Guinée à barbe			
— De Tartarie,	24	12.	jaunâtre,	29 4	12.	

Qq ij

TABLE ALPHABETIQUE

— Lion,	29 4 16.	—	G. R. E.	G.	E.
— Musqué,	29 4 7.	—		39	3.
— Noir à barbe blanche,	29 4 22.	— D'Amérique,		39	11.
— Noir d'Egypte,	29 4 26.	— Barber,		39	8.
— [Petit] Lion,	29 4 11.	— (Espece de)		39	10.
— [Petit] du Mexique,	29 4 28.	— Erie,		39	9.
— [Petit] Negre,	29 4 5.	— De la grande espece,		39	10.
— [Petit] de Para,	29 4 12.	— (Gros) de la Guane,		39	7.
— A queue de Lion,	29 4 15.	— (Loup)		39	8.
— A queue de Rat,	29 4 13.	— Noir,		39	10.
— Rouge,	29 4 10.	— Rouge,		39	9.
— Rouge de Cayenne,	29 4 20.	— Royal,		39	11.
— Roux d'Egypte,	29 4 27.	— Truye,		39	7.
— Varié,	29 4 9.			15	1.
— Verd,	29 4 17.				
Soutis,	26 2.				
— D'Amérique,	26 3.				

T.

T Aïson,	37 1.	V Ache,	G.	E.
— Tamar noir,	1 1.	— Marine,	11.	1.
Tamarind,	29 4 10.	—	6	1.
Tapir,	28 1.	— Veau,	14	1.
—	18	— Marin,	33.	
Tartarin,	29 5 3.	— De Mer,	33	1.
Taupe,	41.	— Verrat,	33	1.
—	41	— Vigogne,	7	4.
— Blanche,	41 2.	— Vison,	36	6.
— Dorée de Siberie,	41 6.			
— Rouge d'Amérique,	41 5.			
— Varié,	41 3.			
— De Virginie,	41 4.			
Taureau,	11 1.			
Tigre,	39 4 6.			

Y.

Y Zard,	G.	E.
	9	6.

Z.

Z Ébre,	G.	E.
	14	2.

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum,
Graecorum, &c.

*Littera G Genus designat; Littera ST, Stirpem, & Littera S,
Speciem.*

A.	G.	ST.	S.		G.	ST.	S.
A Bada,	16			Aiela,	12		1a.
Acanthio terrestris,	28	1.		Aiolet,	12		1.
Acanthion aculeis longi-		1.		Ail,	10		1a.
simis,	28	3.		Alapht,	19		1.
— Cauda praelonga &c,	10	6.		Alé,	2		1.
— Crinitatus,	10	1.		Akbar,	25		1.
— Echinatus,	12	2.		Akbera,	25		1a.
—	12	4.		Alaouïata,	29	4.	20.
— Vulgaris nostras,	28	1.		Alce,	12		2.
Achar,	26	2.		— Vera & legitima,	12		2.
Acbera,	26	1.		Alces,	12		2.
Acuti,	23	2.		Aleph,	11		1.
Adil,	25	1.		Algazel,	9		2.
Æber,	15	1.		— Ex Aphrica,	2		10a.
Æh,	12	2.		Alas,	12		2.
Aft,	29	1		Alavazé,	35		5.
Africana,	12	12.		Ana,	10		1.
Agarone,	10	1.		Ane,	14		2.
Agilis,	1	1.		— Rayé,	14		2a.
Agna,	10	1.		— Sauvage,	14		2a.
Agneau,	10	1a.		—	14		1.
Agnellu,	10	1a.		Animal, (Afaricum)	35		2.
Agno,	10	1a.		— Bezoarticum Orienta-			
Agnus,	10	1a.		le,	2		2a.
Agouti,	23	2a.		— Caudimanum,	42		6.
Agouty,	23	1a.		— Cuncta prætentans			
Aguti,	23	1.		manibus,	38		4a.
Ahu,	2	6.		— (Elegantissimum)	22	1.	2a.
Al,	1	1.		— Ermineum recentio-			
Aial,	12	1.		rum,	16		2a.
Aiala,	12	1.		— (Exoticum)	4		2.
Aiarochili,	4	1.		— Magnum,	12		2a.
				— Moichaferum,	12		2a.

Qq iij

	G.	ST.	S.		G.	S.
— Ex Moscovia,	21	3.		— Des Indes,	4	3.
— Musci,	13	5.		— Du Mexique,	4	4.
— Necrophagum,	34	1.		— Oriental,	4	2.
— Zibethi,	37	4.		— Armadillo,	4	1.
— Zibethicum,	37	4.		—	4	2.
Animalculum Cynocephalum Ceylonicum,	29	2.	2.	—	4	4.
Anse,	9	1.		—	4	5.
Anseb,	32	1.		—	4	6.
Ant-Bear, (Great)	1	1.		— Africanus,	4	7.
— [Lesser]	1	1.		— Brasiliensis,	4	5.
Anta,	18	1.		— Guianensis,	4	6.
Aonaré,	42	1.		— Indicus,	4	3.
Ape,	29	1.		— Mexicanus,	4	4.
Aper,	15	3.		— Northus,	4	7.
— Agrestis,	15	3.		— Orientalis,	4	2.
— Indicus,	15	5.		— (Wesle-Headed)	4	1.
—	15	6.		— Armelino,	36	2.
— Mexicanus,	15	6.		— Armodillo,	2	1.
— Mexicanus Moschiferus,	15	6.		— Africanus,	4	7.
— Orientalis,	15	5.		— Americanus,	4	6.
—	15	6.		— Orientalis,	4	2.
—	15	6.		— Armodillus squamarum major,	2	1.
—	15	5.		— Arneba,	22	1.
—	23	8.		— Arnebet,	22	1.
Arctomys Palestinæ,	25	8.		— Arneph,	22	1.
Arctopithecus,	3	1.		— Aroe, [Pelandor]	42	2.
—	29	3.		— Afad,	39	5.
Ari,	39	5.		— Afbocha,	14	1.
Ariavan,	39	5.		— Asiaticum Animal,	35	3.
Arieck,	39	5.		— Asiniferus,	14	5.
Aries,	10.			— Asinus,	14	3.
—	10	1.		— Biformis,	14	4.
— Albus Judeorum,	10	5.		— Domesticus,	14	3.
— Cretensis,	9	15.		— Hybridus,	14	4.
— Cretensis Strepsicerus,	9	15.		— Sylvestris,	14	5.
— Guineensis,	10	5.		— Asna,	14	3.
— Orientalis,	10	2.		— Asno,	14	3.
Ariete,	10	1.		— Aspalax,	41	6.
Arytus,	38	1.		— Aspalax,	41	1.
Armadille,	4.			— As, (Wild)	14	5.
—	4	1.		— Atapanick,	24	12.
— D'Afrique,	4	7.		— Aise,	14	3.
— Du Brésil,	4	5.		— Ataleph,	32	1.
— De Cayenne,	4	6.		— Atalepha,	32	1.

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Aver-Ochs;	11	3.	Befangerah,	22	4.
Aurochs,	11	3.	Befchet,	7	1.
Ayotochli,	4	4.	Bête à la grande dent,	6	1.
			Bevaro,	11	1.
B.			Bever,	11	1.
B Abi-Roesa,	G.	ST. S.	Bevero,	11	1.
Babian,	15	5.	Biber,	11	1.
Babio,	29	3	Biche,	12	1.
Baboon,	29	3	— Des Bois,	12	5.
Babouin,	29	3	— Des Paletuviers,	12	5.
—	29	3.	Bicho Vergonhofo,	2	2.
Babuino,	29	3	Bievre,	21	1.
Babyroussa;	29	3	Biörn,	38	1.
Bactrianus,	15	5.	Bisem-Mufs,	27	1.
Badger,	7	1.	Bisemreech,	13	5.
Bäfwer,	37	1.	Bisemthier,	13	5.
Baiel,	21	1.	Bifon,	17	6.
Bakar,	14	1.	— Amériquain,	1	7.
Ballottula,	11	1.	— D'Amérique,	11	7.
Baphas,	36	1.	— Blanc,	11	5.
Bär,	32	1.	Bifon,	11	3.
Barah,	38	1.	—	11	6.
Barbastello,	10	1.	— Albus,	11	5.
Bardato,	32	1.	— Albus Calydonius,	11	5.
Barg,	4	4.	— Albus Scoricus,	11	5.
Baris,	15	1.	— Americanus,	11	7.
Barrus,	29	1	— Indicus,	11	7.
Bar,	5	1.	— Jubatus,	11	6.
Bavizan,	32	1.	— Scoticus,	11	5.
Bauwol,	29	3	—	11	6.
Bawol,	11	4.	Bivaro,	21	1.
Beal,	11	4.	Blaireau,	37.	
Bear,	14	4.	—	37	1.
Beaver,	38	1.	— Blanc,	37	2.
Beccho,	21	1.	— De Surinam,	37	5.
Beer,	9	1.	Blâraf,	35	8.
Behemot;	38	1.	Blerellus,	37	1.
Belbus,	19	1.	Boar,	15	1.
Belette,	34	1.	— (Wild)	15	5.
—	36.		Bobak,	25	6.
Bellier,	36	1.	Bobr,	21	1.
—	10.		Bock,	9	1.
Belzébut,	10	1.	Bœuf,	11.	
Benula,	29	4	—	11	1.
	36	1.	— Domestique,	11	1.

	G.	S.	G.	S.
— Maria,	6	1. Buffelus,	31	41
— Sauvage,	11	8. Buffes,	11	3.
Bomarin,	19	1. Buffle,	11	4.
Bonafus,	11	8. —	11	7.
Boophagus,	34	8. — D'Afrique,	11	2.
Borluk,	37	1. Bugill,	11	4.
Bos,	11.	1. Buk,	15	1.
—	11	Bulges,	11	3.
— Africanus Bellonii,	11	1. Bull,	11	1.
— Domesticus,	11	2. Buntfing,	36	10.
— (Elegans & Parvus		1. Buo Marino,	33	1.
Africanus)	11	Bupotamus,	19	1.
— (Exiguus Africanus)	11	2. Burro do Matto,	14	2.
Boschratte,	23	1. Bufen,	9	1.
—	41	8. Buyrezio,	11	1.
Boucaut,	11	4. Buz,	9	1.
Bouc,	9.			
—	9			
Bouc-Estain,	9			
Boue Marino,	33			
Buis,	11			
Bradypus &c,	3.			
Bandlirts,	12			
Brebis,	10			
— D'Afrique,	10			
— Domestique,	10			
— De Guinée,	10			
— A large queue,	10			
— A longue queue,	10			
Brock,	37			
Bubalus,	11			
—	11			
— Africanus,	11			
— Veterum,	11			
— Vulgaris,	11			
Büch Marder,	36			
Buck,	12			
Bue,	11			
Buey,	11			
— (Pege)	6			
Bufalo,	11			
Bufano,	11			
Buffel,	11			
— (Wilde)	11			

C.

G. ST. S.

C	Aaigoara,	15	6.
	Caballus Marinus,	19	1.
	Cabjai,	17.	
	—	17	1.
	Cabionara,	17	1.
	Cabra,	9	1.
	Cabrito,	9	1.
	Cabron,	9	1.
	Cabronzillo Montés,	11	5.
	Cachorro Domato,	42	4.
	Cagui Major,	29	4 10.
	— Minor,	29	4 14.
	Caitaia,	29	4 7.
	—	29	4 14.
	Caitaja,	29	4 7.
	Caldah,	36	1.
	Calf,	11	1.
	—	11	1.
	— (Sea)	33	1.
	Camel,	7	1.
	—	7	2.
	Camello,	7	1.
	Camelo Congener,	7	4.
	Camelopardalin,	8	1.
	Camelopardalis,	8	1.
	Camelopardalus,	8	1.

Camelus,

ALPHABETICUS.

313

	G.	S.		G.	ST.	S.
Camelus ;	7.	—	Orientalis ,	9	12.	
—	7	1.	— Parva Americana ,	9	4.	
—	7	2.	— Pazaharrica ,	9	9.	
— Arabica ,	7	2.	— Strepliceros ,	9	8.	
— Dromas ,	7	1.	— Sylvestris Africana ,	13	4.	
— Indicus ,	8	1.	— Syriaca ,	9	13.	
— Laniger ,	7	4.	Caprea ,	9	6.	
— Minimus ,	7	1.	—	12	5.	
— Peruanus ,	7	3.	— Groenlandica ,	12	4.	
—	7	4.	— Plinii ,	12	5.	
— Spurtius ,	7	3.	Capreolus ,	12	5.	
Camorcia ,	9	6.	— Brasiliensis ,	12	5.	
Campagnoli ,	26	4.	— Marinus ,	12	5.	
—	26	12.	— Moschi ,	13	5.	
Camuza ,	9	6.	Capricerva ,	9	9.	
Cane ,	35	1.	Capricornus ,	9	3.	
Canicula aquatica ,	40	1.	Capriola ,	12	5.	
Canis ,	35.		Capriolo ,	12	5.	
—	35	1.	— Del Musco ,	13	5.	
— Domesticus ,	35	1.	Capybara ,	17	1.	
— Fluvialis ,	40	1.	Care ,	14	3.	
— Piliis cervicis erectis ,			Carigoy ,	42	1.	
&c ,	34	1.	Carigue ,	42	1.	
— Ponticus ,	21	1.	Cariguebeju ,	40	2.	
— Sylvestris ,	35	2.	Carigueibeju ,	40	2.	
— Volans ex Novâ His-			Carigueya ,	42	1.	
pania ,	30	3.	— Brasiliensis ,	42	1.	
— Volans Ternatanus			Carnero ,	10	1.	
Orientalis ,	30	1.	Carnevoca ,	26	2.	
Caper ,	9	1.	Carygueibeju ,	40	2.	
— Mambrinus ,	10	5.	Castor ,	21.		
— Montanus Alberti ,	9	3.	—	21	1.	
Capra ,	9	1.	— Blanc ,	21	2.	
— &c ,	13	1.	Castor ,	21.		
—	13	4.	—	21	1.	
— Bezaarrica ,	9	9.	— Albus ,	21	2.	
— Bezoarrica ,	9	9.	— Cauda lineari te-			
— Cretensis ,	9	15.	reti ,	26	11.	
— Domestica ,	9	1.	Car ,	39	1.	
— Fera Varroni ,	9	3.	— (Civer)	37	4.	
— Indica ,	9	13.	— A Mountain ,	39	13.	
— Mambrina ,	9	15.	Cataph ,	29	1.	
— Montés ,	9	6.	Cataphraetus ,	4.		
— Moschi ,	13	5.	Catharer ,	36	10.	
— Novæ Hispaniæ ,	9	14.	Catul ,	39	1.	

R

	G. ST. S.		G. ST. S.
Catus,	39	— Imberbis secundus	
— Cervarius,	39	— Clusii,	29 4 16.
— Domesticus,	39	— Moschum redolens	
— Feralis,	39	— Brasiliensis,	29 4 7.
— Hispaniæ,	36	— Papio,	29 3 1.
— Montanus America-		— Sagouin dictus,	29 4 14.
— norum,	39	— Simiolus Ceylonicus,	29 4 8.
— Pardus,	39	— Terrius Guineensis,	29 4 6.
— Pardus Mexicanus,	39	— Cenalsa,	5 1.
— Sylvestris,	39	— Cercopithecus,	29 4.
— Sylvestris ferus,	39	—	29 5 1.
— Tepe Maxtlaton dic-		— Americanus minor,	29 4 13.
— tus,	39	— Angolenfis major,	29 5 1.
— Tigrinus,	39	— Barbatus alius Gui-	
— Zibethi,	37	— neensis,	29 4 19.
— Ziberhicus,	37	— Barbarus Clusii,	29 4 25.
Cavallo,	14	— Barbarus Guineensis,	29 4 23.
Cavia Aguti,	23	— Barbarus maximus &c,	29 4 20.
— Aperea,	23	— Barbarus primus Clusii,	29 4 25.
— Bahamensis,	25	— Barbarus secundus	
— Cobaya,	22	— Clusii,	29 4 24.
—	23	— Brasilianus primus,	29 4 7.
— Hydsonis,	20	— Brasilianus secundus,	29 4 5.
— Javenfis,	23	— Brasilianus tertius,	29 4 14.
— Paca,	23	— Caitaja dictus,	29 4 7.
— Surinamensis,	23	— Ceylonicus,	29 1 3.
Cavretro,	9	— Cynocephalus,	29 5.
Cavriola,	12	— Guariba dictus,	29 4 2.
Cavriolo,	12	— Guineensis alius,	29 4 6.
Cay,	29 4 5.	— Guineensis tertius,	29 4 6.
Cebalus,	36	— Meerkatz,	29 4 2.
Cebus Angolenfis major,	29 5 2.	— Minimus &c,	29 4 10.
— Barbarus,	29 4 23.	— Minor luteus,	29 4 8.
— Barbatus alius Gui-		— Monkje dictus,	29 4 13.
— neensis,	29 4 19.	— Moscatas,	29 4 7.
— Barbatus primus Clu-		— Niger &c,	29 4 22.
— sii,	29 4 25.	— Non Barbarus primus	
— Barbatus secundus Clu-		— Clusii,	29 4 15.
— sii,	29 4 24.	— Non Barbarus secun-	
— Capur morruum,	29 4 13.	— dus Clusii,	29 4 16.
— Elaurandus,	29 4 21.	— Sagouin,	29 4 14.
— Guariba,	29 4 2.	— Cercopithecus,	29 4.
— Imberbis primus Clu-		— Cynocéphale,	29 5.
— sii,	29 4 15.	—	29 5 1.

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Cetf,	12.	.	Chamois,	9	6.
—	12	1.	— (Petit) d'Amérique,	9	5.
— D'Allemagne,	12	2.	Chamor,	14	3.
— De Canada,	12	3.	Chafir,	15	1.
— De Groënland.	12	4.	Chafira,	15	1.
Cerva,	12	1.	Char,	39.	
— Parvula Africana,	13	1.	— D'Angora,	39	4.
Cervo,	12	1.	— Cervier,	39	14.
Cervula Africana,	13	2.	— Domestique,	39	1.
— Subrubra,	13	3.	— Epineux,	20	4.
— Surinamensis subru-			— Pard,	39	13.
bra,	13	3.	— Sauvage,	39	2.
Cervulus,	12	5.	— Sauvage Tigré,	39	3.
Cervus,	12.		— Tigre,	39	3.
—	9	14.	Chaus,	39	13.
—	12	1.	Chauve-Souris,	32.	
— Africanus,	13	2.	— D'Amérique,	32	6.
— Burgundicus,	12	6.	— [Grande] de notre		
— Canadensis,	12	3.	pays,	32	1.
— Cornibus simpliciffi-			— (Grande) de Ternate,	32	4.
mis,	8	1.	— (Petite) de notre		
— Cornutus ex Nova			pays,	32	3.
Hispania,	9	14.	— (Petite) de Ternate,	32	2.
— Germanicus,	12	2.	— Rouffe d'Amérique,	32	5.
— Groenlandicus,	12	4.	Cheval,	14.	
— Juvencus pergracilis			—	14	1.
Africanus,	13	1.	— Marin,	19	1.
— Juvencus perpuillus			— Ongre,	14	1.
Guineensis,	13	1.	Chevre,	9	1.
— Major &c,	12	5.	— D'Angora,	9	2.
— Minimus,	12	5.	— De Congo,	13	1.
— Minor &c,	12	5.	— De C rete,	9	15.
— Mirabilis,	12	8.	— Domestique,	9	1.
— Nobilis,	12	1.	— Du Levant,	9	12.
— Odoratus,	13	5.	— De la Nouvelle Ef-		
— Palmatus,	12	7.	pagne,	9	14.
—	12	8.	— (Petite) d'Amérique,	9	4.
—	12	9.	— Privée,	9	1.
— Platyceros,	12	7.	— De Sirie,	9	13.
— Rangifer,	12	8.	Chevreau,	9	1.
— Temamaçama,	9	11.	Chevreuil,	12	5.
Chameau,	7.		— Du Brésil,	12	5.
—	7	1.	Chevrota n,	13.	
—	7	2.	— D'Afrique,	13	4.
— Du Perou,	7	3.	— De Guinée,	13	2.

R ij

	G.	ST.	S.		G.	E.
— Des Indes,	<u>13</u>	1.	— Noir,	<u>15</u>	6.	
— De Surinam,	<u>13</u>	2.	— De Terre,	<u>1</u>	1.	
Chien,	<u>15</u>		Coes-Coes,	<u>42</u>	3.	
—	<u>15</u>	1.	Coja-Merl,	<u>15</u>	6.	
— Martin,	<u>13</u>	2.	Comadreia,	<u>36</u>	1.	
— De Mer,	<u>31</u>	1.	Comoza,	<u>9</u>	6.	
Chienne,	<u>35</u>	1.	Concio,	<u>22</u>	4.	
Chimpancée,	<u>29</u>	1.	Coneparl,	<u>17</u>	3.	
Chirquinchum,	<u>4</u>	4.	Coniglio,	<u>22</u>	4.	
Choakamna,	<u>29</u>	3.	Cony,	<u>22</u>	4.	
xolm,	<u>15</u>	1.	Cordero,	<u>10</u>	1.	
— Kym,	<u>15</u>	2.	Corza,	<u>12</u>	7.	
Chomik,	<u>25</u>	8.	Cotia,	<u>23</u>	2.	
Chulda,	<u>36</u>	1.	Cow,	<u>15</u>	1.	
Chuldah,	<u>36</u>	1.	Coyamerl,	<u>15</u>	6.	
Cierwa,	<u>12</u>	1.	Coyopollin,	<u>42</u>	6.	
Ciervo,	<u>12</u>	1.	Cricetus,	<u>25</u>	8.	
Cinghiale,	<u>15</u>	2.	Croque-Noix,	<u>25</u>	3.	
Cinghiare,	<u>15</u>	3.	Cuandu,	<u>20</u>	4.	
Civet Cat,	<u>37</u>	4.	— Major,	<u>20</u>	5.	
Civetta,	<u>37</u>	4.	Cuati,	<u>38</u>	4.	
Civette,	<u>37</u>	4.	Cudana,	<u>14</u>	4.	
Coati,	<u>38</u>	4.	Cuetlachtli,	<u>35</u>	4.	
— Mondi,	<u>38</u>	5.	Cugnacu-Apata,	<u>12</u>	5.	
—	<u>38</u>	6.	— Ata,	<u>19</u>	11.	
— Mondi à queue anne-			— Arana,	<u>32</u>	11.	
lée,	<u>38</u>	6.	— Etc,	<u>12</u>	5.	
— Simplement dit,	<u>38</u>	4.	Cuniculi Brasiliensis spe-			
Coati,	<u>38</u>	4.	cies,	<u>22</u>	7.	
— Brasiliensum,	<u>38</u>	4.	—	<u>23</u>	2.	
— Cauda brevi,	<u>37</u>	1.	—	<u>23</u>	4.	
— Civetta,	<u>37</u>	4.	Caniculus,	<u>23</u>		
— Ginetta,	<u>36</u>	13.	—	<u>22</u>	4.	
— Griseus,	<u>37</u>	1.	— Americanus,	<u>23</u>	3.	
— Hernandezii,	<u>37</u>	2.	— Americanus & Gui-			
— Ursulo affinis Ame-			neensis,	<u>23</u>	7.	
ricanus,	<u>38</u>	2.	— Angorensis,	<u>22</u>	6.	
Coaty,	<u>1</u>	4.	— Brasiliensis,	<u>22</u>	7.	
Cochon,	<u>15</u>		—	<u>23</u>	8.	
—	<u>15</u>	1.	— Germanicus,	<u>23</u>	6.	
— De la Chine,	<u>15</u>	2.	— Javenis,	<u>23</u>	1.	
— Domestique,	<u>15</u>	1.	— Indicus,	<u>23</u>	7.	
— D'Eau,	<u>17</u>	1.	—	<u>23</u>	8.	
— De Guinée,	<u>15</u>	4.	— Indus,	<u>23</u>	7.	
— D'Inde,	<u>23</u>	7.	— Major pahutris,	<u>23</u>	4.	

ALPHABETICUS.

	G.	ST.	S.		G.	S.
— Norvagicus;	23	5.		Dib,	35	2.
— Noftras,	22	4.		Didelphis &c;	42.	
— Omnium vulgariffi-				Dikerin,	10	1.
mus,	23	2.		Dob,	38	1.
Cynocephalus,	29	5	3.	Doe,	12	7.
— Primus,	29	2	1.	Dof,	12	7.
— Secundus,	29	5	3.	Dofhiort;	12	7.
				Dog,	35	1.
				Donnola,	36	1.
				Donola,	36	12.
D.				Dorcas,	9	6.
	G.	S.		—	12	5.
D Abba,	34	1.		—	12	5.
Dabuh,	34	1.		— (Greater)	25	2.
Dachs,	37	1.		Dornfchweyn,	20	1.
Dahab,	34	1.		Doujong,	6	2.
Daim,	12	7.		Dromadairé,	7	2.
— D'Efpañe,	12	7.		Dromas,	7	2.
— De Groënlande,	12	4.		—	7	2.
— De Virginie,	12	7.		Dromedario,	7	2.
Daino,	12	7.		Dromedarius,	7	1.
Dam,	12	7.		—	7	2.
Dama,	12	7.		Dromedary,	7	2.
— Cervus,	12	7.		Duba,	38	1.
— Hispanica,	12	7.		Dubbe,	38	1.
— Recenriorum,	12	7.		Dujung,	6	2.
— Virginiana,	12	7.		Dzyka-Kofa;	9	6.
— Vulgaris,	12	7.				
Damhirfch,	12	7.				
Damhirs,	12	7.				
Dámlin,	12	7.				
Damula,	36	12.				
Daniel,	12	7.				
Danio,	12	7.				
Dar,	37	1.				
Dafypus &c,	4.					
— Cucurbitinus;	4.					
—	22	4.				
Deba,	8	1.				
—	35	2.				
Deeba;	35	2.				
Definan,	21	3.				
Definanskarr,	36	13.				
Diable de Java,	2	1.				
— De Tajoan,	2	2.				
Diabolus Tajovanicus,	2	1.				

E.

	G.	S.
E Bamar;	7	2.
E Echinus,	28	1.
— Brasilianus,	4	4.
— Indicus albus,	28	4.
— Sibiricus,	28	2.
— Tetreftris,	28	1.
— (Testudinatus)	4	3.
Ecureuil,	24.	
—	24	1.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Siberie,	24	2.
— Du Brésil,	24	7.
— De la Caroline,	24	2.

R r üj

	G. ST. S.		G. ST. S.
— (Grand) gris,	24	6. — Cicuratus,	14 1.
— Noir,	24	3. — Domesticus,	14 1.
— De la Nouvelle Espagne,	24	— Ferus,	14 2.
— Palmiste,	24	8. — Marinus,	6 1.
— De Terre,	24	10. Erdmufz,	26 4.
— Varié,	24	9. Erinaceus,	28.
— De Virginie,	24	4. — Americanus,	28 1.
— Volant,	24	6. — Americanus albus,	28 4.
— Volant de Sibirie,	24	12. — Auricularis,	28 1.
— Volant de Virginie,	24	13. — Malaccensis,	28 3.
Eel,	10	1. — Nostras,	28 1.
Egel,	11	1. — Sibericus,	28 2.
Egela,	11	1. — Subauricularis,	28 4.
Egin,	7	2. — Surinamensis,	28 4.
Eichhertmelin,	24	1. — Terrestris,	28 1.
Elan,	9	1. Erizo,	28 1.
—	12	7. Ermine,	36 2.
Elant,	12	9. Ermineum,	36 2.
Elanquet,	12	9. — (Animal) Recentio-	
Elegans & parvus Africanus Bos,	11	rum,	36 2.
Elegantissimum Animal,	29 1	1. Ernab,	22 1.
Elephant,	5.	2. Efel,	14 3.
—	5	3. Espinho,	20 4.
Elephante,	5	—	20 5.
Elephas,	5.	1. Esquilo,	24 1.
—	5	1. Exiguus Africanus Bos,	11 2.
— Africanus,	5	Exoticum Animal,	4 3.
Elanquet,	5	1. Exquima,	29 4 23.
Elewandum,	29 4	1. — Guineensis,	29 4 23.
Elg,	10	1. Eychhorn,	24 1.
Elk,	12	21. Lychorn,	24 1.
Elkerkedom,	16	1. Iza,	9 1.
Ellend,	12	9. Ezel, [Wald]	14 5.
Elfdiur,	12	1.	
Encubertado,	4	9.	F.
Encubetto,	4	4. F Allow-Deer,	12 7.
Enhörning,	16	4. Faon,	12 1.
Equus Arborum,	39	1. Fätle,	15 1.
Equi-Cervus,	12	— [Span]	15 1.
Equus,	14	1. Farra,	26 2.
—	14	9. Fawn,	12 7.
		Feck,	24 4.
		1. Feld Marder,	36 8.

ALPHABETICUS.

Feldmufz ;	26	4.	— Des Indes,	36	4.	G.	ST.	S.
Feles ,	39	1.	Farette ,	36	3.	G.		S.
— Fera Tigrina ,	39	3.	Furo ,	36	3.	G.		S.
Felis ,	39.		Furunculus ,	36	3.	G.		S.
—	39	1.				G.		
— Angorenfis ,	39	4.				G.		
— Domestica ,	39	1.				G.		
— Sylveftris ,	39	2.	I ALLE ,	36	1.	G.	ST.	S.
— Sylveftris Tigrina ,	39	3.	FALIS ,	36	1.	G.		S.
— Sylveftris Tigrinus ,	39	3.	Galeopithecus ,	29	4	14.		
— Zibethi ,	37	4.	Galero ,	25	1.	1.		
Ferre ,	36	3.	Galts ,	15	1.	1.		
Fiållmus ,	23	5.	Gamal ,	7	1.	1.		
Fiållracka ,	35	8.	Gamela ,	7	1.	1.		
Fiber ,	21	1.	Gamo ,	12	7.	1.		
Filfras ,	34	1.	Gams ,	9	6.	1.		
Fitchot ,	36	1.	Ganeme ,	10	1.	1.		
—	36	10.	Gata ,	39	1.	1.		
Fl ^e dermus ,	32	1.	Gato ,	39	1.	1.		
Fl ^e dermufs ,	32	1.	— Montés ,	39	2.	1.		
Flitter-Moufe ,	32	1.	Gatta ,	39	1.	1.		
Flygande Ikorn ,	24	12.	Gatto ,	39	1.	1.		
Flying Squirrel ,	24	12.	— [Lupo]	39	15.	1.		
Foar ,	10	1.	Gazella ,	9	7.	1.		
Foetta ,	36	10.	—	9	8.	1.		
Foina ,	36	7.	— Africana ,	9	8.	1.		
Foras Flebar ,	19	1.	—	9	10.	1.		
Fouine ,	36	7.	— Bezoartica ,	9	9.	1.		
Foumart ,	36	1.	— Indica ,	9	7.	1.		
Fourmiller ,	1.	1.	— Novæ Hispaniæ ,	9	11.	1.		
—	1	2.	Gazelle ,	9	8.	1.		
— Aux longues oreilles ,	1	3.	— D'Afrique ,	9	10.	1.		
— (Petit)	1	4.	— Du Bezoar ,	9	10.	1.		
— Tamanoir ,	1	1.	— Des Indes ,	9	7.	1.		
Fouyua ,	36	7.	— De la Nouvelle Ef-					
Fox ,	35	5.	pagne ,	9	11.	1.		
— (Gray)	35	7.	Gehad ,	39	5.	1.		
Foyna ,	36	7.	Geifz ,	9	1.	1.		
Frer ,	36	7.	Gelen ,	12	1.	1.		
Frett ,	36	3.	Gelm ,	12	9.	1.		
Frettel ,	36	3.	Gemal ,	7	1.	1.		
Fuchfs ,	35	5.	Gems ,	9	6.	1.		
Furam ,	36	3.	Genas ,	10	1.	1.		
Furet ,	36	3.	Generhocatus ,	36	13.	1.		
— De Java ,	36	5.	Genetta ,	36	13.	1.		

	G.	S.		G. ST. S.
Genette,	36	<u>12</u> .	Gronostay,	<u>16</u> 2.
Genithkatz,	36	<u>12</u> .	Grosse-Hasselmufs;	<u>15</u> 1.
Gefs,	18	1.	Guabiru,	<u>16</u> 1.
Get,	9	1.	Guariba,	<u>12</u> 4 1.
Gevazen,	12	1.	Guiny Pig,	<u>23</u> 7.
Gezwocz,	37	1.	Gulo,	<u>14</u> 1.
Gheit, (Wild)	9	<u>2</u> .	Gur,	<u>12</u> 1.
Ghiro,	25	1.	Gurba,	<u>16</u> 1.
Ghush, (Siyah)	39	<u>15</u> .	Gyraffa,	8 1.
Ginetta,	36	<u>12</u> .		
Giraff,	8	1.		
Giraffa,	8.			
—	8			
Giraffe,	8.			
—	8			
Girnaffa,	8			
Girse,	9			
Glama,	7			
Glieto,	25			
Glis,	25.			
—	25			
—	26			
— Americanus,	25			
— Cricerus,	25			
— Marmota America-				
nus,	25			
— Marmota Italis,	25			
— Moschiferus,	21			
— Norvagicus,	26			
— Volans Ternatanus,	32			
Goat,	9			
Gomela,	16			
Goote, (Wild)	9			
Gospand,	10			
Gote-Bucke,	9			
Gouandou,	20			
Gräff-vin,	37			
Grassa,	8			
Granbestia,	12			
Grau-Werck,	24			
Gtay,	37			
— Fox,	35			
Greater-Dormouse,	25			
— Sleeper,	25			
Greul,	25			

H.

	G.	S.
1. H Aas,	<u>12</u>	1.
Hamster,	<u>15</u>	8.
1. Hamster,	<u>15</u>	8.
1. Harda,	<u>24</u>	1.
1. Hardy-Shrew,	<u>27</u>	1.
1. Hare,	<u>12</u>	1.
1. Hart,	<u>12</u>	1.
Hase,	<u>22</u>	1.
1. Hasselmaus,	<u>25</u>	2.
1. Hasermufs,	<u>25</u>	2.
5. Hafs,	<u>22</u>	1.
8. Hasselmufs, (Grosse)	<u>25</u>	1.
Häst,	<u>14</u>	1.
5. Haut,	3	1.
7. Hay,	3	1.
3. Hayma,	<u>12</u>	1.
8. Hedgehog,	<u>18</u>	1.
4. Hedgog, (Great Sterill'd)	4	4.
1. Heinit,	<u>14</u>	1.
1. Heirth,	<u>10</u>	1.
6. Helphant,	5	1.
1. Humer,	<u>14</u>	4.
1. Hericius,	<u>28</u>	1.
4. Herinaceus,	<u>28</u>	1.
1. Herisson,	<u>28</u> .	
1. —	<u>28</u>	1.
— D'Amérique;	<u>28</u>	4.
4. — De Malacca,	<u>28</u>	3.
1. — De Siberie,	<u>28</u>	1.
7. Herix,	<u>28</u>	1.
1. Herman,	<u>10</u>	1.
1. Hermelin,	<u>16</u>	2.
1. Hermellani,	<u>16</u>	2.

Hermellanus,

ALPHABETICUS.

	G.	ST.	S.		G.	ST.	S.
Hermellanus,	36	1.	— (Meer)	33	1.		
Hermine,	36	2.	— [Sfl]	33	1.		
Hiam,	43	5.	— [Seal]	33	1.		
Hind,	11	1.	— (See)	33	1.		
Hinde,	12	1.	Huron,	36	3.		
— Kalb,	12	1.	Hyena,	34.			
Hindin,	12	1.	—	34	1.		
Hinnulus,	12	1.	— Gefneri,	19	3		
— Pergracilis Africanus,	13	1.	— Odorifera,	37	4.		
Hior,	12	4.	— Veteribus,	37	4.		
Hippelaphus,	12	2.	— (Zilio)	34	2.		
Hippopotame,	19.		Hydrochaerus,	17.			
—	19	1.	—	17	1.		
Hippopotamus,	19.		Hyene,	34.			
—	19	1.	—	34	1.		
— Antiquorum,	19	1.	Hylrix,	10.			
— Falsò dictus,	6	1.	—	10	1.		
Hirco-Cervus,	12	2.	—	10	5.		
Hircus,	9.		— Americanus,	10	4.		
—	9	1.	— Americanus major,	10	5.		
— Angorensis,	9	2.	— Genuina,	18	3.		
— Bezaarticus,	9	9.	— Hudsonis,	10	5.		
— Bezosticus,	9	9.	— Malaccensis,	18	3.		
— Domesticus,	9	1.	— Novæ Hispaniæ,	10	1.		
— Ferus,	9	3.	— Orientalis,	10	6.		
— Pazaharticus,	9	9.	— Orientalis cristata,	10	1.		
Hirpus,	35	2.	— Orientalis singularis,	10	6.		
Hirs,	12	1.					
Hirsch,	12	1.	L				
Hirts,	12	1.					
Histrice,	10	1.	J Achmur,	11	1.		
Hædus,	9	1.	J Jackcall,	35	3.		
Hog,	15	1.	Jackhals,	35	3.		
— (Muok)	15	6.	Jacla,	9	3.		
Hogenain,	7	1.	Jaguara,	39	8.		
Hogg,	10	1.	— Brasiliensis,	39	8.		
Hoitzlacuarzin,	10	1.	Jaguarere,	39	9.		
Hoitzlaquatzin,	10	1.	— Brasiliensis,	39	9.		
Homme des bois,	19	1	1. Jakhals,	35	3.		
Homo sylvestris,	19	1	2. Javali,	15	3.		
Hors-hwal,	6	1.	1. Jazwice,	37	1.		
Horse,	14	1.	1. Ibox,	9	3.		
— (Sea)	6	1.	— Parvus Americanus,	9	5.		
Huhfs Marder,	36	7.	1. Ichiarl,	7	3.		
Hund,	35	1.	1. Ichneumon,	36	12.		

Ss

	G.	S.	G. ST. S.
— De Yzquiepat ;	37	3. Katt,	39 1.
Ictis,	36	3. — (Desfmans)	36 13.
— Scythica ,	36	2. — (Will)	32 13.
Jelen ,	12	1. Katta ,	32 1.
Jelijenii .	12	1. Kattlo ,	32 14.
Jesef ,	34	1. Katz ,	32 1.
Jez ,	28	1. — (Genith)	36 13.
Igel ,	28	1. — Luchs ,	32 14.
Igelkott ;	28	1. — (Meer)	22 4 2.
Ignavus ,	3	1. Katze, (Wilde ,)	32 2.
Jiya ,	40	2. Kebes ,	10 1.
Ixorn ,	24	1. Kelbe ,	35 1.
— (Flygande)	24	12. Keleb ,	35 1.
Iev'e ,	36	1. Kenlée ,	35 6.
Iller ,	36	10. Kepb ,	35 1.
Iltis ,	36	10. Kephir ,	32 5.
Imar ,	10	1. Keret ,	27 1.
Indianisch Künele .	23.	7. Hipod .	28 1.
Indisch Seüle .	23.	7. Ko ,	11 1.
Investigátor .	36	12. Kobyla ,	14 1.
Ιννιλαφισ ,	12	8. Koc ,	32 1.
Ιννιουταμει ,	19.	1. Koczka ,	32 1.
Ivot ,	14	1. Koe ,	11 2.
Jument ,	14	1. Koger-Angan ,	36 5.
Jupatiima ,	42.	1. Kolczawa ,	36 2.
Juvenca, [sylvestris]	11	2. Kolpb ,	35 1.
Ize ,	9	1. Kon ,	14 1.
Izquiepotl ,	37	3. Koniin ,	22 4.
		Kopeda ,	28 1.
		Koph ,	32 1 12.
		Kophin ,	22 1 1.
		1. Korn Füle ,	25 8.
		1. Korytansky ,	2 6.
		1. Koslik ,	2 6.
		1. Koszalka ,	25 2.
		1. Kot Dziki ,	37 1.
		1. —	32 2.
		4. Kortzohi ,	9 3.
		1. Koza ,	2 1.
		3. — (Dzyka)	9 6.
		1. — Lesna ,	12 5.
		1. — Skalna ,	2 6.
		1. Kozel ,	2 1.
		6. Koziel ,	2 1.
		1. Kozoroziecz ,	2 3.

K.

K Aabe,
Kabfa,
Kamelthier ,
Kalb ,
Kalba ,
Καμολος ,
Kanin ,
Kanifur ,
Καορη ,
Karas ,
Karafch ,
Kargos ,
Karibou ,
Καριγ ,

G.
33
10
7
11
35
7
22
15
15
16
16
22
12
21.

S.
1. Korn Füle ,
1. Korytansky ,
1. Koslik ,
1. Koszalka ,
1. Kot Dziki ,
1. —
4. Kortzohi ,
1. Koza ,
3. — (Dzyka)
1. — Lesna ,
1. — Skalna ,
1. Kozel ,
6. Koziel ,
1. Kozoroziecz ,

25
2
2
25
37
32
9
2
9
12
2
2
2
2

ALPHABETICUS:

	G.	S.		G.	323
Kralik,	21	4.	— D'Angora,	21	5.
Krer,	41	1.	— De Bahama,	25	6.
—	41	2.	— Du Brésil,	25	4.
Krolik,	10	1.	— De Java,	25	8.
Krolijk,	21	4.	— Des Indes,	25	1.
Kronhiort,	21	4.	— De Norvege,	25	7.
Kronhiort,	11	1.	— De notre pays,	25	5.
Krossgrf,	35	6.	Lapreau,	21	4.
Kriticze,	41	1.	Lalica Lefna,	21	4.
Krzyzaki,	35	6.	Lafino,	36	3.
Krit,	36	3.	Laska,	36	3.
Ku,	11	1.	Laye,	36	3.
Kühe,	11	1.	Leem,	35	3.
Kun,	14	1.	Lekar,	25	5.
Kuna,	36	8.	Lekare,	36	2.
Künele,	21	4.	Leming,	36	2.
— (Indianisch)	25	7.	Leo,	25	5.
Künigle,	21	4.	Leona,	39	5.
Kunlein,	21	4.	Leon,	39	5.
Kydd,	9	1.	A'w,	39	5.
Kw,	35	1.	Leone,	39	5.
			Leopardal;	39	12.
L.			Leopard,	39	12.
	G.	S.	Leopard,	39	12.
I Abi,	39	5.	Leopardus,	39	12.
Lacerta Indica,	2	2.	Leophante,	5	1.
Lacerrus Indicus squamo-			Leparde,	39	12.
— fus,	2	1.	Leppard,	39	12.
— Squamofus minor,	2	1.	Lepte,	21	1.
— Squamofus peregrin-			Lepus,	21.	
— nus,	2	2.	—	21	1.
Läderlapp,	31	1.	— Albissimus,	21	2.
Aayur,	21	1.	— Albus,	21	2.
Laisch,	39	5.	— Brasilianus,	21	7.
Lam,	10	1.	— Candidus,	21	2.
Lamantin,	6	2.	— Niger,	21	3.
Lamb,	10	1.	— Plané niger,	21	3.
Lambe,	10	1.	— Vulgaris cinereus,	21	1.
Lä nblin,	10	1.	Lepusculus,	21	4.
Lanii,	11	1.	Léror,	25	2.
—	11	7.	Leraga,	24	12.
Lapin,	25.		Lévraut,	21	1.
—	22	4.	Leure,	40	1.
— D'Allemagne,	25	6.	Lew,	39	5.
— D'Amérique,	25	3.	Lewhart,	39	12.

Sij

	G.	S.		G.	S.
Leyon,	39	5.	Luchs,	39	15.
Lezard de Clusius,	2	2.	— (Katz),	39	14.
— Ecaillé,	2	1.	Luisaardt,	3	2.
— Ecailleux,	2	1.	Lumnick,	23	5.
— Des Indes Orientales,	2	2.	Lupo,	35	2.
Lhama,	7	3.	— Cerveiro,,	39	15.
Licbre,	22	1.	— Cervero,	39	15.
Lievora,	22	1.	— Cerviro..	39	15.
Lièvre,	22.		— Gatto,	39	15.
—	22	1.	Lupus,	35	2.
— Blanc,	22	2.	— Armenius,,	39	15.
— Du Brésil,	22	7.	— Aureus,	35	3.
— De Java,,	23	1.	— Aureus Asiaticus,	35	3.
— Noir,	22	3.	— Canarius,	39	12.
Lion,	39	5.	— Cervarius,,	39	15.
Lionne,	39.	5.	— Indicus,	35	4.
Liron,	25	1.	— Mexicarus,	35	4.
Lis	35.	5.	— Vesperinus,,	34	1.
Liska,,	35	5.	— Vulgaris,	35	2.
Lizka,	35	5.	Lutra,	40.	
Lobo,	35.	2.	—	40	11
— Marino,,	33	1.	— Ægypti,	36	12.
Lodra,	40	1.	— Brasiliensis,	40	2.
Lodria,,	40	1.	— Nigricans &c,	40	2.
Loir,	25.		Lutris,	40	3.
—	25	1.	Luzarne,,	39	15.
Loni,,	12	8.	Lws,	39	15.
Loofs,	15.	1.	Lybarde,,	39	12.
Los,	12	9.	—	39	15.
Loup,	35	2.	—	35.	2.
— Cervièr,,	39	15.	— Lynce,	39	15.
— Doré,	35	3.	Lynx,	39	15.
— Marine,	35.	1.	— Brasiliensis, Jaguará		
— Du Mexique,,	35	4.	dicta,	39.	8.
— Tigre,,	39	10.	— Colore albo &c.	39	14.
Loutra,	40	1.	Lytra,	40.	11.
—	40	2.			
Loutre,,	40.				
—	40	1.			
—	40	2.			
— Du Brésil,,	40	2.			
Louve,	35.				
Louvetau,,	35	2.			
—	38	3.			
Lozzos,,	12.	9.			

M.

G. ST. S.

M	Açame,,	9	14.
	Macaquo,,	29	5
	Macarluchultic,,	9	11.
	Machus Plinio,,	12.	8.
	Mæz,	9	1.
	Magnus Vorator.	34.	10.

ALPHABETICUS.

	G. ST. S.				G. ST. S.		
Magot,	29	5	3.	— Americana,	25	5.	
Majale,	15		1.	— Americanus,	25	5.	
Majalis,	15		1.	— Argentorarensis,	25	8.	
Maumon,	29	5	3.	— Bahamenfis,	25	4.	
Makaque,	29	5	2.	— Italis,	25	7.	
Maki,	31.			— Polonica,	25	6.	
—	31.		1.	Marmotte,	25	7.	
— Aux pieds blancs,	31		2.	— Des Alpes,	25	7.	
— Aux pieds fauves,	31		3.	— Amériquinne,	25	5.	
— A queue annelée,	31		4.	— D'Amérique,	25	5.	
Malikaya,	39		3.	— De Bahama,	25	4.	
Malox,	18		1.	— De Pologne,	25	6.	
Manatee,	6		2.	— De Strasbourg,	25	8.	
Manati,	6		2.	Marfwin,	23	7.	
— Indorum,	6		2.	Marta,	36	8.	
— Phocæ Genus,	6		2.	Martaro,	36	8.	
Manatus,	6		2.	Marte,	36	8.	
Mange-Fourmis,	1		1.	— Zibeline,	36	9.	
Mangeur de Fourmis,	1		2.	Martes,	36	7.	
— (Gros)	1		1.	—	36	8.	
— (Petit)	1		4.	—	36	10.	
Mangouste,	36		12.	— Abierina,	36	8.	
Manicou,	42.		1.	— Domestica,	36	7.	
Manipouris,	18.			— Domestica Matthioli,	36	10.	
—	18		1.	— Domesticus,	36	7.	
Manis &c.	2		1.	— Fagina,	36	7.	
Mapach,	38		4.	— Saxorum,	36	7.	
Mar,	17		1.	— Seychica,	36	9.	
Maracaia,	39		3.	— Sylvestris,	36	8.	
Maraguao,	39		3.	— Zibellina,	36	9.	
Marcafin,	15		3.	Marrin,	36	8.	
Mârd,	36		7.	Martire,	36	8.	
—	36		8.	Martis altera species no-			
Marder,	36		7.	bilior,	36	8.	
— (Füh)	36		7.	Martlet,	36	8.	
— (Feld)	36		8.	Martorello,	36	8.	
— (Huhf)	36		7.	Marruro,	36	8.	
— (Stein)	36		7.	Maul-Wurff,	41	7.	
— [Tach]	36		7.	Maus, [Speck]	32	1.	
— (Wild)	36		8.	Maypoury,	18	1.	
Marmontana,	25		6.	Mazame,	9	14.	
—	25		7.	Meer-Ferkel,	23	7.	
Marmosa,	42		5.	Meer-Hund,	33	1.	
Marmora,	23		7.	Meer-Katz,	29	4	
— Alpina,	25		7.	Meer-Schwein,	23	7.	

S sūj)

	G.	ST.	S.	G.	S.
Meerschweyn,	20	1.	Mulefel,	14	4.
Meer-Wolff,	33	1.	Muler,	14	4.
Meles,	37.		Mullvad,	41	1.
—	37	1.	Mulo,	14	4.
— Alba,	37	2.	Mulor,	26	9.
— Cinerea,	37	4.	Multhier,	14	4.
— Leucophata,	36	12.	Mulus,	14	4.
— Surinamensis,	37	3.	Mulwerf,	41	1.
Melis,	37	1.	Mungathia,	36	4.
Micav,	37	1.	Mungo,	36	4.
Memetiam Bacala,	10	5.	Murganho,	27	1.
Meiri,	14	1.	Murmelthier,	25	6.
Mezeck,	14	4.	—	25	7.
Mieren-Eeter,	1	4.	Murmentle,	25	7.
Mistbellerle,	25	7.	M'urmont,	25	7.
Moldwrap,	41	1.	Murziegalo,	32	1.
Mole,	41	1.	Mus,	26.	
Moll,	41	1.	—	26	1.
Mollmufs,	41	1.	—	26	2.
Monax,	25	5.	— Ægypti,	36	12.
Monkje,	29	4 13.	— Africanus Kayapollin		
Monops,	11	8.	dictus,	41	6.
Montanella,	25	7.	— Agrestis,	26	4.
Montone,	10	1.	— Agrestis brachiatus,	26	12.
Morcego,	32	1.	— Agrestis capite gran-		
Mormeldiur,	25	7.	di,	26	12.
Moromoro,	7	3.	— Agrestis major,	26	4.
Morfe,	6	1.	— Agrestis major mac-		
Morskiciele,	33	1.	rouros,	26	4.
Morfs,	6	1.	— Agrestis minor,	26	12.
Mos,	15	1.	— Agrestis Virginianus		
Mofcardino,	25	3.	albus,	26	7.
Mofcius,	13	5.	— Albus Virginianus,	26	7.
Moskandaz,	11	2.	— Alpinus,	25	6.
Mouller, (Pezze)	6	2.	—	25	7.
Moufe,	26	2.	— Alpinus Plini',	25	7.
— (Flitser)	32	1.	— Americanus,	26	5.
— [Shrew]	27	1.	—	26	6.
Mouton,	10	1.	— Americanus & Gui-		
— De Perrou,	7	3.	neensis,	23	7.
Mows,	26	2.	— Americanus major		
Muger,	8	1.	&c.,	42	8.
Mula,	14	4.	— Aquaticus,	26	3.
Mulafina,	14	4.	—	26	11.
Mule,	14	4.	— Aquaticus Clusii,	21	3.

ALPHABETICUS.

327

G.	S.	G.	S.
— Aquaticus Exoticus		— densus,	21
— Clusii,	21	— Noricus,	23
— Aquatilis,	26	— Ex Norvagia,	26
— Aquatilis Clusii,	21	— Norvagicus,	23
— Avellanarius,	25	—	26
— Avellanarius,	25	— Norvegicus,	23
— Avellanarum major,	25	— Orientalis,	26
— Avellanarum minor,	25	— Palmarum,	24
— Brasiliensis magnus,	23	— Pharaonis,	36
— Cæcus,	27	— Pharaonis quibus-	
— Campestris major,	26	— dam,	23
— Campestris minor,	26	— Ponticus,	24
— Cauda abrupta &c,	23	— Ponticus volans,	24
—	23	— Sarmaticus,	36
— Cauda brevis &c,	23	— Scalopes,	42
—	26	— Scythicus,	36
— Cirellus,	23	— Scythicus volans,	24
— Domesticus,	26	— Sylvestris,	26
— Domesticus commu-		— Sylvestris America-	
— nis,	26	— nus,	23
— Domesticus major,	26	—	42
— Domesticus medius,	26	—	42
— Domesticus minor,	26	— Sylvestris Americanus	
— Domesticus vulgaris,	26	— Scalopes dictus,	42
— Gerulus,	24	— Tlaquatzin,	42
— Indicus,	23	— Venenosus,	27
— Indicus arboreus stria-		— Venerus,	24
— tus,	24	— Volans,	24
— Indicus dictus Coyo-		— Musaraigne,	27
— pollin,	42	—	27
— Lasius,	24	— Du Brésil,	27
— Lemingus,	23	— Musaraneus,	27
— Magnus campi quo-		—	27
— rumdam,	25	—	27
— Major aquaticus,	26	— Brasiliensis,	27
— Marfupialis,	42	— Musc,	13
— Marfupialis maximus		— Muscovy,	21
— Orientalis,	42	— Musculus vulgaris do-	
— Marfupialis sylvestris		— mesticus,	26
— Brasiliensis,	42	— Musaraing,	27
— Minor,	26	— Muset,	27
— Montanus quorum-		— Musette,	27
— dam,	25	— Musk-Hog,	15
— Moschiferus,	21	— Rat,	21
— Moschiferus Cana-		— Mus, (Bisem)	27

	G.	S.		N.		G.	S.
— (Fläder)	32	1.				16	1.
— (Moll)	41	1.				27	1.
— (Spitz)	27	1.	N	Abba,		8	1.
Muskela,	36.			Näbbmus,		8	1.
—	35	1.		Nabin,		39	12.
— Aegypti peculiaris,	36	12.		Nabuda,		16	1.
— Aegyptiaca,	36	12.		Namer,		31	1.
— Africana,	24	10.		Naricornis,		38	1.
— Alba,	36	2.		Nattblacka,		10	1.
— Alpina Junii,	36	2.		Nedwed,		32	1.
— Americana foetida,	36	11.		Nerameisch,		38	1.
— Armellina,	36	2.		Neropyrz,		10	1.
— Candida,	36	2.		Niedzwiedz,		32	1.
— Foetida,	36	10.		Nielmusz,		26	4.
— Glauca,	36	4.		Niemegka-Myfs,		27	1.
— Javanica,	36	5.		Nietoperfz,		31	1.
— Martes,	36	8.		Nimra,		39	12.
— Proprie sic dicta,	36	1.		Noemba,		16	1.
— Scythica,	36	9.		Nöt,		11	1.
— Sobella,	36	9.		Nottola,		32	1.
— Sylvestris,	36	3.		Norala,		31	1.
— Tota alba,	36	2.		Nozorozec,		26	1.
— Viverra dicta,	36	3.		Nölmusz,		26	4.
— Vulgaris,	36	1.		Nutria,		40	1.
— Zibellina,	36	9.		Nuxtipis,		32	1.
Musz,	26	2.					
— (Wasser)	26	11.					
Murzet,	27	1.					
Mygale,	26	2.	O	Chfs,		11	1.
Mygale,	27	1.		Odobenus,		6.	1.
Mygale,	27	1.		—		6	1.
Myrbiörn,	1	1.		Ofer,		12	1.
Myrmecophaga,	1.	1.		Of,		10	1.
—	1	1.		Onager,		14	5.
— Minima,	1	4.		Onagrus,		14	5.
— Minor,	1	3.		Onagra,		14	5.
— Tamanpir dicta,	1	1.		Onça,		39	8.
Myr,	26	1.		—		39	9.
— Lividus,	26	11.		Onçe,		39	9.
Myrs,	26	2.		Op,		14	3.
Myfs,	26	2.		Opallum,		42	1.
— (Niemegka)	27	1.		Ophen,		12	5.
— Polna,	26	4.		Opieze,		29	1.
— Wodna,	26	11.		Opollum,		42	1.
Myfzorzechowa,	25	2.		Oquidi,		7	3.

Orico

ALPHABETICUS.

G. ST. S.			G. ST. S.		
Orico cachero,	20	5.	— Strepficeros Cretica	9	19
—	28	1.	Bellonii,	9	15.
Orignal,	12	9.	— Turcica,	10	2.
Orfo,	38	1.	Owca,	10	1.
Os,	11	1.	Owczc,	10	1.
Oſel,	14	3.	Ok,	11	1.
Oſtrowidz,	39	15.			
Otter,	40	1.	P.		
Orziſſchak,	28	1.			
Ouaikaré,	3	1.	P	G. ST. S.	
Quariri,	1	1.	Aca,	23	4.
Quatirouaou,	1	4.	Paco,	7	4.
Oveia,	10	1.	Pacos,	7	4.
Ounce,	39	15.	Pak,	23	4.
Ourana,	23	4.	Panggoeling,	2	1.
Ourang-outang,	29	2.	Pantegana,	26	1.
Ourico-cachero,	20	4.	Panter,	39	12.
Ourifo,	28	1.	Π αῖ,	39	12.
Ours,	38.		Panthera,	39	12.
—	38	1.	Panthere,	39	12.
— De la Baye de Hud-			Papio,	29	3.
ſon,	38	3.	—	29	3.
— Blanc,	38	2.	— Ius,	29	3.
— (Petit)	38	3.	— Secundus,	3	1.
Ovis,	10	1.	Pardalion,	39	12.
— Æthiopica,	10	4.	Pardalis,	39	12.
— Africana,	10	4.	Π αῖ α α α,	39	12.
— Angolenſis,	10	5.	Π αῖ α α,	39	12.
— Arabia longicauda,	10	3.	Pardus,	39	12.
— Arabica,	10	2.	— Braſilienſis Jaguara		
—	10	3.	dicta,	39	8.
— Arabica altera,	10	3.	— Cauda Brevis,	39	13.
— Chileniſis,	7	4.	Pareſſeux,	3.	
— Cretenſis,	9	15.	—	3	12.
— Domeltica,	10	1.	— De Ceylan,	3	2.
— Guineenſis,	10	5.	Pas,	35	1.
— Indica,	7	4.	Pafan,	9	9.
— Laticauda,	10	2.	Pafen,	9	9.
— Laticauda Arabica,	10	2.	Pate,	37	1.
— Longicauda,	10	3.	Pavyon,	29	3.
— Orientalis,	10	2.	Pecaris,	15	6.
— Peruana,	7	3.	Pecora,	10	1.
—	7	4.	— D'Arabia, con la co-		
— Peruanz alia ſpecies,	7	4.	da larga,	10	1.
— Peruviana,	7	4.	— D'Arabia, con la co-		
			da longa,	10	3.
			T t		

	G.	S.	G. ST.	S.
Peert,	<u>14</u>	1. — A longue queue,	2	2.
Pege-buey,	6	2. Pholidotus,	2.	
Pelandor-Aroé,	<u>42</u>	1. —	2.	1.
Pelon,	7	2. — Longicaudatus,	2	2.
Perack,	<u>32</u>	1. Pig,	15	1.
Pered,	<u>14</u>	4. — [Guiny]	13	7.
Périco-Ligero,	3	1. Pigg Swin,	20	1.
Petro,	<u>21</u>	1. Pigriria,	3	1.
Pervichcau,	7	1. Pipitrello,	32	1.
Pes,	<u>31</u>	1. Pir,	25	1.
Pezillo Ligero,	1	1. Pirdah,	14	4.
Pezze Moullier,	6	2. Pirolus,	24	2.
Phar,	<u>16</u>	2. —	12	1.
Phatagen,	2	2. Platyceros,	12	7.
Philander,	<u>42</u>	2. Polatucha,	24	12.
—	41	1. Polecat,	<u>16</u>	10.
— Africanus,	<u>41</u>	6. Pongi,	<u>29</u>	4
— Amboinensis,	<u>41</u>	3. Popieliza,	24	4.
— Americanus,	<u>41</u>	5. Porc,	15	1.
— Brasiliensis,	<u>41</u>	4. Porc-Épic,	20	
— Capite crasso,	<u>41</u>	—	20	1.
— Cauda Brevis,	<u>41</u>	2. — D'Amérique,	20	4.
— Maximus Orientalis,	<u>41</u>	3. — De l'Amérique Sep-		
— Orientalis,	<u>41</u>	2. — tentriionale,	10	3.
— Surinamensis,	<u>41</u>	7. — De la Baye de Hud-		
Philandre,	<u>41</u>	son,	20	2.
—	<u>41</u>	1. — (Grand) d'Améri-		
— D'Afrique,	<u>41</u>	que,	20	5.
— D'Amboine,	<u>41</u>	3. — Des Indes Orienta-		
— D'Amérique,	<u>41</u>	les,	20	6.
— Du Brésil,	<u>41</u>	— De la Nouvelle Ef-		
— A courte queue,	<u>41</u>	pagne,	20	2.
— A grosse tête,	<u>41</u>	Porcellio, [Testudinatus]	4	3.
— Oriental,	<u>41</u>	2. Porcellus,	15	1.
— De Surinam,	42	2. — Cataphractus,	4	6.
Phir,	<u>25</u>	7. — Frumentarius,	25	2.
—	<u>26</u>	1. — Guineensis,	23	7.
Phoca,	<u>32</u>	— Indicus,	33	7.
—	<u>32</u>	1. Porco,	15	1.
— Dentibus exsertis,	6	1. — Castrato,	15	1.
Phocas,	33.	1. — Spino,	20	1.
—	<u>32</u>	1. — Spinalo,	20	1.
—	<u>32</u>	1. — Sylvaticus,	15	3.
Pholidote,	2.	Porcupict,	20	1.
—	2.	1. Porcupine,	20	1.

ALPHABETICUS.

1331

Porcus,	G.	S.	Quauhrla-Coymatl,	15	6.	
— Aculeatus Malaccen-	15	1.	Quickhatch,	38	3.	
— Aculeatus Malaccen-			Quimichpatlan,	24	12.	
— Aculeatus Malaccen-	28	3.				
— Aculeatus sylvestris,	20	6.	R.			
— Americanus,	15	6.	G.	S.		
— Babyroussa,	15	5.	R	Aadiur,	12	5.
— Domesticus,	15	1.	Rabit,	12	4.	
— Fluvialis,	17	1.	Raccoon,	38	4.	
— Guineensis,	15	4.	Radja Outang,	39	6.	
— Indicus,	15	5.	Radiur,	12	5.	
— Moschiferus,	15	6.	Raf,	35	5.	
— Sylvestet,	15	6.	— (Blā)	35	8.	
— Sylvestris,	15	3.	— (Krofs)	35	6.	
Porte-corne,	16	1	Raguahut,	7	2.	
Portepyne,	20	1.	Rain-Deer,	12	8.	
Possum,	42	1.	Rainger,	12	8.	
Poulain,	14	1.	Ram,	10	1.	
Poutret,	36	10.	Rangifer,	12	8.	
Priguza,	3	1.	Rapitus,	39	13.	
Prolima,	31.		Raposa,	35	5.	
Pteropus,	30.		Rat,	26.		
Puant,	42	1.	—	26	3.	
Puerco,	15	1.	—	26	2.	
— Montes,	15	9.	D'Amérique,	26	6.	
— Sylvestre,	15	3.	— Blanc de Virginie,	26	7.	
Puerco-Espin,	20	1.	— De Bois,	26	3.	
Pufa,	33	1.	— D'eau,	26	11.	
Putois,	36	10.	— (Grand) des champs,	26	4.	
—	36	11.	— (Musk)	21	3.	
— Rayé,	36	11.	— Musqué,	21	3.	
Putorius,	36	10.	—	21	4.	
— Striatus,	36	11.	— Musqué de Canada,	21	4.	
Puzolo,	36	10.	— De Norvege,	26	8.	
			— Oriental,	26	10.	
			— Palmiste,	24	10.	
			— (Petit) des Champs,	26	12.	
			4.	— De Pharaon,	36	11.
			11.	— De Pont,	24	12.
			5.	— De Tartarie,	24	12.
			1.	Rato da casa,	26	1.
			6.	— Di casa,	26	1.
			3.	— Penago,	32	1.
			6.	Raton,	26	1.
			3.	— Pequenno,	25	2.
			3.	—	27	2.

Q.	G.	S.
Quachy,	38	4.
Quadrupes Bellonii,	26	11.
— Peregrina,	4	5.
— (Vultur)	34	1.
Quapizotl,	15	6.
Quasje,	37	3.
Quauhcoyamerl,	15	6.
Quauhtechallotl,	24	3.
— Thilicic,	24	3.

T r i j

Q.

Q	G.	S.	Uachy,	38	
Quadrupes Bellonii,	26	11.	— De Pont,	24	12.
— Peregrina,	4	5.	— De Tartarie,	24	12.
— (Vultur)	34	1.	Rato da casa,	26	1.
Quapixotl,	15	6.	— Di casa,	26	1.
Quasje,	37	3.	— Penago,	32	1.
Quauhcoyamecl,	15	6.	Raton,	26	1.
Quauhtechallotl,	24	3.	— Pequenno,	25	2.
— Thillic,	24	3.	—	27	2.

	G.	S.	G.	S.
Ratte,	16	1.	Ross,	14
— (Watter)	16	11.	Rotta, (Warn)	16
Rattus,	16	1.	Rouffette,	30.
— Americanus,	16	6.	—	30
— Aquaticus,	16	11.	— A col rouge,	10
— Aquatilis,	16	11.	— A longues oreilles,	10
— Domesticus,	16	1.	Rupicapra,	2
— (Vespertilio) Terna-			Ruyn,	14
tanus,	11	4.	Rys,	12
Ratz,	16	1.		
— (Wasser)	16	11.	S.	
Reddeer,	11	1.		
Reech,	12	1.	S Abbel,	18
Reechbock,	12	5.	Sabelmus,	11
Reechgeiß,	12	5.	Sable,	16
Reem,	16	1.	Sag,	11
Reen,	11	2.	Sagoin,	12 4
Rein,	12	8.	Sagouin,	12 4
Reinen,	12	8.	Sil-Hund,	11
Reinsdiar,	12	8.	Sanda Benamet,	16
Reinssthiar,	11	8.	Sangler,	11
Rell,	11	1.	— Appellé Pecaris,	11
Rellmuss,	11	1.	— Des <u>Indes Orientales</u> ,	11
Renard,	11	5.	— Du Mexique,	11
— Amériquin,	1	1.	Sapajou brun,	12 4
— Blanc,	11	8.	— Cornu,	12 4
— Croisé,	11	6.	— Jaune,	12 4
— Gris,	11	7.	— Noir,	12 4
Renfcheron,	11	8.	— A queue de Renard,	12 4
Reynier,	11	2.	Saphan,	11 4
Rhen,	11	2.	Sarigoy,	11
Rhenne,	11	2.	Sarn,	11
Rhinoceros,	16	1.	Sarna,	11
—	16	1.	Satherius,	16
Rhinocetote,	16	1.	Satyrus,	12 1
Rhinoceros,	16	1.	— Indicus,	12 1
Riccio,	28	2.	Saw,	11
Riche,	22	5.	Sealopes,	11
Rind,	11	1.	Schaaff,	10
Rizo,	28	1.	Schaaffs Arabie,	10
Roe-Deer,	11	1.	—	10
Ropoza,	41	1.	Schaah,	9
Rosmarus,	6	2.	Schaep,	10
— Vetus,	6	1.	Schanar,	12
Rosomacha,	34	1.	Schêr,	11

ALPHABETICUS.

G. ST. S.		333 G. ST. S.	
Schirmus,	41	1. Scropha,	15 1.
Schemikel,	29 1	1. Scurulus,	24 1.
Schelor,	7	1. Sczutek,	25 1.
Schildverken,	4	4. Sea-Calf,	33 1.
Schirato,	24	1. Seahorse,	6 1.
Schiratolo,	24	1. Seakow,	6 1.
Schirivolo,	24	1. Seal-Hund,	33 1.
Schor,	11	1. Sebey,	39 5.
Schual,	35	5. Seehond,	39 1.
Schunara,	39	1. See-Hund,	39 1.
Schwein,	15	1. Seekoejen,	6 2.
— (Dorn)	20	1. Semivulpa,	42 1.
— (Meer)	10	7. Seraphah,	8 1.
— (Stachel)	10	1. Sery,	27 1.
— (Wild)	15	3. Sefef,	34 1.
Schwyn,	15	1. Seüle, (Indisch)	23 7.
Sciurus,	24	Seuwle,	15 1.
—	24	1. Sezurez,	16 1.
— Albus Sibericus,	24	2. Sheepe,	10 1.
— Americanus,	24	5. Shrew,	27 1.
— Americanus volans,	24	12. — (Hardy)	27 1.
— Brasiliensis,	24	7. — Mouse,	27 1.
— Carolinensis,	24	9. Shymel,	7 1.
— Epilepticus,	25	1. Sigi,	33 1.
— Genulus,	24	11. Sjechaal,	35 3.
— Lysteri,	24	9. Sig,	35 1.
— Mexicanus,	24	3. Silenus,	3 2.
— Niger,	24	3. Sime,	29 1 1.
— Nova Hispania,	24	8. Simia,	29 1.
— Palmarum,	24	10. —	29 1 1.
— Petaurista volans,	24	11. —	29 1 1.
— Ponticus,	24	4. — Alba &c,	29 4 21.
— Rarissimus ex Nova		8. — Callitrix &c,	29 4 16.
Hispania,	24	— Caudata &c,	29 4.
— Schyticus,	24	4. —	29 5.
— Sibericus volans,	24	3. — Ceylonica,	29 1 5.
— Striatus,	24	9. — Cynocephala,	29 2.
— Varinus,	24	4. —	29 2 1.
— Virginianus,	24	6. — Cynocephala Ceylo-	
— Virginianus petaurif-		nica,	29 1 1.
ta,	24	14. — Ecaudata &c,	29 1 2.
— Virginianus volans,	24	14. —	29 2.
— Volans,	24	11. — Primus,	29 1 1.
— Vulgaris,	24	1. — Secundus,	29 1 1.
— Vulgaris rubicundus,	24	2. — Ourang-Outang,	29 1 2.

Tiiij

	G.	ST.	S.		G.	S.
— Perfonata ,	3	2.		Siyah-Ghush ,	39	13.
— Sciurus &c.,	31	1.		Skogsmus ,	24	1.
— Semicaudata &c.,	29	3	1.	Skop ,	25	3.
— Simpliciter dicta ,	29	1	1.	Skrzeczek ,	10	1.
Simiolus Ceylonicus ,	29	4	8.	Sleep rat ,	25	8.
Simius Callitrix ,	29	4	27.	Sleeper ,	25	2.
— Cynocephalus alter ,	29	3	1.	— (Greater)	25	3.
Singe ,	29.			Sobol ,	36	9.
—	29	1.		Soile ,	23	1.
—	29	1	7.	Sorce ,	25	2.
— Barbu ,	29	4	24.	Sorex ,	16	1.
— Barbu à queue de				—	16	2.
Lion ,	29	4	25.	—	27	1.
— Blanc à barbe noire ,	29	4	21.	—	26	5.
— De Ceylan ,	29	1	3.	— Americanus ,	42	8.
— Cynocéphale ,	29	2.		— Americanus major	26	11.
—	29	2	1.	&c.,	26	7.
— Cynocéphale de Cey-				— Aquaticus ,	21	3.
lan ,	29	2	2.	— Domesticus ,	21	3.
— (Grand) de la Co-				— Moscoviticus ,	25	2.
chinchine ,	29	4	18.	— Odoriferus ,	42	7.
— De Guinée ,	29	4	6.	— Flinii ,	26	2.
— De Guinée à barbe				— Sylvestris America-		
blanche ,	29	4	23.	nus ,	26	2.
— De Guinée à barbe				Sorgio di casa ,	26	17.
jaunâtre ,	29	4	19.	Sorgo Morgange ,	26	2.
— Lion ,	29	4	16.	Sorice ,	26	7.
— Musqué ,	29	4	7.	Sourco ,	26	2.
— Noir à barbe blan-				Souris ,	26	5.
che ,	29	4	22.	— D'Amérique ,	25	7.
— Noir d'Egypte ,	29	4	26.	Sow ,	35	7.
— (Petit) Lion ,	29	4	11.	Spaca ,	35	7.
— [Petit] du Mexi-				Span-Farle ,	32	1.
que ,	29	4	28.	Speckmauf ,	24	2.
— (Petit) Nègre ,	29	4	5.	Spiriofus ,	27	3.
— (Petit) de Para ,	29	4	12.	Spitzmuf ,	32	3.
— A queue de Lion ,	29	4	15.	Sportegliono ,	35	3.
— A queue de Rat ,	29	4	13.	Squillach ,	24	12.
— Rouge ,	29	4	20.	Squirrel , (Flying)	24	6.
— Rouge de Cayenne ,	29	4	20.	— (Great Grey Virginia)	24	1.
— Roux d'Egypte ,	29	4	27.	Squyrtell ,	24	5.
— Varié ,	29	4	9.	Srna ,	20	1.
— Verd ,	29	4	17.	Strachelschweyn ,	12	1.
Sion ,	5			Stagg ,	9	3.
Stifel ,	23		6.	Steinbock ,		

ALPHABETICUS.

335

	G.	S.	G.	ST. S.
Stein Marder,	36	7.	—	41 1.
Stier,	11	1.	Alba,	41 2.
Stoar,	36	2.	Alba Nostras,	41 2.
Strephicerus,	9	8.	Americana rufa,	41 5.
—	9	15.	Coloris albi,	41 2.
— Bellonii,	9	15.	Maculata, Oost-Fri-	
— Jo. Caii,	9	8.	— fia,	41 3.
— Plinii,	9	8.	Nigra Virginiana,	41 4.
— Zepherus,	9	8.	Nostras,	41 1.
Su,	15	1.	Nostras albi coloris,	41 2.
Suber,	11	6.	Rubra Americana,	41 5.
Suin, (Griff)	37	1.	Siberica aurea,	41 6.
Surck,	41	1.	Sibericus versicolor,	41 6.
Sus,	15.	—	Variegata,	41 3.
—	15	1.	Virginiana,	41 4.
— Agrestis,	15	3.	Virginianus niger,	41 4.
— Aquarius multiful-			Tamamaçame,	9 11.
— cns,	18	1.	Tamandua,	1 1.
— Chinenfis,	15	2.	Alba,	1 4.
— Domesticus,	15	1.	Americana minor,	1 2.
— Fetus,	15	3.	Guacu,	1 1.
— Guineensis,	15	4.	—	1 3.
— Maximus Palustris,	17	1.	I,	1 2.
— Sinenfis,	15	2.	—	1 3.
— Sylvaticus,	15	3.	Major,	1 1.
Sus,	14	1.	Minor cinerea,	1 2.
Susah,	14	1.	Minor flavescens,	1 4.
Susel,	23	6.	Miri,	1 2.
Susuatha,	14	1.	Tamanoir,	1 1.
Suw,	15	1.	Tamarind,	29 4 10.
Swin, [Tigg]	20	1.	Tamendua,	1 1.
— (Will)	15	3.	Tapeti,	21 7.
Swine, (Wild)	15	3.	Tapietete,	18 1.
Swinka Zamorska,	23	7.	Tapir,	18
Swiszez,	25	6.	—	18 1.
			Tapirus,	18
			—	18 1.
			Taran,	20 1.
			Tarandus,	12 8.
			Agricola & Eliotæ,	12 8.
			Tardigradus,	3.
			—	3 12
			—	29 1 3.
			—	29 2 2.
			Ceylonicus,	3 2.

	G.	S.	G.	ST. S.
Ach Marder,	36	7.	Taran,	20 1.
Tachs,	37	7.	Tarandus,	12 8.
Tai-Ibi,	42	1.	Agricola & Eliotæ,	12 8.
Tajacu,	15	6.	Tardigradus,	3.
Tajibi,	42	4.	—	3 12
Tailfon,	37	4.	—	29 1 3.
Talpa,	49.	1.	—	29 2 2.
			Ceylonicus,	3 2.

T.

T Ach Marder,
Tachs,
Tai-Ibi,
Tajacu,
Tajibi,
Taisfon,
Talpa,

G. S.
36 7.
37 1.
42 4.
15 6.
42 4.
37 1.
42

	G.	ST.	S.	G.	S.	
Tartarim,	22	5	1.	Taxus,	17	1.
Tafch,	17		1.	— <i>guillus</i> ,	18	6.
Tafso,	17		1.	Tchorz,	16	10.
Taffus,	17		1.	Temamagame,	2	17.
Tafugo,	17		1.	Tenlic,	15	6.
Tatoc,	1		1.	Tepe Maxdaron,	12	1.
Tatou,	4		2	Ternera,	11	1.
—	4		4.	Texon,	17	1.
—	4		6.	Thaal,	15	5.
— Kabassou,	4		5.	Thabia,	2	6.
<u>Tatu</u> ,	4		2.	—	12	5.
—	4		4.	Thabin,	2	6.
—	4		6.	—	12	5.
— Africanus,	4		7.	Thaleb,	15	5.
— Apara,	4		2.	Thapfa,	22	4.
—	4		7.	Thilicic, (Quauhrech-		
— Caninus,	4		7.	lotl)	24	1.
— Ecé,	4		5.	Thor,	11	1.
— Mustelinus,	2		1.	Thur,	11	1.
—	4		1.	Tiger,	12	6.
— Orientalis,	4		1.	Tigerthier,	12	6.
— Pilofus,	23		7.	Tigra,	12	6.
— Forcius,	4		2.	Tigre,	12	6.
—	4		6.	—	12	2.
Tatupeba,	4		4.	—	19	11.
Tarus,	4		2.	— D'Amérique,	12	2.
—	4		5.	— Barbet,	12	10.
— Major,	4		5.	— (Espece de)	12	2.
Taupe,	41.		5.	— Frisé,	19	10.
—	41		1.	— De la grande espece,	12	7.
— Blanche,	41		2.	— [Gros] de la <u>Guiane</u> ,	12	3.
— Dorée de Sibirie,	41		6.	— [Loup]	12	10.
— Rouge d'Amérique,	41		5.	— Noir,	19	2.
— Varice,	41		3.	— Rouge,	12	11.
— De Virginie,	41		4.	— Royal,	12	7.
Taur,	11		1.	Tigris,	12	6.
Taureau,	11		1.	— Americana,	12	8.
Taurus,	11		1.	— Crispa,	12	10.
— Domesticus,	11		1.	— Cuguacuarana,	12	11.
— Ferus,	11		6.	— Fulva,	12	11.
— Mexicanus,	11		7.	— Fulvus,	12	11.
— Quiviræ Provincie,	11		7.	— Jaguarete,	12	2.
— Quiviræ Regionis,	11		7.	— Mexicanus,	12	2.
— Quivirensis,	11		7.	— Nigra,	12	2.
Taxo,	17		1.	— Regia,	12	7.

T⁷⁷rs,

	G.	S.	V.	G.	S.
T ^{ypus} ,	39	6.			
Tittlein,	9	1.			
Tlacuarzin spinosum,	10	2.			
Tlacoocelotl,	39	13.	V	11	1.
Tlalocelotl,	39	13.	V	11	1.
Tlaquatzin,	42	1.	— Marina,	6	2.
—	42	4.	Vache,	11	1.
Tlartlahqui ocelotl,	39	8	— Marine,	6	
Tlilocoteqvillin,	24	3.	—	6	1.
Topinara,	41	1.	Vare,	24	4.
Topo,	26	2.	Varia,	39	12.
—	41	1.	Varius,	24	4.
Toporagno,	27	1.	Varoza,	25	7.
Tora,	11	1.	Varus,	24	4.
Torata,	11	1.	Veau,	11	1.
Toro,	11	1.	— Marin,	33	1.
Tragelaphus,	9	12.	— De mer,	33	1.
—	12	2.	Vebar,	22	4.
— Bellonii,	9	12.	Vech,	24	4.
T ^{ypus} ,	9	1.	Vechio Marino,	33	1.
—	9	3.	Veldrate,	23	8.
Tragulus,	13.		Verdadeiro,	4	5.
— Africanus,	13	1.	Verrat,	15	1.
—	13	4.	Verres,	15	1.
— Guineensis,	13	2.	— Sylvaticus,	15	3.
— Indicus,	13	1.	Verto,	15	1.
— Mazame,	9	14.	Vervez,	10	1.
— Pergracilis Africanus,	13	1.	— Alius peregrinus,	7	4.
— Surinamensis,	13	3.	Vespertilio,	32.	
— Tensamaçama,	9	11.	—	32	1.
Tragus Bezaarricus,	9	9.	—	32	3.
— Bifulcorum mixtus,	8	1.	— Americanus,	32	5.
— Capra sylvestris Afri-			—	32	6.
cana Grimmii,	13	4.	— Americanus rufus,	32	5.
— Domesticus,	9	1.	— Americanus vulgaris,	32	6.
— Dorcas,	9	6.	Auricularis binis,	32	1.
— Moschiferus,	13	5.	Auricularis quaternis,	32	3.
— Strepficeros,	9	8.	— Borhippe,	30	1.
Trichechus,	6	2.	— Caro similis America-		
Troiara,	15	1.	nos,	31	5.
Truye,	15	7.	— Cauda nulla,	30	1.
Tuabba,	16	1.	— Caudatus &c,	32.	
Tup,	10	7.	— Cynocephalus ex		
Tur,	11	3.	Nova Hispania,	30	3.
Tzwijerzatko,	28	1.	— Cynocephalus Terna-		

	G.	ST.	S.		G.	ST.	S.
tanus,	<u>10</u>			Utter,	<u>49</u>		<u>1</u>
— Ingens,	<u>10</u>			1. Vuelblud,	<u>7</u>		<u>1</u>
— Major,	<u>12</u>			1. Vulpecula Americana,	<u>17</u>		<u>1</u>
— Major Ternatanus	<u>12</u>			— Quæ Mayzium torre-			
— Minor,	<u>12</u>			factum æmulatur,	<u>17</u>		<u>3</u>
— Minor Ternatanus,	<u>12</u>			Vulpes,	<u>11</u>		<u>1</u>
— Rattus Ternatanus,	<u>12</u>			— Alba,	<u>11</u>		<u>1</u>
— Ternatanus,	<u>12</u>			— Albus,	<u>11</u>		<u>1</u>
— Ternatanus auriculis				— Americana, <i>Mapach</i>			
simplicibus,	<u>12</u>			dicta,	<u>18</u>		<u>4</u>
— Vulgaris,	<u>12</u>			— Campestris,	<u>11</u>		<u>1</u>
— Vulgaris auriculis du-				— Cinerea,	<u>11</u>		<u>2</u>
plicibus,	<u>12</u>			— Cinereus America-			
Vigogne,	<u>7</u>			nus,	<u>11</u>		<u>7</u>
Vilfras,	<u>14</u>			— Cærulefcens,	<u>11</u>		<u>1</u>
Vilpistrello,	<u>14</u>			— Cruciatuſ,	<u>11</u>		<u>6</u>
Vir fylvarum,	<u>22</u>			— Crucigera,	<u>11</u>		<u>6</u>
Vifon,	<u>16</u>			— Fulvus,	<u>11</u>		<u>1</u>
Virello,	<u>11</u>			— Indica, <i>Itquepotl</i>			
Vitulus,	<u>11</u>			dicta,	<u>17</u>		<u>1</u>
— Marinus,	<u>12</u>			— Major Puroria &c,	<u>12</u>		<u>1</u>
Viverra,	<u>16</u>			— Minor &c,	<u>18</u>		<u>6</u>
— Fermina,	<u>16</u>			— Vulgaris,	<u>11</u>		<u>1</u>
— Javanica,	<u>16</u>			Vulpi affinis America-			
— Indica,	<u>16</u>			na,	<u>18</u>		<u>4</u>
— Mas,	<u>11</u>			3. Vultur Quadrupes,	<u>14</u>		<u>1</u>
Ulf,	<u>11</u>			Vydra,	<u>16</u>		<u>10</u>
Ulk,	<u>16</u>						
Umbulu,	<u>1</u>						
Unau,	<u>1</u>						
Volpe,	<u>11</u>						
Vorator, [Magnus],	<u>14</u>						
Vos,	<u>11</u>						
Urchin,	<u>18</u>						
Urochs,	<u>11</u>						
Uros,	<u>11</u>						
Uria fornicatua,	<u>1</u>						
Urfus,	<u>18</u>						
—	<u>18</u>						
— Albus,	<u>18</u>						
— Cauda abrupta,	<u>18</u>						
— Cauda elongata,	<u>18</u>						
— Formicarius,	<u>1</u>						
— Freti Hudſonis,	<u>18</u>						
Urus,	<u>11</u>						

W

Ald-Ezel,	<u>14</u>		<u>1</u>
Walros,	<u>6</u>		<u>1</u>
Walrus,	<u>6</u>		<u>1</u>
Wanduru,	<u>22</u>		<u>22</u>
Wanr,	<u>41</u>		<u>1</u>
Warg,	<u>11</u>		<u>2</u>
Warglo,	<u>12</u>		<u>12</u>
Wasser-Mufz,	<u>16</u>		<u>11</u>
— Ratz,	<u>16</u>		<u>11</u>
Watr-Rotta,	<u>26</u>		<u>11</u>
Watter-Ratte,	<u>26</u>		<u>11</u>
Weafel,	<u>16</u>		<u>1</u>
Weefel,	<u>16</u>		<u>1</u>
Weprz,	<u>11</u>		<u>1</u>
Wetck, [Gran]	<u>24</u>		<u>4</u>
Wella,	<u>16</u>		<u>1</u>

G. ST. S.

	<u>14</u>		<u>1</u>
	<u>6</u>		<u>1</u>
	<u>6</u>		<u>1</u>
	<u>22</u>		<u>22</u>
	<u>41</u>		<u>1</u>
	<u>11</u>		<u>2</u>
	<u>12</u>		<u>12</u>
	<u>16</u>		<u>11</u>
	<u>16</u>		<u>11</u>
	<u>26</u>		<u>11</u>
	<u>26</u>		<u>11</u>
	<u>16</u>		<u>1</u>
	<u>16</u>		<u>1</u>
	<u>11</u>		<u>1</u>
	<u>24</u>		<u>4</u>
	<u>16</u>		<u>1</u>

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Wewer,	38	1.	Yferen-vereken,	28	1.
Wewerka,	24	1.	Yr'p't,	10	1.
Wider,	10	1.	Ytembo,	5	1.
Wieprz,	15	1.	Yzard,	9	6.
— Lefny,	15	3.	Yzquiepatl,	37	1.
Wiewiorka Lataiaca,	24	12.			
Wild-Afs,	14	5.	Z.		
— Boar,	15	3.		G.	S.
— Gheir,	9	3.	Z Abo,	34	1.
— Goore,	9	6.	Z Zagicz,	21	1.
— Marder,	36	8.	Zaiac,	21	1.
— Schwein,	15	3.	Zainq,	15	6.
— Swine,	15	3.	Zainus,	15	6.
Wildo-Buffel,	11	8.	Zamer,	8	1.
— Katze,	39	1.	Zbik,	37	1.
Wilk,	35	2.	—	39	2.
Will-Katt,	39	13.	Zebati,	16	1.
— Swin,	15	3.	Zebi,	9	6.
Wifele,	36	1.	—	12	5.
Wifelin, (Wyfs)	36	2.	Zebiah,	12	5.
Wifent,	11	6.	Zebra,	14	2.
Wlk,	35	2.	— Indica,	14	2.
Wol,	11	1.	Zébre,	14	2.
Wolf,	35	2.	Zeeb,	35	2.
Wolff,	35	2.	Zeebah,	35	2.
— (Meer).	33	1.	Zeehundr,	33	1.
Wolverenne,	38	3.	Ziber,	37	4.
Wot-dziki,	11	5.	Zibethica,	37	4.
Wul,	11	1.	Ziemuy,	28	1.
Wurff, (Maul)	42	1.	Ziefel,	23	6.
Wydra,	40	1.	Zijm,	39	2.
Wyewyorka,	24	1.	Zilio-Hyzna,	34	1.
Wyfs Wifelin,	36	2.	Zobel,	36	9.
			Zon,	10	1.
X.			Zoneh,	10	1.
X Imio,	G. ST.	S.	Zorlito,	12	5.
Xololitzcuintli,	29	1.	Zuber,	11	6.
	35	4.	Zubr,	11	3.
Y.			Zurnapa,	8	1.
Y Bfch,	G.	S.	Zyfel,	23	6.
Y r',	9	3.			
	15	1.			



V u i j

C L A S S E II.

LES CETACÉES.

C L A S S I S II.

CETACEA.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

1901

CATALOGUS AUTHORUM.

- ALDRO. Pife.**... Ulissi Aldrovandi Philosophi & Medici Bononiensis, de Piscibus Libri V, & de Cetis, Liber I. &c. Bononiz 1638, in-folio.
- Art. Descri. Pife.**... Petri Artedi Sueci descriptiones specierum Piscium, quos vivos præsertim dilexit, & examinavit, inter quos primario Pifces regni Sueciz, &c. Ichthyologiz pars V. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.
- Art. Gen. Pife.**... Petri Artedi Sueci genera Piscium, in quibus systema totum Ichthyologiz proponitur, cum Classibus, Ordinibus, Generum Characteribus, specierum differentis, observationibus plurimis, &c. Ichthyologiz pars III. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.
- Art. Synon. Pife.**... Petri Artedi Angermannia-Sueci synonymia nominum Piscium ferè omnium, in qua recentio fit nominum Piscium omnino faciliè Authorum, qui unquam de Piscibus scripsere : uti Græcorum, &c. Ichthyologiz pars IV. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.
- Bell. Aquat.**... Petri Bellouii Cenomani de Aquatilibus libri duo, &c. Parisiis 1553, in-octavo oblong.
- Bell. des Poif.**... La nature & diversité des Poissons, avec leurs portraits représentés au plus près du naturel, par Pierre Bellon du Mans. A Paris 1555, in-octavo oblong.
- Charlet. Exer.**... Gualteri Charletoni exercitationes, Piscium differentiz & nomina. Oxoniz 1677, in-folio.
- Clus. E. et.**... Caroli Clusii Attebatis, Aulæ Cæsareæ quondam familiaris, Exoticorum libri decem, &c. Raphelengii 1605, in-folio.
- Euf. Nieremb.**... Joannis Eusebii Nierembergi Madritensis, ex Societate Jesu, in Academia Regia Madritensi Philosophiæ Professoris, Historia Naturæ maximæ peregrinæ, libris XVI. distincta, Antwerpiz 1635, in-folio.
- Faun. Suec. Linn.**... Caroli Linnæi Medici & Boræ. Prof. Upsal, &c. Fauna Suecica, sistens Animalia Sueciz Regni, &c. Stockholmiz 1746, in-octavo.
- Gesn. Icon. Aquat.**... Icones Animalium aquatillum in mari & dulcibus aquis degentium Tiguti 1560, in-folio.
- Gesn. Pife.**... Conradi Gesneri Medici Tigurini Historiæ Animalium liber IV. qui est de Piscium & aquatillum animantium naturæ, Tiguri 1558, in-folio.
- Hist. de l'A. ad.**... Histoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris, in-quarto.
- Hist. d'Is. & d: Gro.**... Histoire Naturelle de l'Islande, du Groënland, du détroit de Davis, & d'autres pays situés sous le Nord ; traduite de l'Allemand, par M. Anderson, &c. A Paris 1750, in-douze.
- Jonst. Pife.**... Historiæ Naturalis de Piscibus & Cetis, libri V, cum æneis figuris, Johanes Jonstonus Medicæ Doctor, Amstelodami 1657, in folio.
- Klein. Pife. Mif.**... Jacobi Theodori Klein Historiæ Piscium Naturalis promouendæ Milna secundus, de Piscibus per pulmones spirantibus, &c. Gedanè 1741, in-quarto.
- Linn. Syst. Nat. ed. 6.**... Caroli Linnæi Archiatri, Reg. Med. & Bot. Profess. Upsal, Systema Naturæ, sistens regna tria naturæ, in classes & ordines, genera & species redacta, Tabulisque æneis illustrata Editio sexta, emendata & aucta, Stockholmiz 1748, in-octavo.
- Mus. Worm.**... Museum Wormianum, seu Historia rerum rariorum, tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm, Med. Doct. &c. Amstelodami 1655, in-folio.
- Raj. Syn. Pife.**... Joannis Raji Synopsis Methodica Piscium, Londini 1713, in-octavo.

Rondel. Pife. . . . Guillelmi Rondeletii Doctoris Medici & Medicinæ in Schola Monspeliensis Professoris Regii, libri de Piscibus marinis, Lugduni 1554. in-folio.
Sibbald. Obs. . . . Phalainologia nova, sive Observationes de rarioribus quibusdam Balanis in Scotia litras nuper ejectis, &c. Edinburgii 1692. in-quarto.
Will. Hist. Pife. . . . Francisci Willughbei Armig. de Historia Piscium libri quatuor, jussu & sumptibus Societatis Regiæ Londinensæ, editi, &c. Oxonii 1686. in-folio.



CLASSIS II.



CLASSIS II.

CLASSE II.

CETACEA.

LES CETACÉES.



ORUM character est
Corpus nudum ,
elongatum :
Pinnae carnosae :



EUR caractere est
D'avoir le corps nud,
& allongé :
Des nageoires char-

nues :

Cauda horizontaliter plana.

Et la queue platte horizontale-
ment.

Omnia hujus Classis Animalia in mari perpetuò degunt ; nec unquam spontè , & absquè vitæ periculo , in siccum exeunt. Hæc , QUADRUPEDUM modo , duos habent in corde *ventriculos* ; *pulmonibus* spirant ; coeunt , vivos foetus pariunt , eosque lacte alunt. Partium deniquè omnium internarum structurâ & usu cum illis conveniunt. Omnia fistulâ unâ , vel fistulis duobus , per quas aquam rejiciunt & efflant , in capite vel rostro donantur.

Alia sunt edentula : alia verò dentata. Edentula maxillam superiorem habent laminis corneis utrinque instructam ; quæ laminæ corneæ

Tous les Animaux de cette Classe vivent toujours dans la mer ; & ils n'en sortent jamais d'eux-mêmes , & sans risque de leur vie. Comme les QUADRUPÈDES , ils ont deux *ventricules* au cœur ; respirent par des *poumons* ; s'accouplent , font leurs petits vivants , & les *allaitent*. Ils leurs ressemblent encore par la structure & l'usage de toutes leurs parties intérieures. Ils ont tous par-dessus la tête ou le museau , un ou deux canaux , par lesquels ils rejettent l'eau.

Les uns n'ont point de dents : les autres en sont munis. Ceux qui n'ont point de dents , ont la mâchoire supérieure garnie des deux côtés de lames de corne ,

XX

qui s'ajustent obliquement dans l'inférieure, comme la *Baleine*. Ceux qui ont des dents, ou n'en ont qu'à la mâchoire inférieure seulement, comme le *Cachalot*; ou n'en ont qu'à la mâchoire supérieure, comme le *Narhval*; ou en ont aux deux mâchoires, comme le *Souffleur*, le *Dauphin*, &c.

Ils se divisent en quatre Ordres.

Dans le premier sont compris ceux qui n'ont point de dents.

Dans le second, ceux qui ont des dents à la mâchoire inférieure seulement.

Dans le troisième, ceux qui ont des dents à la mâchoire supérieure seulement.

Et dans le quatrième, ceux qui ont des dents aux deux mâchoires.

in maxillâ inferiore oblique includuntur, ut *Balena*. Dentata dentes habent vel in maxillâ inferiore tantum, ut *Cetus*; vel in maxillâ superiore tantum, ut *Ceratodon*; vel in maxillâ utraque, ut *Physeter*, *Delphinus*, &c.

In quatuor Ordines dividuntur.

In primo Ordine continentur ea quæ sunt edentula.

In secundo, ea quæ sunt dentata in maxillâ inferiore tantum.

In tertio, ea quæ sunt dentata in maxillâ superiore tantum.

In quarto denique, ea quæ sunt dentata in utraque maxillâ.

Table méthodique des Cetacées.

Tabula Synoptica Cetaceorum.

Les Cetacées ou
 { N'ont point de dents... La
 Baleine. 1... Ordre I.
 { Ont des dents,
 { A la mâchoire inférieure seu-
 lement... Le *Cachalot*. 2...
 Ordre. II.
 { A la mâchoire supérieure
 seulement... Le *Narhval*.
 3... Ordre III.
 { Aux deux mâchoires... Le
 Dauphin. 4... Ordre IV.

Cetacea sunt, vel
 { Edentula... *Balena*. 1...
 Ordo I.
 { Dentata,
 { In maxillâ inferiore tan-
 tum... *Cetus*. 2... Or-
 do II.
 { In maxillâ superiore tan-
 tum... *Ceratodon*. 3...
 Ordo III.
 { In maxillâ utraque...
 Delphinus. 4... Ordo IV.



ORDO I.
CETACEA
edentula.

UNICO Genere, *Balaena* scilicet, hic Ordo constituitur.

I.

Genus *Balæna*.

Hujus character est
Dentes nulli ;
Maxillâ superior laminis cor-
neis utrinque instructa.

Obs. Hujus Generis specierum
aliæ binas tantum habent pinnas
laterales, utrinque unam ; aliæ,
præter istas laterales, tertiam ha-
bent in dorso pinnam.

ORDRE I.
LES CETACÉES

Qui n'ont point de dents.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un
seul Genre, sçavoir celui de
la Baleine.

I.

Le Genre de la Baleine.

Son caractère est
De n'avoir point de dents :
D'avoir la mâchoire supérieure
garnie des deux côtés de la-
mes de corne.

Obs. Parmi les espèces de ce Genre,
les unes n'ont que deux nageoires la-
téales, sçavoir une de chaque côté ;
& les autres, outre ces deux latérales,
en ont une troisième sur le dos.

1. LA BALEINE ORDINAIRE DE GROENLAND.

Balæna bipinnis, in dorso nigricans, in ventre alba, dorso le-
vi... *BALÆNA VULGARIS GROENLANDICA*.

Balæna vulgaris edentula dorso non pinnato. *Raj. Syn. Pisc. p. 6. A. 1.*
Balæna major laminas corneas in superiore maxillâ habens, fistulâ donata,
bipinnis. *Raj. Syn. Pisc. p. 16. 7.*
Sibbald. Obs. p. 28.

Balæna fistula in medio capite, dorso caudam versus tuminata. *Art.*
Gen. Pisc. g. 48. sp. 1.

Art. Synon. Pifc. g. 48. fp. 1.

Art. Defcr. Pifc. g. 48. fp. 1.

Fauv. Succ. Linn. No. 264.

Balæna fistula in medio capite, dorso caudam versùs acuminato, Mysticerus Linn. syst. nat. ed. 6. g. 99. *fp. 1.*

Balæna vera Zorodragori. Klein. *Pifc. Misf. 2. p. 11. 1.*

Balæna Rondeletii, Gesneri & aliorum. Will. *Hist. Pifc. p. 35.*

Balæna vulgò dicta, sive Mykicetus Aristotelis, Musculus Plinii. Gesn. *Pifc. Fig. p. 132. (Fig. mala).*

Balæna vulgò dicta, sive Musculus. Rondel. *Pifc. Fig. p. 475. (Fig. ut suprà).*

Balæna vulgò dicta. Gesn. Icon. *Aquat. Fig. p. 167. (Fig. eadem).*

Balæna vulgi. Aldrov. *Pifc. p. 688. Fig. p. 732. (Fig. eadem).*

Jonst. Pifc. p. 152.

Mus. Worm. p. 281.

Balæna vulgaris. Charlet. *Exer. p. 46.*

Baleine de Groenland, *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. p. 198; & Tom. II. p. 78. Fig. p. 168. (Fig. bonne).*

Les Espagnols l'appellent VALLENA. Gesn.

Les Italiens, BALENA; VALENA. Gesn.

Les Allemands, WAL; WALLBESCH; WALLER. Gesn.

Les Suédois, GROENLANDS HWALFISKEN. *Art. GR. NLANDS-WALFISK. Linn.*

Les Danois, SLICHTEBACK, ou SANDHUAL. *Hist. d'Isl.*

Les Groënlandois, ARBACH. *Hist. d'Isl.*

Les Islandois, SLITBARK. *Hist. d'Isl.*

Les autres Habitans du Nord, SLITBAKKER. *Hist. d'Isl.*

Les Anglois, WHALE, ou GREENLANDS-WHALE. *Art. Will.*

La Baleine est le plus grand des Animaux. Elle a ordinairement 70 pieds de long. (Jean Faber dit qu'il y en a qui vont jusqu'à 100 pieds*). Sa tête seule occupe le tiers de sa longueur. Elle n'a point de dents; mais la mâchoire supérieure est garnie des deux côtés de lames de corne qui s'ajustent obliquement dans l'inférieure, comme dans un fourreau, qui pour cela est beaucoup plus large que la supérieure. Les lames de corne de devant & de derrière sont les plus

Omnium Animalium maxima est Balæna. 70 pedum longitudinem communiter attingit. (Secundum Joannem Fabrum sunt quæ 100 pedes longitudine adæquant*). Caput maximum est, siquidem tertiam totius animalis longitudinis partem obtinet. Dentibus omninò caret; sed eorum loco, in maxillâ superiore tantum utrinque sunt lamine corneæ, quæ in maxillâ inferiore, sicut in vaginâ, obliquè includuntur: quæ

* Raj. Syn. Pisc. p. 6.

* Raj. Syn. Pisc. p. 6.

obrem maxillam inferiorem superiore multò latiore habet. Laminæ autem illæ cornæ in anteriore oris parte, itemque in posteriore, breviores sunt, in mediâ longilimæ, ut interdum 8 vel 10 pedum longitudinem adæquent. Laminæ etiam illæ tenuiore sui parte, secundum earum longitudinem, appendicibus, fetarum *Porcinarum* æmulis, augmentur. Oculos habet oculis *Bovinis* non multò majores, & suprà oris angulos collocatos. Auriculæ ei nullæ; sed, cuticulâ capitis detractâ, post & infrà oculum macula inspicitur nigra, coque in loco meatus auditorius. In parte capitis superiore, suprà oculos, eminentia est quædam, è quâ hinc inde exeunt fistulæ, quibus aquam rejicit & efflat. Linguam habet maximam, substantiæ mollis & spongiosæ, maxillæ inferiori firmiter adnexam, albicantem, & ad margines maculis nigris ornatam. Pinna nulla est in dorso; binas tantum habet laterales (utrinque unam) post & paulò infrà oris angulos sitas, ossibus intus firmatas, quæ *humanae manus* modo in digitos expanduntur. Pinnae illæ 10 circiter pedes longæ sunt, & 3 latæ; quæ latitudo, versus ex-

courtes; & celles du milieu les plus longues : ces dernières ont jusqu'à 8 ou 10 pieds de long. Toutes ces lames de corne sont garnies dans toute leur longueur, du côté de leur tranchant, d'appendices qui ressemblent à des poils de *Sanglier*. Ses yeux, qui ne sont gueres plus grands que ceux d'un *Bœuf*, sont placés au-dessus des angles de la bouche. Elle n'a point d'oreilles; mais lorsqu'on a ôté l'épiderme de la tête, on découvre derrière l'œil & un peu plus bas une tache noire, & dans ce même endroit un conduit, par lequel le son pénètre jusqu'au tympan. Elle a sur la tête, & au-dessus des yeux, une éminence, de chaque côté de laquelle est un canal, par lequel elle rejette l'eau. Sa langue est très grande, d'une substance molle & spongieuse, fermement attachée à la mâchoire inférieure, blanchâtre, & marquée vers ses bords de taches noires. Elle n'a point de nageoires sur le dos: elle en a seulement une de chaque côté, située derrière, & un peu au-dessous des angles de la bouche, & soutenue intérieurement par des os, qui imitent ceux des doigts de la main de l'homme. Ces nageoires ont environ 10 pieds de long, & 3 de larges; & cette largeur diminue à mesure qu'elle s'éloigne du corps. Sa queue qui est plat-

te horizontalement , est l'arge d'environ 20 pieds. Sa peau est lisse & noirâtre sur le dos , & marbrée en certains endroits de blanc & de jaune , surtout sur les nageoires , & sur la queue. Le ventre est blanc. Le mâle a une verge qui a 6 pieds de long , & 7 à 8 pouces de diamètre , & qui se termine en une pointe d'un pouce de diamètre. Il la porte ordinairement au dedans du corps , où elle est cachée comme dans un fourreau. La partie de la génération de la femelle est semblable à celle des *Quadrupedes* , & est ordinairement fermée. La femelle a aussi au bas du ventre 2 mamelles , qui , lorsqu'elle a des petits , ont 6 ou 8 pouces d'épaisseur , sur 10 ou 12 de diamètre. On la trouve dans la *Mer du Nord*.

tremin procedendo , minuitur. Cauda horizontaliter plana est , & 20 circiter pedes lata. Cutis levissima , in ventre alba , in dorso nigricans , & quibusdam in locis , præsertim in pinnis & caudâ , ex albo & flavo , marmoris in modum , variegata. Mas penem habet 6 pedes longum , cujus diameter 7 aut 8 pollices attingit , quique in acumen diametri unius pollicis desinit. Penis iste in corpore sub cute , sicut in vaginâ , includitur. Fœmina vulvam habet vulvis *Quadrupedum* similem , cujus orificium communiter clausum est ; & in imo ventre mammas duas , quarum dum pulli lacte aluntur , 6 aut 8 pollices crassæ sunt , earumque diameter 10 aut 12 pollices æquat. Habitat in *Mari Septentrionali*.

2. LA BALEINE D'ISLANDE.

Balæna bipinnis , ex nigro candicans , dorso levi. **BALÆNA ISLANDICA.**

Balæna Glacialis. Klein. Pisc. Mis. 1. p. 12. 3.
Nord-Caper. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. 1. p. 199. & Tom. 11. p. 91.

Elle ressemble par sa figure à la précédente : elle en diffère seulement parce qu'elle a la tête & les lames de corne , qui garnissent la mâchoire supérieure , beaucoup plus petites , & le corps

Figurâ suâ præcedentem æmulatur : ab eâ tantum differt corpore graciliore , & capite & laminis cornis , maxillæ superiori affixis , multò minoribus. Cutem ha-

LES CETACÉES, Classe II. Ordre I. 351

bet levem, & ex nigro candidantem. *Harengis* vescitur. Habitat in mari, circa *Norvegiam*, & *Islandiam*. plus mince. Sa peau est lisse, & d'un noir qui tire un peu sur le blanchâtre. Elle se nourrit de *Harengs*. On la trouve sur les côtes de *Norvege* & d'*Islande*.

3. LA BALEINE DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

Balæna bipinnis, unico in dorso gibbo... *BALÆNA NOVÆ ANGLIÆ*.

Balæna gibbo unico propè caudam. *Klein. Pisc. Mif. 2. p. 12. 1.*

Pflockfisch. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 101.

Les Anglois l'appellent BUNCH, ou HUMP-BACK-WHALE. Klein. Hist. d'Isl.

A *Balæna Groenlandica* Elle differe de la *Baleine de*
differt gibbo suo in dorso, *Groënland* parce qu'elle a sur le
versus caudam, sito, unius dos, vers la queue, une espece
pedis altitudine & capitis de bosse, qui a un pied de haut
humani crassitie. Binas habet & l'épaisseur de la tête d'un
pinna laterales (utrinque homme. Elle a deux nageoires,
unam) in medio ferè corpore une de chaque côté, placées
sitas, 18 pedes longas, & presque au milieu du corps. Ces
candidissimas. Habitat in mari nageoires ont chacune 18 pieds
circa *Novam Angliam*. de long, & sont fort blanches.
On la trouve sur les côtes de la
Nouvelle Angleterre.

4. LA BALEINE A SIX BOSSES.

Balæna bipinnis, sex in dorso gibbis.

Balæna gibbis vel nodis sex. *Klein. Pisc. Mif. 2. p. 13. 2.*

Knoten-Fisch, ou Knobel-Fisch. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 102.

Les Anglois l'appellent SCRAO-WHALE. Klein. Hist. d'Isl.

Figurâ suâ *Balænam Groen-* Elle ressemble par sa figure à
landicam imitatur: ab eâ tantum differt quod laminas habet
corneas albas, sexque in la *Baleine de Groënland*: elle en
dorso gibbos. differe seulement parce que ses
lames de corne sont blanches;
& qu'elle a six bosses sur le dos.

5. LE GIBBAR.

Balæna tripinnis, ventre levi.

Balæna edentula corpore strictiore, dorso pinnato. *Raj. Syn. Pisc. p. 9. 1. Klein. Pisc. Mif. 2. p. 13. 1. a.*

Balæna fistula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorso. *Art. Gesh. Pisc. g. 48. sp. 2.*

Art. Synon. Pisc. g. 48. sp. 2.

Faun. Suec. Linn. No. 265.

Balæna fistula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorso. *Physalus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 99. sp. 2.*

Balæna vera. Rondet. Pisc. Fig. p. 482. (Fig. mala).

Balæna vera Rondetii. Gesh. Pisc. Fig. p. 135. (Fig. ut supra).

Gen. Icon. Aquat. Fig. p. 166. (Fig. eadem).

Aldro. Pisc. Fig. p. 677. (Fig. eadem).

Balæna vera Rondetii, Gesh. Will. Hist. Pisc. p. 33.

Physeter veterum. Raj. Art.

Gibbar, ou *Finisch. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 92. Fig. p. 188. (Fig. bonne).*

Les Xaintongeois l'appellent GIBBAR. Rondet. Gesh. Hist. d'Isl.

Les Grecs, γιδνα. Gesh.

Les Suédois, FINN-FISK. Linn.

Les Anglois, FINNISH. Raj. Art. FINBAK-WHALE. Klein.

Sa longueur est égale à celle de la Baleine de Groënland; mais sa grosseur est beaucoup moindre, & son corps plus effilé. Il en diffère encore plus parce qu'il a sur le dos, vers la queue, une nageoire droite & pointue, de 3 ou 4 pieds de long: celles des côtés ont 6 ou 7 pieds. Il a sur la tête un double canal, par lequel il rejette l'eau avec violence. Ses lames de corne sont plus courtes que celles de la Baleine de Groënland, & de couleur bleue. Sa peau est lisse, & brune sur le dos & blanche sur le ventre. Sa queue est beaucoup plus

Balæna Groenlandica longitudine par est; verum crassitie multo minor, & corpus ipsius gracilius est. Ab eâ facilius adhuc dignoscitur ex pinnâ rectâ & acutâ, 3 aut 4 pedes longâ, dorso innascentē non longē à caudâ. Pinnæ laterales 6 aut 7 pedes longæ sunt. In parte capitis superiore duplex est fistula, per quam vehementer aquam rejicit & efflat. Maxillæ superiori innascuntur laminæ cornæ quàm in *Balæna Groenlandica* breviores, & coloris cœrulei. Cutis ei levis est, in dorso

LES CETACÉES, Classe II. Ordre I. 353

dorso fusca, in ventre alba. grande que celle de la Baleine
Oris rictum habet multò am- ordinaire. Il se nourrit de Ha-
plioiorem quam Balena vulga- rens, de Maqueraux, & d'au-
ris. Harengis, Scombris, aliis- tres Poissons. On le trouve fré-
que Piscibus vescitur. In In- quemment dans l'Inde & dans
diâ & Novo Orbe frequens. le Nouveau Monde.

6. LA BALEINE A MUSEAU ROND.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro rotundo.

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam, & superiore multò
latiorem habens. *Rej. Syn. Pisc. p. 17. 9.*

Sibbald. Obs. p. 33. Fig. T. 3. (Fig. sat bona).

Balæna fistula duplici in fronte, maxillâ inferiore multò latiore. *Art. Gen.
Pisc. g. 48. sp. 4.*

Art. Synon. Pisc. g. 48. sp. 4.

Linn. syst. nat. ed. 6. g. 99. sp. 3.

Balæna Bellonii. *Aldro. Pisc. Fig. p. 676. (Fig. mala).*

Balæna. *Bell. Aquat. p. 4. Fig. p. 6. (Fig. ut supra).*

Balæne. *Bell. des Poiss. p. 4. Fig. p. 5. (Fig. mauv.)*

Illius, cujus descriptionem
dedit Sibbaldus, longitudo 78
pedes æquat: ambitus corpo-
ris 35 pedes superat. Maxilla
inferior multò latior est &
amplior superiore, figura
semicircularis, & 13 pedes
cùm 2 $\frac{1}{2}$ pollicibus longa: su-
perior verò angustior, & ver-
sus partem extremam con-
tractior, in acutum desinit.
Rictus autem ipsius tantus est,
ut in ejus ore uno eodemque
tempore 14 homines stare pos-
sint. Lingua 15 pedes & 7 $\frac{1}{2}$
pollices longa, & quâ parte
latissima 15 quoque pedes ha-
bet, substantiâque mollissimâ
constat. Totum palatum ni-

La longueur de celle que Sib-
bald a décrite, est de 78 pieds.
Le tour de son corps est de plus
de 35 pieds. Sa mâchoire infé-
rieure est beaucoup plus grande
& plus large que la supérieure,
& de figure semicirculaire, &
elle a 13 pieds 2 $\frac{1}{2}$ pouces de
long: sa mâchoire supérieure est
plus étroite, & se termine en
pointe. Sa gueule est si grande,
qu'il y peut tenir 14 hommes de-
bout dans le même tems. Sa
langue, qui est d'une substance
molle, a 15 pieds 7 $\frac{1}{2}$ pouces de
long, & 15 pieds dans sa plus
grande largeur. Tout son palais
est couvert de soyes noires, qui
luy tombent sur la langue: ses

Y y

lames de corne sont noires & courtes; les plus longues n'ont que 3 pieds. Elle a sur le front deux canaux, par lesquels elle rejette l'eau, qui approchent de la figure d'une pyramide, dont la base est vers le front. Ses yeux sont placés un peu au-dessus des angles de la bouche, & distants du bout du museau de 13 pieds 2 pouces. Ses nageoires latérales ont 10 pieds de long, & 2 $\frac{1}{2}$ pieds dans leur plus grande largeur, & 3 pouces seulement vers l'extrémité, & sont éloignées de l'ouverture de la bouche de 6 pieds 5 pouces. Celle du dos est placée vers la queue, & est longue d'environ 3 pieds, & large de 2. Sa queue a 18 $\frac{1}{2}$ pieds de large. Sa verge, qui est placée un peu au-dessous du nombril, a 5 pieds de long, & 4 pieds de tour à son origine; & elle devient ensuite peu à peu plus étroite jusqu'à son extrémité. L'anus est placé à 5 pieds au-dessous de la verge: son ouverture est longue d'un pied. Depuis la mâchoire inférieure jusqu'au nombril son ventre est garni de plis ou de rides, qui ont chacune 2 pouces de large, & qui sont distantes d'autant les unes des autres. La couleur de sa peau est noire sur le dos, & blanche sur le ventre. Cette espèce vit de *Harengis*.

gris contactum est fetis, quæ suprà linguam pendent: laminæ cornear nigrae sunt & breves; longiores enim 3 tantum pedes æquant. Duæ sunt in fronte fistulæ, quibus aquam rejicit & efflat, figuræ ad pyramidalem accedentis, cujus basis versùs frontem vertitur. Oculi paulò suprà oris angulos siti sunt, & ab eis ad rostri extremitatem distantia est 13 pedum & 2 pollicum. Pinnae laterales 10 pedes longæ, qua parte latissimæ 2 $\frac{1}{2}$ pedes habent, & versùs extremum 3 tantum pollices latae. Ab eis ad oris hiatum distantia est 6 pedum & 5 pollicum. Pinna dorsalis versùs caudam sita est, tresque circiter pedes longa, & 2 lata. Cauda 18 $\frac{1}{2}$ pedes latitudine attingit. Penis, qui paulò infrà umbilicum pendet, 5 pedes longus, in exortu 4 pedes in ambitu obtinet, sensimque ad extremum angustius vergit. Ad 5 pedes sub pene anus situs est; rima autem ejus unum pedem longa. A maxillâ inferiore ad umbilicum venter plenus est plicis seu rugis, quæ in latitudine 2 pollices obtinent, & pars eminens & pars cava æquales sunt, ejusdemque mensuræ. Cutis est in dorso nigra, in ventre alba. *Harengis* vicinat hæc species.

7. LA BALEINE A MUSEAU POINTU.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto.

Balæna tripinnis, nares habens, cum rostro acuto, & plicis in ventre. *Raj.*

Syn. Pisc. p. 16. 8.

Sibbald. Obs. p. 29. Fig. T. 1. Lit. D. (Fig. fas bona).

Balæna fistulæ duplici in rostro, protuberantiâ cornuiformi, in extremo dorso. Art. Gen. Pisc. g. 48. sp. 3.

Art. Synon. Pisc. g. 48. sp. 3.

An *Balæna Tigridis* inistat variegata? *Klein. Pisc. Mis. 2. p. 16.*


Junioris hujus speciei descriptionem dedit *Sibbaldus*. Ab extremitate rostri ad caudam 46 pedes longa est. Ambitus corporis juxta pinna laterales, qua parte crassissimum, 20 pedum est, & 12 tantum pedum juxta pinnam dorsalem mensuratus. Caput est oblongum, molli-ter ad angustiam quamdam, secundum rostri longitudi-nem, inclinans: rostrum au-tem figuræ inter acutum & obtusum mediæ. Maxillæ in-ferior circâ medium $4\frac{1}{2}$ pedes lata: oris rectus 10 pe-des longus, & 4 pedes cum 2 pollicibus latus: lingua, li-cet contracta, 5 pedes lon-ga, versùs radices 3 pedes lata, & parè ferè cum latitu-dine crassitie, substantiâ, co-lore, & figurâ planè *Bovine* similis. In parte rostri altiore sunt fistulæ, quibus a-quam rejicit, ab extremitate maxillæ superioris 6 pedes &

Sibbald en a décrit une jeune de cette espece, qui a 46 pieds de long depuis le bout du mu-seau jusqu'à la queue: le tour de son corps mesuré aux nageoires latérales, où il est le plus gros, est de 20 pieds, & de 12 seule-ment mesuré à la nageoire du dos. Sa tête est oblongue, & se rétrécit un peu vers le bout du museau, qui tient le milieu en-tre l'aigu & l'obtus. La mâchoi-re inférieure est large de $4\frac{1}{2}$ pieds vers son milieu: l'ouverture de la bouche est longue de 10 pieds, & large de 4 pieds 2 pouces: sa langue, quoique contractée, a 5 pieds de long, & 3 de large vers sa racine, & presque autant d'épaisseur, & est semblable en substance, en couleur, & en fi-gure à celle d'un *Bœuf*. Elle a sur la partie la plus élevée de la tête 2 canaux, par lesquels elle rejette l'eau, qui sont éloignés de 6 pieds 8 pouces du bout de la mâchoire supérieure. Ses yeux sont environ de la grosseur de

ceux d'un *Bœuf*, & placés auprès des angles de la bouche. Elle a 3 nageoires, sçavoir 2 latérales & une sur le dos : les latérales, qui sont placées à la poitrine, & distantes des yeux de 5 pieds, ont 5 pieds de long, & $1\frac{1}{4}$ pied de large : celle du dos est distante de la queue de $8\frac{1}{2}$ pieds, & ressemble assez à une corne. Sa queue a $9\frac{1}{2}$ pieds de large. Sa verge a à peine 2 pieds de long, & est placée à $5\frac{1}{2}$ pieds au-dessous du nombril. A 3 pieds au-dessous de la verge est situé l'anus, dont l'ouverture a $\frac{1}{4}$ pied de long, & est éloignée du bout de la queue de 14 pieds. Depuis la mâchoire inférieure jusqu'au nombril & aux nageoires latérales, le ventre est garni de plis ou de rides longitudinales, larges d'un pouce. La largeur & la profondeur des sillons qu'elles forment, n'est pas tout à fait d'un pouce. Sa peau est très lisse, noire & brillante sur le dos, & blanche sur le ventre.

8 pollices distantes. *Oculi Bovini* ferè magnitudine pares videntur, nec procul ab oris angulis collocantur. 3 ei sunt pinnæ, duæ laterales, unaque dorsalis : pinnæ laterales, utrinque in pectore sitæ, & 5 pedes ab oculis distantes, 5 pedes longæ sunt, & $1\frac{1}{4}$ pede latæ : pinna vero dorsalis $8\frac{1}{2}$ pedes à caudâ distat, cornuque sat benè imitatur. Cauda $9\frac{1}{2}$ pedes lata. Penis, ad $5\frac{1}{2}$ pedes infra umbilicum situs, pedes 2 in longitudinè vix attingit. Infra eum ad 3 pedes positus est anus, cujus apertura pedem dimidium æquat, & ab extremo caudæ 14 pedes distat. A maxillâ inferiore ad umbilicum, & usque ad pinnas laterales, permultæ sunt in ventre plicæ live rugæ longitudinales 1 pollice latæ ; & sulcorum inter has lâtitudinè & profunditas pollice minores. Cutis est levissima, in dorso nigra & nitidissima, in ventre alba.





ORDO II.

ORDRE II.

CETACEA

LES CETACÉES

Dentata in maxillâ inferiore tantum.

Qui ont des dents à la mâchoire inférieure seulement.

GENUS *Ceti* unicum est ad hunc Ordinem constituendum.

CET Ordre ne contient qu'un seul Genre, sçavoir celui du *Cachalot*.

I I.

I I.

Genus Ceti.

Le Genre du Cachalot.

Hujus character est
Dentes in maxillâ inferiore tantum:

Alveoli in maxillâ superiore, ad dentes inferioris includendos aptati.

Son caractère est
D'avoir des dents à la mâchoire inférieure seulement:

Et à la mâchoire supérieure des trous propres à recevoir les dents de la mâchoire inférieure.

Obs. Hujus Generis specierum alix binas tantum habent pinnas laterales, utrinque unam; alix, præter istas laterales, tertiam habent in dorso.

Obs. Parmi les especes de ce Genre les unes n'ont que deux nageoires latérales, une de chaque côté; & les autres, outre ces deux latérales, en ont une troisième sur le dos.

1. LE CACHALOT.

Cetus bipinnis, supra niger, infra albicans, fistulâ in cervice; dorso levi... CETUS.

Cetus dentatus. Masf. Worm. p. 180.

Charlat. Exer. p. 47.

Cete, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum, Clusii Exot. *Raj. Syn. Pisc.* p. 11. 4.

Cete Clusio descriptum, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum. *Will. Hist. Pisc.* p. 41. *Fig. T. A. 1. F. 3.* (*Fig. bona*).

Cete. Clusii Exot. Lib. VI. Raji, Willughbeji, & aliorum. *Klein. Pisc. Mis.* 2. p. 14. 1.

Aliud Cete admirabile. *Clus. Exot. Fig.* p. 131. (*Fig. sat bona*).

Balæna major, in inferiore tantum maxillâ dentata, macrocephala, bipinnis. *Raj. Syn. Pisc.* p. 15. 3.

Sibbald. Obs. p. 12.

Balæna. *Jonst. Pisc.* p. 151. *Fig. T. 41. & 42.* [*Fig. bonis*].

Catodon fistula in cervice. *Art. Gen. Pisc.* g. 50. *sp.* 2.

Art. Synon. Pisc. g. 50. *sp.* 2.

Linn. syst. nat. ed. 6. g. 97. sp. 2.

Faun. Suec. Linn. No. 261.

Aquatile ingens. *Eusf. Nieremb. Fig.* p. 263. (*Fig. bona*).

Cachelor, sive Potfish, Zorgdraght. *Klein. Pisc. Mis.* 2. p. 14. 2.

Cachalot. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 116.

Les Hollandois l'appellent POTWALFISH. *Klein. Hist. d'Isl. CAZILOT, ou POTFISCH; & quelques uns, NORD-CAPER. Hist. d'Isl.*

Le Cachalot décrit par Clusius, a 52 ou 53 pieds de long. (Il y en a qui ont jusqu'à 80 pieds de long, & le reste à proportion). Le tour de son corps est d'environ 31 pieds. Sa tête est très grosse, & aplatie en devant, comme le musle d'un Bœuf. La mâchoire supérieure a 15 pieds de long, depuis son extrémité jusqu'aux yeux; & la mâchoire inférieure n'en a que 7: elle est garnie tout au tour de dents de la grosseur du poignet, qui sortent des gencives de 2 ou 3 pouces, & qui s'emboîtent dans autant de trous situés dans la mâchoire supérieure. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé sur le sommet de la tête vers le dos, & a environ 3 pieds

Cetus à Clusio descriptus 52 aut 53 pedum longitudinem attingit. (Sunt qui 80 pedum longitudinem æquant, crassitie proportionatâ). 31 circiter pedes in ambitu corporis obtinet. Caput habet crassissimum, & rostri Bovini instar antèrius compressum. Maxilla superior, ab ipsius extremitate ad oculos usque, 15 pedes longa est; maxilla vero inferior 7 tantum pedes longa, in ejus ambitu plurimi sunt dentes carpi humani crassitie, qui è gingivis ad 2 vel 3 pollicum longitudinem exerti sunt. Maxilla superior totidem habet alveolos carneos, in quibus dentes inferioris excipit. In cervice,

versus dorsum, fistula est, de grandeur. Ses yeux ont 7 à 8 pouces de long. Il n'a que deux nageoires (une de chaque côté) distantes des yeux de 4 pieds. Ces nageoires ont 4 pieds 4 pouces de longueur, & presque 1 pied d'épaisseur. Le nombril est éloigné des mâchoires de 16 pieds: à 3 pieds au-dessous du nombril se trouve la verge, qui a 6 pieds de long: l'anus est placé à $3\frac{1}{2}$ pieds au-dessous de la verge; & de là jusqu'à la queue, il y a $13\frac{1}{2}$ pieds de distance. Sa queue est très épaisse, & large de 13 pieds. Sa peau est noire sur le dos, & blanche sur le ventre.

versus dorsum, fistula est, de grandeur. Ses yeux ont 7 à 8 pouces de long. Il n'a que deux nageoires (une de chaque côté) distantes des yeux de 4 pieds. Ces nageoires ont 4 pieds 4 pouces de longueur, & presque 1 pied d'épaisseur. Le nombril est éloigné des mâchoires de 16 pieds: à 3 pieds au-dessous du nombril se trouve la verge, qui a 6 pieds de long: l'anus est placé à $3\frac{1}{2}$ pieds au-dessous de la verge; & de là jusqu'à la queue, il y a $13\frac{1}{2}$ pieds de distance. Sa queue est très épaisse, & large de 13 pieds. Sa peau est noire sur le dos, & blanche sur le ventre.

2. LE CACHALOT BLANC.

Cetus bipinnis, ex albo flavescens, fistulâ in cervice, dorso levî... CETUS ALBICANS.

Balæna albicans. *Klein. Pisc. Mis. 2. p. 12. 2.*

Albus Piscis Cetaceus. *Raj. Syn. Pisc. p. 11. 5.*

White-Fish, Frederici Martens. *Raj. Klein.*

Wittfisch, ou Weisfisch. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 148.*

Corporis longitudo 15 est aut 16 pedum. Figurâ suâ *Balenam vulgarem* imitatur; capite tamen acutiore donatur. Dentes habet parumper incurvos, compressos, apices rotundatos; eminentiam quandam in cervice, & fistulam, per quam aquam ejicit; pinnam in dorso nullam, La longueur de son corps est de 15 ou 16 pieds. Il ressemble par sa figure à la Baleine ordinaire; il a cependant la tête plus pointue. Ses dents sont un peu recourbées, applaties, & arrondies par en haut. Il a sur le sommet de la tête une éminence, & un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire

sur le dos; mais il en a une de chaque côté passablement longue. Sa queue est semblable à celle de la Baleine ordinaire. La couleur de sa peau est d'un blanc jaunâtre. On le trouve dans le *Détroit de Davis*, & sur tout dans la *Baye Méridionale*, appelée *Sud-Bucht*.

duas verò laterales, utrinque unam, pro mole corporis, fatiſ longam; caudam caudæ *Balæna vulgaris æmulam*. Cutis ex albo flaveſcit. Habitat in *Freto Davis*; in *Freto Meridionali*, *Sud-Bucht* vocato, frequens.

3. LE CACHALOT DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

Cetus bipinnis, fistula in cervice, dorso gibboſo... CETUS NOVÆ ANGLIÆ.

Balæna Dudleji, dorſo Gibbo. Klein. Piſc. Miſc. 1. p. 15.

Cachalot des côtes de la Nouvelle Angleterre. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p. 127.*

Cachalot. *Hiſt. de l'Acad. an. 1741. p. 16.*

Les Anglois l'appellent SPERMA CETI-WHALE. *Hiſt. d'Iſl.*

Dans les Bermudes il porte le nom de TRUMPO. *Hiſt. d'Iſl.*

La longueur de son corps est de 60 ou 70 pieds, & l'épaisseur de 30 ou 40 pieds. Sa tête est énorme, & fait presque la moitié de la longueur de son corps. La mâchoire supérieure est beaucoup plus épaisse que l'inférieure; elle est fort large vers le museau, & son bout est applati en avant, comme le museau d'un Taureau. La mâchoire inférieure est garnie de dents de la grosseur du bras près de la main, qui sont éloignées l'une de l'autre d'environ $\frac{1}{2}$ pied, & qui s'emboîtent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure. Ses yeux sont petits à

Corporis longitudo 60 aut 70 pedes æquat; crassities 30 aut 40 pedes. Caput est prægrande, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla superior inferiore multò crassior est, & latissima circà rostrum, cujus extremitas, rostri Tauri instar, anteriùs compressa est. Plurimi sunt in maxillâ inferiore dentes, carpi humani crassitie, circiter $\frac{1}{2}$ pedem à se invicem distantes: maxilla autem superior totidem habet alveolos carneos, in quibus prædicti dentes excipiuntur. Oculos habet, pro mole corporis,

LES CETACÉES, *Classe II. Ordre II.* 361

poris, exiguos; fistulam in cervice, cuius diameter saltem 1 pedem æquat, & per quam aquam rejicit & efflat; binas tantum pinnas laterales, utrinque unam; & loco pinnae dorsalis, gibbum habet unum pedem crassitie superantem. Cutis est ad tactum mollissima, & ex cinereo nigricans. Habitat in mari; circa *Novam Angliam* frequens. proportion du corps. Il a sur le sommet de la tête un canal par lequel il rejette l'eau, & qui a au moins 1 pied de diamètre. Il n'a que deux nageoires, savoir une de chaque côté: & à la place de la nageoire du dos, il a une bosse de plus d'un pied d'épaisseur. Sa peau est très douce au toucher, & d'un gris noirâtre. On le trouve communément sur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*.

4. LE PETIT CACHALOT.

Cetus bipinnis, fistula in rostro... CETUS MINOR.

Balæna minor, in inferiore maxillâ tantum dentata, sine pinnâ, aut spinâ in dorso. Raj. Syn. Pisc. p. 15. 2.

Sibbald. Obs. p. 9.

Catodon fistulâ in rostro. Art. Gen. Pisc. g. 50. sp. 1.

Art. Synon. Pisc. g. 50. sp. 1.

Linn. syst. nat. ed. 6. g. 97. sp. 1.

Longitudo corporis 24 pedes æquat. Caput habet rotundum, cum rictu oris parvo; dentes in maxillâ inferiore tantum; in superiore autem alveolos, pro dentibus inferioris recipiendis: sunt autem hi dentes in planum finientes, & dimidium tantum pollicis unius extrâ gingivas extant. Fistulam habet in rostro, per quam aquam ejicit. Pinnâ dorsali caret; duabus tantum laterali-bus, utrinque unâ, donatur.

La longueur de son corps est de 24 pieds. Sa tête est ronde, & l'ouverture de sa bouche petite. Il n'a des dents qu'à la mâchoire inférieure, qui s'emboîtent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure: ces dents ne sortent des gencives que d'un demi ponce, & sont terminées par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé sur le museau. Il n'a point de nageoires sur le dos; il n'en a que deux latérales, une de chaque côté.

Zz

5. LE CACHALOT A DENTS POINTUËS.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, reëlis.

Deuxième espèce de Cachalot. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 139.*

Celui qui est décrit dans l'*Hist. d'Isl. & de Gro.* a 70 pieds de long. (On en trouve de 80 à 100 pieds). Sa tête est énorme, & a presque la moitié de la longueur de son corps. La mâchoire inférieure, qui est beaucoup plus petite que la supérieure, s'emboite entièrement dans cette dernière, & est garnie de grosses dents droites & pointuës par en-haut, rangées à distances égales les unes des autres, comme celles d'une Scie, & qui s'emboient dans des trous situés à la mâchoire supérieure. Ses yeux sont très-petits, brillants & jaunâtres. Sa langue est petite & pointuë; le canal par lequel il rejette l'eau, est placé au haut & sur le devant de la tête. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune $1\frac{1}{2}$ pied de long, il en a une troisième sur le dos vers la queue. Il a aussi sur le haut du dos, une bosse fort élevée. Sa peau est très-lisse, & noirâtre sur le dos, & blanchâtre sur le ventre.

Longitudo illius, cujus descriptionem dedit D. Andersonius, *Hist. d'Isl. & de Gro.* 70 pedes æquat. (Sunt qui 80 ad 100 pedes longitudine æstingunt). Caput est maximum, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla inferior superiore multò minor est, & in illà omninò includitur. In maxillâ inferiore dentes sunt crassi, recti, in apice acuti, æqualiter à se invicem distantes, *Serræ* dentium instar; in maxillâ superiore verò totidem sunt alveoli, ad excipiendos inferioris maxillæ dentes comparati. Oculos habet valdè exiguos, splendentes & flavicantes; linguam parvam & acutam; in parte capitis anteriore & altiore fistulam, per quam aquam in altum ejicit; pinnas duas laterales, utrinque unam, $1\frac{1}{2}$ pede longam, & præter istas, tertiam in dorso versùs caudam, & gibbum altissimum in parte superiore dorsi. Cutis est levissìma, in dorso nigricans, in ventre candicans.

6. LE CACHALOT. A DENTS EN FAUCILLES.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, arcuatis, falciformibus.

Balæna major, in inferiore tantum maxillâ dentata, dentibus arcuatis, falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens. *Raj. Syn. Pisc. p. 15. 4.*

Klein. Pisc. Mis. 2. p. 15. 1.

Sibbald. Obs. p. 13. Fig. T. 1. Lit. A. (Fig. mala).

Physeter maxillâ superiore longiore, spinâ longâ in dorso. Art. Gen. Pisc. g. 46. sp. 1.

Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 101. sp. 1.

Physeter maxillâ superiore longiore, pinnâ longâ in dorso. Art. Synon. Pisc. g. 46. sp. 1.

Troisième espèce de Cachalot. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 142.*

Corporis longitudo quandoque 70 pedes attingit. Caput tanta molis est, ut, demptâ caudâ, totius corporis mediam longitudinem habeat, & crassitie reliquam corporis partem, etiam quâ crassissimum, superet. In maxillâ inferiore, quæ superiore paulò brevior est, dentes sunt rotundi, parumper compressi, arcuati, & falciformes, in mediâ longitudine crassiores & magis arcuati, & sensim de crassitie remittentes, superius in conum acutum, intus versum, desinentes, inferius etiam de crassitie perdescentes, & in radicem tenuiorem & quàm in medio angustiores finientes. In maxillâ superiore totidem sunt alveoli quot sunt dentes in inferiore, ad istos dentes excipiendos comparati. Oculi

La longueur de son corps est quelquefois de 70 pieds. Sa tête est si grande, qu'elle a la moitié de la longueur de tout le corps, si l'on en excepte la queue, & qu'elle est plus grosse que le reste du corps, même dans l'endroit où il est le plus épais. La mâchoire inférieure est un peu plus courte que la supérieure, & est garnie de dents rondes, un peu comprimées & recourbées en forme de faucilles. Le plus grand diamètre de chaque dent est vers le milieu de sa longueur, & chacune se termine par un cône pointu, dont le sommet est tourné vers la partie intérieure de la bouche. Toutes ces dents s'emboîrent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure. Ses yeux sont très petits. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé un peu au-dessus du milieu du mu-

seau. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune environ 4 pieds de long, il en a sur le dos une troisième assez longue, & qui se termine en pointe: (ce qui luy a fait donner le nom d'*Epine*). Sa peau est très lisse, & d'un brun noirâtre. Le mâle a une verge longue de 6 pieds, & éloignée des mâchoires d'environ 20 pieds. L'anüs est placé à environ 3 pieds au-dessous de la verge; & de-là jusqu'à la queue il y a 14 pieds de distance. Les extrémités de la queue sont distantes de 9 pieds l'une de l'autre.

sunt perexigui. Parium suprà rostrum medium fistula est, per quam aquam in altum ejicit. Binas habet pinnas laterales (utrinque unam) 4 circiter pedes longas, & præter istas, tertiam in dorso satis longam, & in acutum desinentem: (undè *Spina* nomen). Cutis est levissima, & ex fusco nigricans. Mas penem habet 6 pedes longum, & 20 circiter pedes à mandibulis distantem: à pene ad podicem 3 plus minus pedum distantia est: à podice ad caudam distantia 14 pedum: caudæ extrema à se invicem 9 pedes distant.

7. LE CACHALOT A DENTS PLATTES.

Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus.

Balaena macrocephala tripinnis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minus inflexos, & in planum desinentes. *Raj. Syn. Pisc. p. 16. 5. Sibbald Obs. p. 18.*

Physeter pinnâ dorsi altissimâ, apice dentium plano. *Art. Gen. Pisc. g. 46. sp. 2.*

Art. Synon. Pisc. g. 46. sp. 2.

Linn. syst. nat. ed. 6. g. 01. sp. 2.

Mulor Nierembergii. Klein. Pisc. Misf. 2. p. 15. 2. a.

Piscis Mularis. Euf. Nieremb. p. 165.

Cachalot à petites dents grosses & applaties. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 117.*

Il a longueur de son corps est quelquefois de plus de 100 pieds. Il ressemble au précédent par sa figure, mais il en diffère par celle de ses dents, qui sont moins recourbées, & qui se ter-


Corporis longitudo quandoque 100 pedes superat. Figurâ suâ præcedentem imitatur, ab eo autem differt figurâ dentium, qui minus sunt in medio inflexi, & in planum

LES CETACÉES, *Classe II. Ordre II.* 365

definunt. Fistulam habet in fronte, per quam aquam rejicit & efflat; pinnae duas laterales, & praeter istas, tertiam in medio ferè dorso, quam gerit erectam, quæque arbori navis, à Nautis *Mât de Mizène* dictæ, comparatur. Habitat in mari; frequens circa *Caput Septentrionale*, & circa *Finmarchiam*.

minent par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé sur le front. Outre les deux nageoires latérales, il en a une troisième presque au milieu du dos, qu'il porte droite & élevée, & qu'on compare au mât d'un vaisseau, appelé *Mât de Mizène*. On le trouve le plus fréquemment au *Cap du Nord*, & sur les côtes de *Finmarchie*.





ORDRE III. ORDO III.
 LES CETACÉES CETACEA

Qui ont des dents à la mâchoire supérieure seulement. *Dentata in maxillâ superiore tantum.*

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans les deux précédents, qu'un seul Genre, qui est celui du Narhwal.

IN hoc Ordine, sicut in duobus præcedentibus, unicum continetur Genus, scilicet *Ceratodontis*.

III.

III.

Le Genre du Narhwal

Genus Ceratodontis.

Son caractère est
 D'avoir à la mâchoire supérieure seulement deux dents très longues, droites, & qui avancent en avant.

Hujus character est
 In maxillâ superiore tantum dentes duo longissimi, recti, antrorsum prominentes.

* I. LE NARHWAL.

CERATODON.

Narhwal. *Klein. Pisc. Misf. 2. p. 18. Fig. T. 2. Lit. C. (Fig. bona).*
 Monoceros Piscis è Genere Cetaceo. *Raj. Syn. Pisc. p. 11. 6.*
 Monoceros Piscis qui de Genere Cetaceo esse fertur. *Will. Hist. Pisc. p. 42.*
Fig. T. A. 2. (Fig. mala) & cranium cum dente eadem Tab. (Fig. bona).
 Monoceros. Unicornu. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 98. sp. 1.*
 Monoceros, Unicornu Marinum. *Charlet. Exer. p. 47.*
 Unicornu Marinum. *Mus. Worm. Fig. p. 282. [Fig. mala]. & cranium Fig. p. 283. & 284. [Fig. sat bonis].*
 Monodon. *Art. Gen. Pisc. g. 49. sp. 1.*

Art. Synon. Pisc. g. 49. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 263.

Licorne de mer, *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 102. Fig. p. 103. [Fig. bonne].*

Les Suédois l'appellent ENHÖRNING. *Linn.*

Les Islandois, NARHWAL. *Raj. Will. Art.*

Les Septentrionaux, NARHVA L. *Charlet.*

Les Groenlandois, TOWACK. *Hist. d'Isl.*

Corporis longitudo vulgaris 20 aut 22 pedes circiter aequat. (Sunt qui 40 ad 60 pedes longitudine attingunt, secundum *Anderson. Hist. d'Isl. & de Gro.*). Caput habet, pro mole corporis, perexiguum. In maxilla superiore duo sunt dentes (a) 6 aut 7 pedes longi, recti, spiralliter intorti (b), labium superius perforantes, antrorsum prominentes. Oculos habet perexiguos; fistulam in capite, per quam aquam rejicit; pinnam in dorso nullam; binas tantum habet laterales, utrinque unam valde exiguum. Cutis est levissima,

La longueur ordinaire de son corps est d'environ 20 ou 22 pieds. (Il y en a de 40 à 60 pieds, selon *Anderson, Hist. d'Isl. & de Gro.*). Sa tête est très petite, en comparaison de la grosseur de son corps. Il a à la mâchoire supérieure deux dents (a) longues de 6 ou 7 pieds, droites, tortillées en spirale (b), qui percent la lèvre supérieure, & avancent en avant. Ses yeux sont très petits. Il a par dessus la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire sur le dos : il en a seulement une de chaque côté, & très petite. Sa peau est très lisse, blanche, & marquée sur le dos de taches noires. On

(a) Ravissimè reperiuntur Ceratodontes duobus dentibus præditi; ex illis enim una perit ordinariè in alveolo suo; quod faciliè comprobatur inspectione juniorum, qui omnes duobus dentibus præditi sunt. Vide *Anderson. Hist. d'Isl. & de Gro. Vol. II. p. 104.*

(b) Secundum Authores quosdam hujusmodi reperiuntur dentes nequam spiralliter intorti, sed per totam longitudinem levés. Foras aut Ceratodontis altera species.

(a) Il est très rare de trouver le Narhwal avec les deux dents; parce qu'il y en a ordinairement une qui pèrit dans son alvéole. La preuve de cela, c'est que les jeunes en ont deux. Voyez l'*Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 104.*

(b) Quelques Auteurs disent avoir trouvé quelques unes de ces dents, qui n'étoient point tortillées en spirale, mais lisses d'un bout à l'autre. C'est peut être une autre espèce de Narhwal.

le trouve ordinairement sur les
côtes d *Islande* & de *Groënland*,
& dans le *Détroit de Davis*.

alba, maculis nigris in dorso
variegata. Habitat in mari
circa *Islandiam* & *Groenlan-*
diam, & in *Freto Davis*.



ORDO IV:



ORDO IV. ORDRE IV.

CETACEA LES CETACÉES

Dentata in utraq̃ue maxillâ. *Qui ont des dents aux deux mâchoires.*

Hic Ordo, sicut & præcedentes, unico constituitur Genere, scilicet *Delphini*. **I**L n'y a dans cet Ordre ; comme dans tous les précédents, qu'un seul Genre, savoir celui du *Dauphin*.

I V.

Genus Delphini.

Hujus character est
Dentes in maxillâ utraq̃ue.

Obs. Hujus Generis species ultima binas tantum habet pinnas laterales, utrinque unam; alias omnes, præter istas laterales, tertiam habent in dorso.

I V.

Le Genre du Dauphin.

Son caractère est
D'avoir des dents aux deux mâchoires.

Obs. La dernière espèce de ce Genre n'a que deux nageoires latérales, une de chaque côté; toutes les autres, outre ces deux latérales, en ont une troisième sur le dos.

* I. LE DAUPHIN,

Delphinus pinnâ in dorso unâ, dentibus acutis, rostro longo; acuto... DELPHINUS.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto. Art. Gen. Pisc. g. 47. sp. 2.

Art. Synon. Pisc. g. 47. sp. 2.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto. Delphitzus. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 100. sp. 2.

Delphinus antiquorum. Raj. Syn. Pisc. p. 12. 7.

Aaa

- Delphinus. *Klein. Pisc. Mif.* 1. p. 24. *Fig. T. 3. Lit. A. & cranium T. I. No. 2. (Fig. bonis)*
Aldro. Pisc. p. 7. 1. Fig. p. 703, & 704. [Fig. malis].
Jonst. Pisc. p. 154. Fig. T. 43. & cranium T. 44. [Fig. sat bonis].
Rondel. Pisc. Fig. p. 459. (Fig. sat bona)
Will. Hist. Pisc. p. 28. Fig. T. A. 1. F. 1. (Fig. bona).
Bell. Aquat. p. 7. Fig. p. 9. [Fig. sat bona].
Muf. Worm. p. 288.
Charlet. Exer. p. 47.
Delphinus Bellonii. Gefn. Pisc. p. 380. Fig. p. 381. (Fig. sat bona).
Delphinus, vel Delphin. Gefn. Icon. Aquat. p. 163. Fig. p. 161. & cranium p. 162. (Fig. sat bona).
Sus Marinus rostro acuto. Euf. Nieremb. p. 259.
Dauphin, que nous appellons Oye de mer. Bell. des Poif. p. 6. Fig. p. 7. (Fig. assez bonne).
Dauphin. Hist. d'If. & de Gro. Tom. II. p. 153.
Les François l'appellent BEC D'OYE. Rondel. Gefn. OYE DE MER. Bell.
Les Bretons, MORHOUC, ou MORHO. Gefn. Aldro.
Les Grecs, ΔΑΙΦΙΝ, ΔΑΙΦΙΝ. Gefn. Aldro. Bell. Rondel. Charlet.
Les Italiens, DELFINO. Gefn.
Les Allemands, MEERSCHWEYN. Gefn.
Les Polonois, MORSKA ŻWYNIA. Gefn. Aldro.
Les Suédois, MARSWIN. Linn.
Les Norvégeois, NYSSA. Hist. d'If.
Les Hollandois, TUMELAAR. Hist. d'If.
Les Marins, TUMMELER. Hist. d'If.
Les Flamands, MEERSWYN. Aldro.
Les Anglois, DOLPHIN. Raj. Art. PORPESSE. Will. Art.

La longueur de son corps est de 9 ou 10 pieds : son diamètre, dans l'endroit le plus gros, d'environ 2 pieds. Son corps est oblong & rond, gros à la partie antérieure ; & la postérieure se termine en pointe. Son museau est rond, long & pointu ; l'ouverture de sa bouche a environ 14 ou 15 pouces. Ses deux mâchoires sont armées de petites dents pointuës comme des alènes. Ses yeux sont assez grands. Il a par dessus la tête un canal,

Corporis longitudo 9 aut 10 pedes attingit : diameter, qu'à parte crassissimum, 2 circiter pedes. Corpus habet oblongum & terete, in parte anteriore crassum, in posteriore verò in acumen desinens ; rostrum rotundum, longum & acutum ; oris rictum 14 aut 15 pollices longum. In utràque maxillâ dentibus munitur exiguis, Subularum instar, acutis. Oculos habet sat magnos ; fistulam in

LES CETACÉES, *Classe II. Ordre IV.* 371

capite, per quam aquam rejicit; pinnae duas laterales 16 circiter pollices longas & 10 pollices latas, & tertiam insuper medium versus dorsum 1 $\frac{1}{2}$ pedem longam & 13 pollices latam. Caudæ latitudo 2 circiter pedes æquat. Cutis est levissima, in dorso nigra, in ventre alba.

par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, deux latérales longues d'environ 16 pouces & larges de 10, & une vers le milieu du dos longue de 1 $\frac{1}{2}$ pied & large de 13 pouces. Sa queue est large d'environ 2 pieds. Sa peau est très lisse, & noire sur le dos, & blanche sur le ventre.

2. LE MARSOUIN.

Delphinus pinna in dorso unâ, dentibus acutis; rostro brevi, obtuso... PHOCÆNA.

Delphinus corpore fetè coniformi, dorso lato, rostro subacuto. Art. Gen. Pisc. g. 47. sp. 1.

Art. Synon. Pisc. g. 47. sp. 1.

Delphinus corpore subconiformi, dorso lato, rostro subacuto. Phocæna. Linn. syst. nat. ed. 6. g. 100. sp. 1.

Faun. Suec. Linn. No. 266.

Phocæna Rondeletii; Gessn. Raj. Syn. Pisc. p. 13. A. 8.

Will. Hist. Pisc. p. 31. Fig. T. A. 1. F. 2. (Fig. bona).

Phocæna Rondel. Pisc. p. 473.

Gessn. Icon. Aquat. Fig. p. 263. (Fig. bona).

Jonst. Pisc. p. 155. Fig. T. 41. (Fig. bona).

Charlet. Exer. p. 48.

Tursio, sive Phocæna. Klein. Pisc. Mis. 2. p. 26. Fig. T. 3. Lit. B. Fetus

T. 2. Lit. A. B. & Cranium T. 1. No. 3. (Fig. bonis).

Gessn. Pisc. Fig. p. 837. (Fig. bona).

Aldro. Pisc. p. 719. Fig. p. 720. (Fig. bona).

Tursio. Rondel. Pisc. Fig. p. 474. (Fig. bona).

Bell. Aquat. p. 15. Fig. p. 16. (Fig. bona).

Sus Marinus, rostro obtuso. Euf. Nieremb. p. 259.

Marsouin. Bell. des Poiss. Fig. p. 12. (Fig. bonne).

Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. p. 211.

Marsouin, ouffleur, ou Tunin. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 151.

Les Grecs l'appellent πορνιν. Gessn. Aldro. Bell.

Les Allemands, MEERSCHWEYN. Gessn.

Les Suédois, MARSWIN. Linn. Art. TUMBLARE. Linn.

Les Danois, MARSWIN. Art. BRUUSKOP, ou SPRINHWAL, ou SPRINGER.

Hist. d'Isl.

Les Cimbres, MARSWIN. Raj. Will. Art.

Aaa ij

Les Norvégeois, MARSUEN, ou NISER. *Hist. d'Isl.*

Les Islandois, SUINHVAL, ou SUINHVALUR, ou WITINGA. *Hist. d'Isl.*

Les Flamands, BRUYNVISCH. *Aldro.*

Dans la Frise Orientale, BRUNFISCH. *Gefn.*

Les Anglois, PORPESSE. *Raj. Will. Arc. Klein. Hist. d'Isl.* PORPUS. *Hist. d'Isl.*

Les Ecoissois, SEA-PORC. *Hist. d'Isl.*

Son corps est beaucoup plus gros & moins long que celui du Dauphin : il en diffère encore par la forme de son museau, qui est court & obtus. Ses deux mâchoires sont armées de petites dents pointues. Ses yeux sont très petits. Il a sur le sommet de la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a, comme le Dauphin, trois nageoires, deux latérales & une vers le milieu du dos. Sa peau est très lisse, & noire sur le dos, & blanche sur le ventre. On le trouve dans toutes les mers.

A Delphino differt corpore crassiore & minus longo, & rostro brevi & obtuso. Dentes habet in utraque maxillâ parvos & acutos; oculos perexiguos; fistulam in cervice, per quam aquam rejicit; pinnae tres, Delphini instar, duas scilicet laterales, & præter istas, tertiam medium versûs dorsum. Cutis est levissima, in dorso nigra, in ventre alba. Habitat ubique in mari.

3. L'ÉPÉE-DE-MER.

Delphinus pinnâ in dorso unâ Gladii recurvi æmulâ, dentibus acutis, rostro quasi truncato.

Épée de Mer. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 155 -

Les Pêcheurs de Baleines, sur les côtes de la Nouvelle Angleterre, l'appellent KILLARS. Hist. d'Isl.

La longueur de son corps est d'environ 10 ou 12 pieds. (Celles qu'on prend sur les côtes de la Nouvelle Angleterre, & qu'on y appelle Killars, ont quelquefois jusqu'à 30 pieds de long). Son museau est comme tronqué. Ses deux mâchoires

Corporis longitudo 10 aut 12 pedes æquat. (Qui circa Novam Angliam capiuntur, quique ibi Killars vocantur, quandoque 30 pedum longitudinem attingunt). Rostrum habet quasi truncatum; dentes in utraque maxillâ parvos

LES CETACÉES, Classe II. Ordre IV. 373

& acutos; fistulam in capite, font armées de petites dents per quam aquam ejicit; pin- pointées. Elle a sur la tête un nas duas laterales, utrinque canal, par lequel elle rejette unam, & præter istas, tertiam l'eau. Outre ses deux nageoires in dorso gladii recurvi armu- latérales, elle en a sur le dos une lam, 3 aut 4 pedes longam, troisième, qui ressemble assez à & unum vel $1\frac{1}{2}$ pedem in à un sabre recourbé: cette na- origine latam; quæ latitudo, geoire a 3 ou 4 pieds de long, sensim versùs ejus extremum & 1 pied ou $1\frac{1}{2}$ pied de large procedendo, minuitur. & elle devient de plus en plus étroite, à mesu- Habitat in mari circà Spitzber- re qu'elle s'en éloigne. On la gam, in Fretò Davis, & circà trouve près de Spitzberg, dans le Novam Angliam. Détroit de Davis, & sur les cô- tes de la Nouvelle Angleterre.

4. L'ÉPAULARD.

Delphinus pinnâ in dorso unâ, dentibus obtusis... ORCA.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis. *Art. Gen. Pisc.* g. 47. sp. 3.

Art. Synon. Pisc. g. 47. sp. 3.

Faun. Suec. Linn. N.º. 267.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis. Orca. *Linne. syst. nat. ed. 6. g. 100. sp. 3.*

Balæna minor, utraq. maxillâ dentata, Orca dicta Bellonio & Ronde- letio. *Raj. Syn. Pisc.* p. 15. 1.

Sibbald. Obs. p. 6.

Orca Rondeletii & Bellonii. *Raj. syn. Pisc.* p. 15. 3.

Will. Hist. Pisc. p. 40.

Gefn. Pisc. Fig. p. 748. (Fig. bona).

Gefn. Icon. Aquat. p. 168. Fig. p. 169. [Fig. bona].

Orca. *Klein. Pisc. Mif.* 2. p. 22. cujus cranium Fig. T. I. N.º. 1. (Fig. bona).

Aldro. Pisc. p. 697. Fig. p. 698. (Fig. mala).

Jonst. Pisc. p. 153.

Rondel. Pisc. Fig. p. 483. (Fig. bona).

Bell. Aquat. p. 16. Fig. p. 18. (Fig. mala).

Charlet. Exerc. p. 47.

Buts-Kopf. Frid. Martens. *Raj. Syn. Pisc.* p. 10.

Butzkopf. *Hist. d'ist. & de Gro. Tom. 1.º. p. 150.*

Oudre, ou Grand Marfouin. *Bell. des Poiss.* p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauv.).

A a a ij

Les Espagnols l'appellent TINET. Gefn.

Les Allemands, VASSZ WAL; ZUBER. WAL. Gefn.

Les Suédois, LOPARE. Linn.

Ceux qui habitent les bords de l'Océan, LOPER. Art.

Les Norvégeois, SPRINGWAL. Gefn.

Les Anglois, GRAMPUS. Raj. Art. Hist. d'Isl.

Les Ecoissois, NORTH CAPER. Raj. Art. Hist. d'Isl.

La longueur de son corps est d'environ 24 ou 25 pieds: son diamètre, dans l'endroit le plus gros, qui est vers le ventre, surpasse la moitié de sa longueur. Ses deux mâchoires sont armées de dents obtuses. La mâchoire inférieure est beaucoup plus grande & plus épaisse que la supérieure. Ses yeux sont semblables à ceux des *Bœufs*. Il a sur la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, sçavoir deux latérales, & une sur le dos qui a plus de 3 pieds de long. Sa peau est très lisse, & noire sur le dos, & blanche sur le ventre. On le trouve dans les *Mers Occidentales*.

Longitudo corporis 24 vel 25 circiter pedes attingit: Hujus diameter, quâ parte crassissimum est, circa ventrem scilicet, mediam longitudinem superat. Dentes habet in utraq. maxillâ obtusos; maxillam inferiorem superiore multò majorem & crassiorẽ; oculos oculis *Bovinis* similes; fistulam in capite, per quam aquam rejicit. Tribus donatur pinnis, duobus lateralibus, & insuper tertiâ in dorso 3 pedum longitudinem superante. Cutis est levissima, nigra in dorso, in ventre alba. Habitat in *Mari Occidentali*.

5. LE SOUFFLEUR.

Delphinus pinnâ in dorso nullâ. PHYSETER.

Physeter. Rondel. Pisc. Fig. p. 485.

Gefn. Icon. Aquat. Fig. p. 170.

Aldro. Pisc. Fig. p. 689.

Jonst. Pisc. p. 153.

Charlet. Exer. p. 47.

Physeter Rondeletii, Gefn. Will. Hist. Pisc. p. 41.

(Phyſalus Bellua, seu) Phyſeter Rondeletii. Gefn. Pisc. Fig. p. 851.

Les Xaintongeois l'appellent SEDENETTE. Rondel. Gefn.

Les Languedochiens, MULAR. Rondel. Gefn.

Les Grecs, ρυιητης. Gefn. Aldro.

Les Italiens, CAPIDOGGIO. Rondel. Gefn.

Les Allemands, SPRITZWAL; WETTERWAL. Ggñ.

Les Anglois, WHIRLE-POOL. Will. Ggn.

Descriptione *Phyfeteris*,
quam nobis dedit *Rondeletius*,
videtur eum nec esse in Ge-
nere *Balanarum*, nec ex Ge-
nere *Cetorum*; dentes enim
habet quemadmodum *Orca*:
Orca autem dentibus in utrâ-
que maxillâ munitur; quam-
obrem *Phyfeterem Delphini*
Generis esse putavi. Hæc sunt
verba *Rondeletii*. *Phyfeter*
« Bellua est admirandæ ma-
« gnitudinis, ex *Balanarum*
« Genere: ore maximo, den-
« tibus acutis, ferratis quem-
« admodum *Orca*. Lingua in-
« tûs magna & carnosâ. Fis-
« tulam longè ampliorem ha-
« bet, quàm reliquæ Belluæ:
« quam ob causam multò plus
« aquæ rejicit & efflat, undè
« illi nomen *quævisper*. Ab *Orca*
« differt, quod multò longior
« sit, & dorso pinnâ careat.
« Pinguedine multâ abundat,
« veluti *Balæna* & *Belluæ* re-
« liquæ ». Habitat in Oceano.

Il paroît par la description que
Rondelet a donnée du *Souffleur*,
qu'il doit être séparé des *Balei-
nes* & des *Cachalots*, puisqu'il a
les dents comme l'*Epaulard*, le-
quel en a aux deux mâchoires:
c'est pourquoi je l'ai placé dans
le même Genre. Voilà mot
pour mot la description qu'en
donne *Rondelet*. Le *Souffleur*,
« est un Cetacé d'une grandeur
« extraordinaire, du Genre des
« *Baleines*: sa bouche est très-
« grande; ses dents sont poin-
« tuës, & en forme de scie, com-
« me celles de l'*Epaulard*: sa
« langue est grande & charnuë.
« Le canal par lequel il rejette
« l'eau, est beaucoup plus grand:
« que ceux des autres *Cetacés*:
« c'est pourquoi il rejette beau-
« coup plus d'eau, & avec plus
« de violence: d'où luy est venu
« le nom de *Souffleur*. Il diffère
« de l'*Epaulard* en ce qu'il est
« beaucoup plus long, & qu'il
« n'a point de nageoire sur le dos.
« Il devient très gras, comme la
« *Baleine* & les autres *Cetacés*.
On le trouve dans l'Océan.



TABLE



T A B L E

DES CETACEES,

*Selon l'Ordre dans lequel ils sont rangés dans cet
Ouvrage.*

ORDRE I.

I. Genre de la Baleine.

1. La Baleine ordinaire de Groënland.
2. La Baleine d'Islande.
3. La Baleine de la Nouvelle Angleterre.
4. La Baleine à six bosses.
5. Le Gibbar.
6. La Baleine à museau rond.
7. La Baleine à museau pointu.

ORDRE II.

II. Genre du Cachalot.

1. Le Cachalot.
2. Le Cachalot blanc.
3. Le Cachalot de la Nouvelle Angleterre.

4. Le Petit Cachalot.
5. Le Cachalot à dents pointuës.
6. Le Cachalot à dents en faucilles.
7. Le Cachalot à dents plates.

ORDRE III.

III. Genre du Narhval.

1. Le Narhval.

ORDRE IV.

IV. Genre du Dauphin.

1. Le Dauphin.
2. Le Marfouin.
3. L'Épée-de-mer.
4. L'Épaulard.
5. Le Souffleur.



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre; & la lettre E, l'Espece.

	B.	G.	E.		G.	E.
B Aleine,	1.				4	1.
— De Groënland,	1			E.		
— D'Islande,	1	1.			G.	E.
— A museau pointu,	1	2.		E Paulard,	4	4.
— A museau rond,	1	7.		Epée-de-mer,	4	5.
— De la Nouvelle An-		6.				
gleterre,	1			G.		
— Ordinaire de Groën-		3.			G.	E.
land,	1			G libbar,	1	5.
— A six bosses,	1	1.				
Balene,	1	4.		L.		
Bec d'Oye,	4	6.			G.	E.
		1.				
C				L Icorne de mer,	3	1.
C Achalot,	2.					
—	2			M.		
— Blanc,	2	1.			G.	E.
— Des côtes de la Nou-		3.		M Arfouin,	4	2.
velle Angleterre,	2	2.		— (Grand)	4	4.
— A dents en faucilles,	2	3.				
— A dents plates,	2	6.		N.		
— A dents pointuës,	2	7.			G.	E.
— (Deuxième espece		5.		N Arthval,	5.	1.
de)	2				5.	
— De la Nouvelle An-		5.		O.		
gleterre,	2				G.	E.
— (Petit)	2	3.			4	4.
— A petites dents gros-		4.		O Udre,	4	1.
ses & applaties,	2	7.		Oye de mer,		
— (Troisième espece				S.		
de)	2	6.			G.	E.
					4	5.
D				S Edenette,	4	5.
D Aulphin,		G.		Souffleur,	4	2.
Dauphin,	4				4	5.
		1.				

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; & Littera S, Speciem.

A.		G.		S.		
A	quatile ingens,	2	G.	S. Balena,	1	5.
	Arbach,	1	1.	r. Balene,	1	6.
B.		G.		S.		
B	Alena,	1.	1.	Bec d'Oye,	4	1.
	— &c,	2.	1.	Brunsfich,	4	1.
— Albicans,	2	2.	1.	Bruuskop,	4	2.
— Dudleji,	2	1.	1.	Bruynvifch,	4	1.
— Glacialis,	1	1.	1.	Bunch,	1	3.
— Islandica,	1	1.	1.	Buts-Kopf,	4	4.
— Minor, <i>Orcæ</i> dicta,	4	4.	1.	Burz Kopf,	4	7.
— Novæ Angliæ,	1	1.	1.	C.		
— Rondeletii, Gefneri	1	1.	1.	C	G.	S.
— & Aliorum,	1	1.	1.		1.	1.
— Vera,	1	1.	1.	— Achalot,	1	1.
— Vera Rondeletii,	1	1.	1.	— Blanc,	1	1.
— Vera Zorgdrageri,	1	1.	1.	— Des côtes de la Nou-	1	1.
— Vulgaris,	1	1.	1.	— velle Angleterre,	2	11.
— Vulgaris Groenlandi-	1	1.	1.	— A dents en faucilles,	1	6.
— ca,	1	1.	1.	— A dents plattes,	2	7.
— Vulgi,	1	1.	1.	— A dents pointuës,	2	3.
— Vulgo dicta,	1	1.	1.	— (Deuxième espece	1	1.
Baleine,	1.	1.	1.	— de)	1	3.
— De Gro' nland,	1	1.	1.	— De la Nouvelle An-	1	1.
— D'Islande,	1	1.	1.	— gleterre,	2	3.
— A museau pointu,	1	1.	1.	— (Petit)	1	4.
— A museau rond,	1	1.	1.	— A petites dents gros-	1	1.
— De la Nouvelle An-	1	1.	1.	— ses & applaties,	2	7.
— gleterre,	1	1.	1.	— (Troisième espece	1	1.
— Ordinaire de Groën-	1	1.	1.	— de)	1	6.
— land,	1	1.	1.	Cachelot,	1	1.
— A six bosses,	1	1.	1.	Caper, (Nord)	1	2.
Balena,	1	1.	1.	—	1	1.
— Belloani,	1	1.	1.	Capidoglio,	1	5.
				Carodon <i>Alula</i> in cervi-	1	1.
				— ce,	1	1.
				— Fistula in rostro,	1	4.

Bbbij

	G.	S.		G.	S.
— (Sprinh)	4	2.	— [Greenlands]	1	12
— (Sprütz)	4	5.	— [Hump-back]	1	3.
— (Vallz)	4	4.	— (Scrag)	1	4.
— (Wetter)	4	5.	— [Sperma ceti]	2	3.
— (Zuber)	4	4.	Whirle-Pool,	4	5.
Walfisk, [Gr nlands]	1	1.	White-fish,	2	2.
Waller,	1	1.	Whittfisch,	2	2.
Wallfisch,	1	1.	Witingr,	4	2.
Weisfisch,	2	2.		Z.	
Wetter-Wal,	4	5.		G.	S.
Whale,	1	1.			
— [Finbak]	1	5.	Z Über-Wal,	4	41



EXTRAIT DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences.

Du 6 Septembre 1754.

MESSEIERS Duhamel & de Jussieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, qui a pour titre : *Le Regne Animal, divisé en neuf Classes. Première Classe, Les Quadrupèdes*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que la méthode employée par l'Auteur, paroissoit plus exacte que celles qui avoient été publiées, & qu'elle méritoit son Approbation : en foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 2 Décembre 1754.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

EXTRAIT DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences.

Du 23 Avril 1755.

MESSEIERS Duhamel & de Jussieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, dans lequel il établit une nouvelle Classe, à laquelle il rapporte les Animaux que les Naturalistes désignent par le nom de *Céacées*, & qu'ils rangent parmi les *Poissons*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que cet Ouvrage rempli d'ailleurs de recherches curieuses sur les différens noms donnés par les Auteurs à chacun de ces Animaux, pouvoir être utile aux Naturalistes, & méritoit d'être imprimé avec son Approbation, en foi de quoi j'ai signé le présent certificat. A Paris, ce 26 Avril 1755.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amis & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT : Nos biens aimés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilège pour

L'impression de leurs Ouvrages. A ces causes voulant favorablement traiter les Expositans, Nous leur avons permis & permettons par ces présentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudroient choisir, toutes les recherches ou observations journalières, ou relations annuelles de tout ce qui a été fait dans les assemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires, ou traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils sont dignes de l'impression, en tel volume, forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés ils puissent en imprimer d'autres qui ne soit pas de ladite Académie: Faisons détenir à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni courretaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucune traduction ou extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit des Expositans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expositant, ou de celui qui aura droit d'eux, & de tout dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de l'exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servis de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur D A G U S S I A U, Commandeur de nos Ordres, Chancelier de France, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chaque'un dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur D A G U S S I A U, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Expositans & leurs ayans causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amis & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit adjointe comme à l'Original; Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-neuvième du mois de Mars, l'an de grace mil sept cent cinquante, & de notre Règne le trente-cinquième, Par le Roi en son Conseil.

M O L.

Registré sur le Registre d'ordre de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N^o 430. fol. 109. conformément au Règlement de 1723. qui fait défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires prescrits par l'Article 108 du même Règlement. A Paris le 5 Juin 1750.

LE GRAS, Syndic.

XXIX.

33



